






6245BB MXLX (hs)

Coll couplit

Doer Monsieur d'Essein de la part de son tres humble et tres sbeissant sorviteur. Davitag.

7128 3 cal



CATALOGUE

SYSTÉMATIQUE ET RAISONNÉ DES CURIOSITÉS

DE

LA NATURE ET DE L'ART,

QUI COMPOSENT LE CABINET

DEM. DAVILA,

AVEC Figures en taille douce, de plusieurs more ceaux qui n'avoient point encore été gravés.

TOME PREMIER.



A PARIS,

Chez Briasson, rue Saint-Jacques, à la Science

M. DCC. LXVII.

Avec Approbation & Permission.

LE PRÉSENT CATALOGUE

se distribue aussi

ATEC FIGURE on saille doute, de plujeurs more

Cher Bankson, rus Signifacqui

Avec Approbation & Principles

Amsterdam, chez Changuion.

Rotterdam, chez Beman.

Londres, chez Paul Vaillant..

Basle, chez Schweighauser.





AVERTISSEMENT

DE M. DAVILA.

JE me crois obligé de prévenir ici le Public, & sur-tout mes Amis & mes Correspondans, des motifs qui m'engagent à vendre un Cabinet que je n'ai cessé d'augmenter jusqu'à ce jour. Les uns pourroient croire que je me suis dégoûté très-légèrement d'un objet qui paroissoit faire mes délices depuis plus de vingt ans : les autres, au nombre desquels sont d'illustres Naturalistes qui n'ont pas peu contribué à l'embellissement de cette Collection. pourroient regretter de m'avoir cédé quelques morceaux rares & curieux, dont ils ne m'ont peut-être fait l'abandon que par l'espoir de les voir paroître dans un Ouvrage que je me proposois de faire alors sur certaines branches de l'Histoire Naturelle, & pour lequel j'avois déja fait dessiner plus de deux cent morceaux; mais

cet Ouvrage n'a pû avoir lieu, par les mêmes raisons qui m'obligent à me défaire actuellement de mon Cabinet.

Entre plusieurs motifs que je pourrois donner, j'espere que ces deux suffiront: l'un est l'altération de ma santé qui, depuis quelques années, est fort chance-lante, & qui exige de la tranquillité: l'autre est la nécessité où je me trouve de repasser au Pérou pour des affaires de famille qui m'y rappellent.

J'avoue sincérement que ce n'est pas sans une peine extrême que j'abandonne l'objet de ma plus vive passion, & que je me vois forcé de priver le Public d'un petit Traité sur les Eponges & les Alcyons, que je lui destinois, & qui devoit être mon premier essai, ayant fait, dans ce genre, comme le prouve le Catalogue, une collection des plus intéressantes. Au désaut de cet Ouvrage, j'espere qu'on me sçaura gré d'avoir présenté le tableau sidéle de tout ce qui compose mon Cabinet.

Malgré les connoissances que l'étude de plusieurs années m'a pû fournir sur les

différentes substances qui s'y trouvent rafsemblées, j'ai eu recours, en plus d'une occasion, aux lumieres de nos plus habiles Naturalistes, auxquels je suis redevable de plusieurs remarques neuves & importantes; mais celui à qui je dois le plus, est M. DEROMÉDELISLE, Auteur de la Lettre sur les Polypes d'eaudouce, qui a fait, de concert avec moi, toute la partie de l'Histoire Naturelle, &

une partie de celle des Curiosités de l'Art.

Le peu de tems qui me reste avant mon retour au Pérou, & la peine que j'ai de voir démembrer une Collection qui, par le soin avec lequel je l'ai faite, peut devenir utile aux progrès de l'Histoire Naturelle, m'engagent à prévenir le Public que je me préterai volontiers aux propositions de ceux qui voudroient faire l'acquisition totale de mon Cabinet: je le laisserai même, dans ce cas, à un prix fort raisonnable, & au dessous de sa valeur intrinséque, qui sera fixée sur l'estimation qu'on en fera faire par des Connoisseurs en ce genre.

vj AVERTISSEM. DE M. DAVILA.

On pourra s'adresser, jusqu'au 15 Octobre 1767, à M. DAVILA, rue de Richelieu, près de la Fontaine, ou à M. Remy, Peintre de l'Académie de Saint-Luc, rue Poupée, seconde Porte cochere à gauche, en entrant par la rue Haute-seuille.

Passé ce terme, si personne ne se présente, on procédera à la Vente publique, qui commencera le lendemain de la Saint-Martin, Jeudi 12 Novembre de la même année, & qui sera continuée sans interruption jusqu'à sa fin.

On distribuera, de quinze jours en quinze jours, une seuille qui indiquera les Articles qui seront vendus dans chaque vacation.





PREFACE.

ANT que de passer au détail des Substances qui composent notre Cabinet, nous croyons devoir exposer, en peu de mots, l'ordre que nous avons suivi dans leur distribution, & les raisons qui nous ont déterminés à en donner des descriptions plus circonsciées que celles que l'on trouve ordinairement dans les Ouvrages de ce genre.

Vingt ans de soins & de recherches, ayant rendu notre Collection une des plus complettes de l'Europe, sur tout quant au Regne minéral & aux dissérens Corps que produit la mer, nous avons pensé que les Naturalistes nous sçauroient gré de la leur faire connoître dans un certain détail, avant qu'elle sût dispersée, & que les Curieux seroient bien-aises de se voir indiquer les

C'est dans cette vûe que nous avons formé le plan de notre Catalogue, & l'exécution n'étoit pas sans difficulté: car, s'il faut ici donner de chaque substance une idée aussi claire, aussi distincte qu'il est possible; il est également nécessaire de se renfermer dans les bornes prescrites à une espèce d'ouvrage où l'on doit seulement faire connoître les objets, sans chercher à en approfondir la nature & les diverses propriétés.

La disposition méthodique des substances dans ce Catalogue, nous a paru le seul moyen de réunir le double avantage de la clarté & de la précision: car, en rangeant chaque Espèce dans son vrai Genre, en plaçant le Genre dans sa Famille, & celle-ci dans sa Classe; cette simple distribution bien ordonnée, non-seulement jette une grande lumiere sur les objets, mais même elle écarte ces répétitions qu'il est si difficile d'éviter dans un ouvrage de la nature de celui-ci.

Mais nous l'avons déja dit ; cet ordre, qui constitue notre plan, a luimême ses difficultés : le nombre des productions naturelles est si grand; leur forme est si variée; la chaîne qui les unit entr'elles, si déliée & quelquefois si peu sensible, que l'on est souvent très - embarrassé lorsqu'il s'agit de déterminer les caracteres qui doivent constituer ce qu'on appelle un Genre, & qu'il faut fixer celui auquel on doit rapporter telle ou telle Espéce. Tantôt on se trouve arrêté par des Espéces qui ne conviennent à aucun des Genres établis; tantôt par une autre qui semble appartenir à plusieurs Genres à la fois.

Il est vrai que nous ne manquons pas d'excellens guides qui ont déja tracé la route que nous devions suivre dans ce dédale; mais un Catalogue de vente est bien différent d'un simple Catalogue raisonné, où l'on n'est point gêné par la nécessité souvent rebutante d'assortir des lots: aussi espérons-nous qu'on voudra bien attribuer à cette contrainte quelques irrégularités qui pourront se trouver dans la distribution des Espéces. Nous allons développer le plan que nous avons suivi.

Les Naturalistes s'accordent assez à diviser tous les êtres en trois grandes Classes, connues sous les noms de Regne animal, Regne végétal & Regne minéral. Cette division, quoiqu'incomplette, est suffisante pour notre objet, n'ayant à parler que des substances de ces trois Regnes.

Nous mettons à la tête du premier Regne (que nous diviserons en dix parties) les plus petits animaux connus, ou du moins leurs productions, pour nous élever par dégrès jusqu'à l'Homme. Les Polypiers ou habitations de Polypes forment, en conséquence, notre premiere Partie. Cette Classe, qui est une des plus complettes de notre Cabinet, comprend aussi les Eponges &

les Alcyons, quoique nous ignorions encore à quels Genres d'Animaux on doit rapporter ces productions singulieres. Ellis (1), Wallerius (2), Peyssonel (3), ont été nos guides pour la Partie systématique; Séba (4) & Gualtieri (5) pour la description des Espéces.

La seconde Partie contient les Co-QUILLAGES marins, fluviatiles & terrestres, dont nous faisons trois Sections, & que nous divisons, selon la méthode la plus suivie, en Univalves, Bivalves & Multivalves.

Quoique les sçavantes distributions

⁽¹⁾ Essai sur l'Hist. Nat. des Corallines. La Haye ;

⁽²⁾ Minéralogie (de la traduction de M. le Baron d'Olbach.) Paris, 1753. 2 vol. in-8°.

⁽³⁾ Traduction d'un art. des Transact. Philos. sur le Corail. Londres, 1756. in-12.

⁽⁴⁾ Locupletis. Rer. Nat. Thel. Amst. 1734 & suiv. 4 vol. in-fol. fig.

⁽⁵⁾ Index Testar. Conchylior. Florentia, 1742. infol. fig.

de Lister (1), Gualtieri (2), Klein (3) & Adanson (4) nous aient été d'un grand secours, nous n'avons pû adopter aucun de ces systèmes, les uns à cause des subdivisions trop nombreuses qui en résultent, & dont ce Catalogue n'est point susceptible; les autres parce qu'ils sont sondés sur la forme propre & individuelle de chaque animal, & qu'ainsi nous n'aurions pû nous y conformer entièrement, puisque nous possedons un très-grand nombre de Coquilles dont les animaux ou n'ont point été décrits, ou nous sont même absolument inconnus.

Nous avons donc préféré le plan simple & aisé de M. d'Argenville (5);

⁽¹⁾ Historia Conchylior. Londini, 1685-1692. in-

⁽²⁾ Index Testar. Conchiliorum.

⁽³⁾ Tentamen Methodi Ostracologica. Lugd. Batav. 1753. in-4°. fig.

⁽⁴⁾ Hist. Nat. du Sénégal. Paris, 1757. in-4°. fig.

⁽⁵⁾ L'Hist. Nat. éclaircie dans la Conchyliologie. Paris, 1757. in-4°. fig.

plan d'ailleurs très-connu, & dès-là plus convenable à notre dessein, qui est moins de faire un traité complet sur cette matiere, que d'indiquer les Espéces & les Variétés dont nous sommes en possession.

Toutefois on ne s'est pas tellement assujetti au plan de cet Auteur, que l'on ait négligé d'y faire quelques changemens, & de mettre un peu plus d'ordre dans les Familles; ce qu'on a fait en subdivisant ces Familles en un petit nombre de Genres dont les caracteres sont aisés à saisir: nous avons aussi réuni ou transposé quelques - unes des Familles, lorsqu'il nous a paru qu'il en résultoit plus d'ordre & de liaison dans notre système. C'est aux Naturalistes à juger de ces changemens; mais nous pouvons assurer que nous n'avons eu pour but que l'avantage de simplifier les objets, & de conserver les noms déja reçus, sans vouloir prendre sur nous d'en faire de nouveaux qui n'auroient pas été du goût de tout le monde, XIV

& qui dès-là exigeoient des discussions déplacées dans un Catalogue.

On nous reprochera peut - être de nous être trop étendus dans la description de la plûpart des Coquillages qui sont déja connus, & qu'il eût, dira-t'on, suffi de nommer: mais voici nos raisons.

Comme les Coquilles qui ont des noms particuliers, ne font pas la vingtieme partie de celles qui font connues; que d'ailleurs la plûpart de ces noms, quelquefois tirés de fort loin, ne font pas reçus partout, & que plusieurs ont été donnés en même tems à deux ou trois espéces souvent très-différentes, tandis que d'autres espéces ont eu jusqu'à deux ou trois noms à la fois: nous nous serions exposés à n'être point entendus, & nous n'aurions fait qu'augmenter la confusion, si nous nous étions contentés de donner un nom sans déterminer l'espéce à laquelle il convient.

Tel est l'inconvénient que nous nous sommes proposé d'éviter, en saisant de chaque espéce une description plus ou moins concise, selon que l'objet à décrire étoit plus ou moins commun, & en y joignant le nom sous lequel cette espéce est connue, non-seulement en France, mais en Hollande & dans les autres pays. En conséquence, nous avons cru devoir nous étendre un peu plus sur celles des espéces qui n'avoient point de nom.

Mais comme, en fait d'Histoire Naturelle, les descriptions les plus exactes sont insuffisantes pour ceux qui n'ont pas déja quelque connoissance des objets décrits, nous avons eu soin d'indiquer en marge la plûpart des Naturalistes qui nous ont offert la même espéce gravée, en donnant la présérence tantôt à ceux de ces Auteurs où elle étoit le mieux représentée, tantôt à ceux dont les Ouvrages sont le plus connus. C'est aussi par cette raison que nous avons cité quelquesois trois & quatre Auteurs pour un même objet, afin que, si on n'a pas l'un de ces Ou-

La troisieme Partie qui, sous le nom de Zoophytes, comprend les Etoiles de mer & les animaux moux, auxquels on donne le nom de Mollusques, est encore des plus intéressantes, quant à la premiere de ces Familles. Si nous n'avons pas toutes les espéces qui sont décrites dans le bel Ouvrage que M. Linck a publié sur cette matiere (1). nous avons l'avantage d'en posséder plusieurs autres qui lui ont été inconnues, entre lesquelles le fameux Palmier marin tient sans contredit la premiere place, tant par sa rareté, puisque jusqu'à présent c'est le seul qui soit connu en Europe, que par le jour qu'il a répandu sur l'origine des Pierres étoi-

lées & des Entroques depuis le Mémoire

p. 224 & suiv.

de M. Guettard (2).

Pour

⁽¹⁾ De Stellis marinis. Lipsiæ, 1735. in fol. sig.
(2) Voy. les Mém. de l'Acad. R. des Sc. an. 1755;

Pour les sept autres Parties du Régne animal, qui sont les Crustacées, les Poissons, les Amphibies, les Insectes, les Oiseaux, les Quadrupedes & l'Homme; la Collection que nous avons de chacune de ces Classes, n'étant pas assez considérable pour qu'on ait pû ranger les individus qui les composent sous aucun Ordre systématique: nous nous sommes contentés de les indiquer, en suivant, le plus exactement qu'il nous a été possible, l'ordre dans lequel nous les aurions placés, si notre Collection eût été plus complette à cet égard.

Quoique cette partie de notre Cabinet laisse beaucoup à désirer, les Curieux y trouveront néanmoins de quoi se satisfaire, par le soin que nous avons toujours eu de nous procurer ce qu'il y avoit de plus rare en chaque genre, dans l'impossibilité où nous étions de tout completter.

Nous avons mis, à la fin du Regne animal, les Bézoards & les autres Cal-

zviij PREFACE

euls qui naissent dans le corps de dissérens animaux & de l'Homme même. La suite que nous en avons est d'autant plus précieuse, qu'elle est le fruit de plus de quarante années de recherches faites par Messieurs Geosfroy de l'Académie Royale des Sciences, & que depuis elle a encore été augmentée d'un bon nombre d'autres que nous avons reçus du Pérou.

Les Végétaux forment la onzieme Partie du Catalogue des Curiosités naturelles. La suite en est peu nombreuse; mais on y verra quelques morceaux rares & une collection très-piquante d'Algues, de Fucus & de Mousses marines. C'est par-là que nous terminons

notre premier volume.

Les Terres, les Pierres & les Minéraux ont fourni seuls la matiere du second. Au moyen de la distribution méthodique que nous avons faite de ces différentes substances, on s'appercevra aisément qu'il est peu d'Espéces & même de Variétés qui nous

manquent. Nous avons suivi, autant qu'il a été possible, la nomenclature de Wallerius, quoique nous nous soyons souvent écartés du plan général de cet Auteur, pour suivre celui de quelques Naturalistes plus modernes. Nous avons aussi employé les phrases de Linnæus, sur-tout lorsqu'il s'agissoit de Pierres & de Mines de Suéde, dont nous avons reçu une très-belle suite, étiquettée conformément au système de ce célébre Naturaliste.

Le soin que nous avons pris de déterminer avec exactitude les diverses espéces de Cristallisations qui sont si fréquentes dans le Regne minéral, nous donne lieu d'espérer qu'on aura quelque indulgence pour certains articles un peu longs, parce qu'ils peuvent contribuer à faire mieux connoître ces corps dont la figure, constamment réguliere, n'est pas si indisférente que bien des personnes se le sont persuadé: outre qu'elle sussit quelquesois pour les saire reconnoître, elle paroît indiquer une affinité cachée entre ceux de ces corps qui affectent une même Cristallisation.

Ainsi, par exemple, la forme Cubique est particulièrement affectée au Spath vitreux, au Plomb, à la Marcassite, au Sel marin; la Pyramidale au Spath calcaire, au Quartz, au Cristal de Roche, à la mine d'Etain; la Prismatique hexagone au Spath calcaire, à la mine de Plomb verte, à la mine d'Argent rouge; la Rhomboidale à la Sélénite & au Spath calcaire; l'Octaëdre à l'Alun, au Fer, au Cuivre, aux Pyrites, au Rubis, &c.

M. Linnæus est le premier qui ait envisagé, sous un point de vûe général, toutes ces différentes Cristallisations, & le seul qui en ait déterminé la figure avec assez de justesse, pour les faire reconnoître au premier coup d'œil (1); mais les unes n'ayant point encore été décrites en notre langue,

⁽¹⁾ Voyez Linnæi Systema naturæ: ejusd. Amænit. Acad, vol. 1. & Musæum Tessinianum.

& les autres ne l'ayant été que d'une maniere vague & incomplette, nous avons cru devoir y suppléer & ajouter aux Cristaux décrits par Linnæus, la description de plusieurs autres dont il

n'a point parlé.

Les Pétrifications occupent la derniere Partie de la Collection d'Hiftoire naturelle; & ce n'est pas la moins intéressante. On y retrouvera le Plan que nous avons fuivi dans la distribution des Regnes Animal & Végétal, auxquels, suivant l'opinion la plus commune, les différens corps pétrifiés doivent leur origine. S'il se trouve quelque Naturaliste qui doute encore de la réalité des Pétrifications, ou qui ne leur attribue qu'une origine purement minérale, nous avons plusieurs morceaux dont l'inspection suffira pour le tirer de son erreur. Tels sont, par exemple, du Corail rouge avec de la pyrite; des Cornes d'Ammon , des Nautilites & quantité d'autres Coquilles encore revêtues de leur test & de leur nacre; des Echinites avec leurs dents ou leurs pointes dans la même matrice; des Entroques étoilées, parfaitement semblables aux tiges du Palmier marin (1); des Crabes pétrissés (2) presque entiers avec leurs pattes & leurs mordans; des Empreintes de Chevrettes (3), de Poissons (4), d'Insectes, caractérisées au point de ne pouvoir les méconnoître; ensin, des Bois, des Feuilles & des Fruits même (5), hors de toute contestation.

Il existe, à la vérité, un grand nombre de Pétrisications dont les Analogues vivans ne nous sont point connus; mais, si l'on ne trouve pas toujours précisément l'Espèce vivante, à laquelle on puisse rapporter telle ou telle Espèce pétrissée, il est aisé du moins de

⁽¹⁾ Voyez la planche 1 du troisseme vol. de notre Catalogue.

⁽²⁾ Ibid. pl. 3. lett. G. g.

⁽³⁾ Ibid. lett. I.(4) Ibid. pl. IV.

⁽⁵⁾ Ibid. pl. VI & VII.

reconnoître le genre qu'on doit lui assigner. Il n'en est pas de même des Pierres sigurées (1), appellées Jeux de la Nature : celles ci n'ont qu'une ressemblance imparsaite & le plus souvent arbitraire avec les objets auxquels on les compare : c'est ce qui met une dissérence très-sensible entre les Fossiles propres & les Fossiles accidentels ou Pétriscations, quoique quelques-uns aient affecté de les consondre.

Les Curiosités de l'Art, dont il nous reste à parler, ne sont point étrangeres à un Cabinet d'Histoire Naturelle: on peut même dire qu'elles en sont une branche essentielle, puisqu'il est peu de productions de la Nature, auxquelles les Arts ne puissent ajouter un nouveau lustre & un nouveau mérite.

Les différentes Classes qui composent cette partie de notre Collection, sont: 1°. Les Habits, Meubles, Armes &

⁽¹⁾ V. le fecond vol. du Catalogue.

Ustensiles de divers Peuples anciens & modernes, Chinois, Indiens, Amériquains, &c.

- de Jaspe, de Cristal, d'Albâtre & autres ouvrages curieux en Coquilles, Nacre & Ivoire, avec quelques anciens Laques & quelques Porcelaines de la Chine & du Japon.
- Mathématique, de Physique, &c.
- 4°: Les Pierres gravées Antiques & Modernes, dont plusieurs sont du premier mérite.
- 5°. Plusieurs beaux Bronzes Antiques, Bustes, Bas-reliefs & Médailles. (M. l'Abbé Grimaud, très-versé dans la connoissance des Antiques, nous a beaucoup aidés dans cette partie de notre Ouvrage).
- 6°. Une Collection assez considérable d'Estampes & de Peintures à Gouache, avec quelques Tableaux & Desseins Originaux des Maîtres des trois

Écoles; des Miniatures, Peintures en émail & autres curiosités semblables. Cette Partie a été faite par M. Remy, Peintre de l'Académie de Saint-Luc, connu par les Catalogues qu'il a donnés de plusieurs beaux Cabinets, &, en dernier lieu, par celui qu'il vient de publier de la riche Collection de Tableaux de seu M. de Julienne.

7°. Enfin notre Bibliothéque, peu nombreuse à la vérité, mais qui contient une suite assez complette des meilleurs Livres qui ont paru sur l'Histoire Naturelle.

Afin de ne rien laisser à désirer de tout ce qui pouvoit contribuer à rendre ce Catalogue utile, on y a joint des Tables Alphabétiques & Synoptiques, avec des Gravures d'un certain nombre de morceaux rares ou nouvellement connus, & sur tout de ceux qui n'avoient point encore été gravés: nous comptions en donner un plus grand nombre; mais le tems ne nous l'a pas permis: les Planches mêmes ont été

gavj PREFACE.

finies trop tard, pour que nous puissions les citer dans le corps de l'Ouvrage. La Table Alphabétique est suivie d'une Explication succincte de ces Planches, avec un renvoi à chacun des articles du Catalogue où il en est parlé.






TABLE SYNOPTIQUE

DU PREMIER VOLUME.

PREMIERE PARTIE.

Polypiers, page 1

ORDRE I.

POLYPIERS SOLIDES OU PIERREUX.

		Angel .	
Gre	1:	Coraux.	. 5
		Madrépores.	11
		Astroites.	2 1
3 A C		Tubipores.	24
	5	Millepores.	26
	6.	Rétépores.	30
		Méandrites.	3 2
		Fongipores.	36

ORDRE II.

POLYPIERS MOUX OU FLEXIBLES.

\mathbf{G}^{re}	1.	Faux Coraux.	43
	ž.	Lithophytes.	47
*		Corallines.	56

Gre 4- Escares molles.	.5
5. Eponges.	5
6. Alcyons.	6
SECONDE PARTIE.	
Coquilles Add A HAMAI A A A A	7
SECTIONI	5
Coquilles de Mer.	7
CLASSE I.	
Coquilles de Mer, univalves	
FAMILLE I.	
E É P A S.	
Gre 1. Lépas entiers.	78
2. percés au fommet.	88
chambrés.	89
4. à appendice en demi-cornet.	91
FAMILLE II	
OREILLES DE MER-	
1. Oreilles de mer, à trous.	23
2. Janes Trous.	25

TABLE

xxviij

SYNOPTIQUE. FAMILLE III. TUYAUX DE MER. Gre 1. Tuyaux de mer, simples ou isolés. groupes ou Vermiculaires. 102 non testacés. 104 FAMILLE IV. NAUTILES. 1. Nautiles chambrés. £07 non chambrés. FAMILLE V. LIMAÇONS. 1. Limaçons à bouche ronde. à bouche demi-ronde, dits Nérites. 116 à bouche ovale, dits Sabots. 123 FAMILLE VI. BUCCINS. 1. Buccins à bouche entiere. 133 à bouche échancrée. 136 à petite queue. à longue queue. 155

2.

3.

2.

2.

3.

3.

. 4.

XXX

TABLE

FAMILLE VII.

ROCHERS.

Gre 1. Rochers	fans queue.	159
2.	à petite queue.	168
3.	aîlés, sans pattes.	179
4	aîlés, à pattes.	188

FAMILLE VIII.

POURPRES.

I.	Pourpres	à	petite queue.	194
2.		à	longue queue.	202

FAMILLE IX.

TONNES.

1. Tonne.	s à bouche entiere.	206
2.	à bouche échancrée.	208
3. 0 7. 7	à queue.	216

FAMILLE X.

V 1 s.

1. V	is lisses.	219
2.	striées.	221
2.	tuberculeuses.	2.2.6

FAMILLE XI.

VOLUTES.

				_	
I.	Volutes	coniques,	ou	Cornets.	232

SYNOPTIQUE. xxxj
Gre 2. Volutes cylindriques, ou Rouleaux. 251
¿chancrées, ou Olives. 257
FAMILLE XII.
PORCELAINES.
2. la bouche plus étroite. 264
CLASSE II.
Coquilles de Mer BIVALVES.
FAMILLE I.
Huitres.
1. Huitres proprement dites. 280
teuilletees. 293
épineuses. 298
4. Anomies ou Térébratules. 311
FAMILLE II.
Pergnes.
2. Peignes à oreilles égales. 316
Péconcles. 319
3. fans oreilles.
FAMILLE III.
CAMES.
1. Cames à bases rondes régulieres. 329

FAMILLE IV.	
CŒurs.	
1. Cœurs proprement dits.	3 4
2. Arches.	35
3. Cames tronquées ou Conques de Vénu	us.
	36
FAMILLE V.	
TELLINES.	
1. Tellines béantes à une extrémité.	: 37
2. béantes aux deux bouts.	
3. Manches de couteau.	
FAMILLE VI.	
Moules.	
1. Moules proprement dites,	38
2. cylindriques, ou Dattes.	
3. triangulaires, ou Pinnes	
marines.	38
· CLASSE III.	
Coquilles de MER MULTIVALVES	7
FAMILLE I.	
	39:
FAMI	
1 111411	ال بسال بسال

TABLE

Gre 2. Cames à bases rondes irrégulieres. 339
3. à bases ovales régulieres. 339
4. à bases ovales irrégulieres. 344

âxxij

SYNOPTIQUE.	XXXII
FAMILLE II.	
PHOLADES.	
Gre 1. Pholades sextivalves.	396
quintivalves.	397
•	
FAMILLE III.	* **
Tuyaux.	
1. Tuyaux trivalves.	398
2. quintivalves.	39 9
74 MILT F 137	
FAMILLE IV.	
GLANDS DE MER.	401
FAMILLE V.	
Conques anatiferes et Poucepii	DS. 405
FAMILLE VI.	
Oursins.	
Gre 1. Turbans.	410
2. Cœurs marins.	418
3. Œufs marins.	ibid.
4. Pavois ou Boucliers.	42 E
5. Gâteaux ou Beignets.	423
6. Rotules.	425
SECTION II.	- 1 - 1 - 3 - 2
Coquilles fluviatiles.	427
Tome I.	C

2 %	5	_	
-	_	Z.	1,200
XX	X	ı	1860

TABLES

SECTION III.

Coquilles terrestres.

436

TROISIEME PARTIE.

ZOOPHYTES.

45 I

FAMILLE I.

ETOILES DE MER.

Gre 1. Etoiles de mer, à rayons fendus 454 2. à rayons entiers. 464

FAMILLE II.

Mollusques.

469

QUATRIEME PARTIE.

CRUSTACÉES

Gre I. Crustacées à corps allongé. 471 2. à corps large. 472

à corps arrondi.

CINQUIEME PARTIE.

Poissons.

475

T.	A	B	L	E	S	Y	N	0	P	T	I	Q	U	E.
----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

VXXX

SIXIEME PARTIE.

Amphibies. 478

SEPTIEME PARTIE.

HUITIEME PARTIE.

OISEAUX. 490

NEUVIEME PARTIE.

QUADRUPEDES.

DIXIEME PARTIE.

L'HOMME.

500

APPENDICE

BEZOARDS ET CALCULS.

SOI

ONZIEME PARTIE.

VÉGÉTAUX.

509

APPROBATION DE M. ADANSON.

DE l'Académie Royale des Sciences, de la Société Royale de Londres, Censeur Royal.

J'AI lû, par ordre de Monseigneur le Vice-Chancelier, un Ouvrage intitulé: Catalogue systématique & raisonné des Curiosités de la Nature & de l'Art, qui composent le Cabinet de M. DAV: LA; & je n'y ai rien trouvé qui puisse en empêcher l'impression.

Ce Cabinet, vraisemblablement le plus riche qu'aucun Particulier ait encore formé, sur-tout quant à la partie de l'Histoire Naturelle, est d'autant plus précieux qu'il renserme des Suites immenses des productions des trois Regnes de la Nature. Il seroit sacheux que cette Collection, qui nous est très connue, & qui est destinée à être mise en vente, sût démembrée & dispersée dans divers petits Cabinets particuliers, étant très-digne de l'attention de quelque Souverain qui en seroit l'acquisition, autant par magnificence que pour procurer à ses Peuples des objets de connoissances naturelles, dont l'application bien entendue mene le plus souvent à quelque chose d'utile pour le commerce de la Société. Fait à Paris, ce 13 Mai 1767.

ADANSON.

CATALOGUE



CATALOGUE

RAISONNÉ DES CURIOSITÉS D'HISTOIRE NATURELLE

DU CABINET

DE M. D'AVILA.

PREMIERE PARTIE.

POLYPIERS

ous rangerons sous cette Classe Polytoutes les productions marines qui ont été prises si longtems pour des plantes, & que les découvertes de MM. Peyfsonel, Tremblay, de Réaumur, de Jussieu, Ellis & Donati ont démontré appartenir au Regne animal. On peut voir dans les Traités de ces sçavans Naturalistes les preuves nombreuses qui

POLY-

autorisent ce sentiment. Sans entrer dans de plus grands détails à cet égard, nous nous contenterons de dire ici que ces productions si singulieres & si variées sont l'ouvrage & la demeure d'animaux encore peu connus à cause de leur petitesse, auxquels on a donné le nom de Polypes. Ces Polypes que le Comte de Marsigly & quelques autres ont cru être les fleurs de ces prétendues Plantes, ne sont peut-être eux-mêmes que des fourreaux minces & déliés remplis d'animalcules presque imperceptibles (a); mais que le Polype soit pris pour famille ou pour individu, il n'en est pas moins constant que les productions dont nous allons parler font autant de ruches extrêmement peuplées, comme il est aisé de s'en convaincre en les observant au microscope, lorsqu'elles sont encore dans leur élément: on

⁽a) Voyez la Lettre de M. de Romé de l'Isle à M. Bertrand sur les Polypes d'Eau douce. Paris, La Combe, 1766, in-12.

voit alors des milliers de Polypes sortir Ports de toutes les tubules dont elles sont PIER3. garnies, & y rentrer avec précipitation lorsqu'on les tire hors de l'eau. Les habitations de cette Classe d'Etres animés sont aussi variées dans leur forme que dans leur tissu. On peut néanmoins les réduire à deux Ordres principaux, dont le premier comprendra les Polypiers de substance solide ou pierreuse; & le second, les Polypiers de substance molle ou flexible. Il auroit peut être été plus exact d'établir nos classifications sur la forme propre & individuelle des animaux qui habitent & construisent ces Polypiers; mais, faute de connoissances assez étendues sur cet objet, nous adoptons les divisions qu'a établi le célebre Wallerius pour les Po-. lypiers fossiles, & celles de M. Ellis pour les Corallines, en y faisant quelques légers changemens qui nous ont paru propres à jetter du jour sur cette partie de l'Histoire Naturelle.

POLYPIERS.

Poly-Piers. Contient huit Genres, qui sont

- 1°. Les Coraux proprement dits.
- 2°. Les Madrépores.
- 3º. Les Astroïtes.
- 4°. Les Tubipores.
- 50. Les Millepores.
- 6°. Les Rétépores.
- 7°. Les Mæandrites.
- 8°. Les Fongipores.

Le second ordre est composé de six Genres, qui sont

- 1°. Les Faux Coraux.
- 2°. Les Kératophites ou Litophites.
- 3°. Les Corallines.
- 4°. Les Escares molles.
- · 5°. Les Éponges.
 - 6°. Les Alcyons.





ORDRE PREMIER.

POLIPIERS

DE SUBSTANCE SOLIDE OU PIERREUSE

GENRE PREMIER.

CORAUX.

CE sont des Polypiers d'une substan- CORAUX. ce dure & compacte, intérieurement massive, pleine & solide, sans aucun trou ni porosité apparente, quoiqu'elle soit revêtue d'une écorce tartareuse garnie de tubules & de petits trous. On enleve aisément cette écorce dans l'instant que le Corail sort de l'eau; mais après qu'il a été exposé à l'air un certain temps, on ne peut la détacher sans la réduire en poudre. C'est dans les tubules qui la composent que logent les animaux du Corail. Tous les Polypiers de ce genre sont ordinairement branchus, légerement striés, & présen-A 111

COBAUX. tent aux yeux la figure d'un Arbrisseau. dépouillé de ses feuilles : la grosseur de la tige n'excéde guère un pouce, & sa plus grande hauteur est d'un pied ou un peu plus.

> ARTICLE I. Un très-bel Arbrisseau de Corail rouge, revêtu en partie de son écorce, portant onze pouces de haut sur huit de large, monté sur un pied de bois des Indes (a). Ce morceau, qui est d'une forme très élégante, est encore remarquable par deux branches qui se sont trouvées cassées dans le tems qu'il étoit dans la mer, lesquelles étant tombées entre les autres branches, s'y trouvent comme collées & recouvertes de la même écorce qui envelope le reste. Cet accident est d'autant plus curieux qu'il peut contribuer à rendre raison de la formation du Corail. 130".

> 2. Un autre Arbrisseau de même Corail, entierement revêtu de son écorce, ayant sept pouces de haut sur huit de large. Il adhére par sa base à une espèce de rocher qui paroît avoir

⁽a) Nous avertissons une fois pour toutes que presque tous les Polypiers des Articles suivans sont pareillement montés sur des pieds de bois des Indes, ou de bois noirci, excepté ceux qui ont un support naturel, ou quelqu'autre support particulier dont nous parlerons à leur Article.

été formé d'un assemblage confus de divers CORAUX

Polypiers. 48.

3. Un magnifique Arbrisseau de Corail rougefanguin, dépouillé de son écorce, & dont les branches s'étendent en éventail. Ce morceau qui est monté sur un pied de bois noir, orné de cartouches de cuivre doré, est un des plus grands que l'on connoisse. Il porte neus pouces de haut sur un pied de large, & est presque semblable à celui dont parle Séba*. ? 30.

4. Un autre d'un rouge plus foncé que le de fon Cabiprécédent, à branches dispersées en tout sens, pl. 115, N°, monté sur un pied de cuivre doré en or moulu enrichi de bordures, dentelures & sleurons de même Corail. Ce morceau, haut de cinq pouces & large de neuf, est des plus curieux. 164.

5. Un autre Arbrisseau d'un rouge pâle, mais remarquable par la grosseur extraordinaire de ses trois principales branches, dont une a plus d'un pouce de diametre, & les autres un peu moins. Le tronc a près de trois pouces de diametre dans sa plus grande largeur. Toute la pièce a sept pouces de haut sur neuf & demi de large. 75.

6. Un autre d'un rouge plus foncé que le précédent. Il se partage en deux branches principales d'une belle grosseur. Sa hauteur est de neuf pouces neuf lignes sur neuf pouces de

large. 60 . 2.

A iv

CORAUX.

7. Un autre de la plus riche couleur & parfaitement beau. Il a fix pouces de haut sur cinq de large, & est monté sur un pied de laque de même couleur, imitant le Corail. 46.10.

8. Un autre d'un beau rouge foncé. Ce morceau est enrichi de deux grandes huîtres & d'un tube vermiculaire de deux lignes de diametre, lesquels sont recouverts de la substance même du Corail. 32.

9. Un magnifique Arbrisseau de vrai Corail blanc, portant huit pouces de haut. Il est en tout semblable au Corail rouge, à la couleur près, ce qui le rend très-rare. 180.1.

10. Trois petits morceaux de Corail, rares & des plus curieux; fçavoir, un morceau de Corail en partie rouge & en partie blanc. Un traversé dans toute sa longueur par une branche de l'Espéce des Kératophites, connue sous le nom de Carail noir. Celui-ci est d'un beau noir luisant, & sert de base au Corail rouge qui l'enveloppe. Une interruption qui se trouve naturellement vers le milieu de ce morceau, en laisse voir tout le mécanisme. Et une branche de faux Corail noir, revêtue d'une croute grisâtre & celluleuse qui est elle-même recouverte d'une couche de vrai Corail rouge, dont les fractures laissent appercevoir les couches intérieures. 22.

11, Deux piéces de Corail rouge avec son

écorce, dont une fait partie d'un groupe de différens Polypiers entassés l'un sur l'autre en forme de rocher; tels que des Eponges, des Litophites, des Corallines, des Tubes vermiculaires & quelques petites Anomies. L'autre est aussi chargée de ces Corps étrangers. 29.

2. Deux autres Groupes du même Corail & des mêmes Polypiers, fur chacun desquels on remarque de plus une huître complette. Celle du plus petit est blanche, seuilletée &

peu commune. 27.

13. Seize petits morceaux de Corail, trèsintéressans pour ceux qui en étudient l'Histoire; sçavoir, 1°. Cinq de Corail blanc de différentes nuances, l'un desquels se divise en deux branches de forme applatie & très minces, & un autre fort singulier dont l'extrêmité supérieure s'applatit & s'élargit en forme de feuille. 2°. Un petit échantillon de Corail blanc & rouge. 3º. Un petit pied de Corail rouge qui différe des autres espéces connues, en ce que ses stries sont plus profondes sur-tout vers l'extrêmité des branches. 4°. Un morceau dont les branches sont entrelacées les unes dans les autres, & qui paroît être une variété. 5°. Trois morceaux, dont un de Corail blanc, un de Corail noir, & un de Madrépore branchu, remarquables en ce qu'ils sont revêtus de Corail rouge. 6°. Un autre morceau des plus extraor-

e CORAUS

CORAUX. dinaires; c'est une branche de Corail rouge, couverte d'une croute grisâtre, laquelle est elle-même recouverte par une seconde couche de Corail rouge qui a conservé une partie de son écorce. Entre ces deux couches est renfermé un Tube vermiculaire assez considérable. 7°. Un Galet & trois petites Valves d'Huîtres, dont deux feuillerées, avec des branches de Corail qui y font adhérentes. 8°. Une petite Anomie aussi chargée de Corail: 30.

> 14. Un petit Bocal très-curieux contenant quelques branches de Corail rouge, chargées de leurs Polypes des mieux conservés dans une liqueur appropriée. On voit très-distinctement leurs bras étendus en forme d'étoiles, & semblables aux pétales d'une petite fleur blanche. 30.

> 15. Vingt échantillons de Corail numérotés 1=20; où l'on trouve toutes les gradations de sa couleur depuis le rouge le plus pâle jusqu'au rouge le plus foncé. Plus, sept douzaines de grains de même Corail de la grosseur d'un gros pois, dont chaque douzaine aussi numérotée offre une variété de nuances très-suivie. Ces échantillons ont été envoyés de la manufacture de Naples. 47."

GENRE SECOND.

MADRÉPORES.

d'OLYPIERS d'une substance dure & MADRÉpierreuse, moins compacte que la pré- por ses, cédente, composés de branches en forme d'Arbrisseau, garnis de tubules, sans écorce, percés d'une foule de trous étoilés, la plûpart très-sensibles & d'une forme réguliere qui est toujours la même dans chaque espèce, quoiqu'elle varie à l'infini dans les espéces différentes; les Madrépores différent des Coraux simples par les pores étoilés dont ils sont pourvus & par le défaut d'écorce. Les Polypes qui les habitent occupent l'extrêmité des cellules.

16. Un très - beau Madrépore blanc de la Méditerranée à rameaux arrondis, lissés, tortueux, entrelassés les uns dans les autres, parsemés de grands trous ou pores, assez éloignés les uns des autres, débordant un peu la super- 106, N°. 1 &c ficie, étoilés & cannelés en dedans; connu sous 2. Gualtieri le nom de Corail blanc oculé *. Ce morceau, N°. 3. 40.

Madré-Pores. qui est d'une blancheur parfaite, forme un Arbbre de neuf pouces de haut sur autant de large.

17. Un autre Madrépore blanc oculé de la même espèce, à branches plus nombreuses & plus déliées. Il porte onze pouces de haut sur

10 de large. 48.

18. Trois autres Madrépores; sçavoir, un blanc oculé de l'Amérique, à étoiles moins éparfes que le précédent; un, en buisson, couleur lilas, à petites branches rameuses, semées de pores étoilés assez faillants. Le troisième est d'un très beau violet à petites branches chagrinées, un peu applaties & comprimées. Ces branches ont les deux surfaces séparées par une suite de petits trous qui regnent le long des côtés, ce qui leur donne l'apparence de deux piéces appliquées l'une sur l'autre. Ces trois morceaux ne sont pas communs. 12.

19. Un rare & bel Arbisseau de Madrépore blanc étoilé des Indes, à étoiles plus nombreuses, moins profondes, moins faillantes & à moins de rayons que celles des précédens; la surface des branches & du tronc paroît à la loupe comme grainelée. Il est monté sur un support de bois des Indes qui entre à coulisse dans une boëte du même bois & vitrée. 80."

20. Un autre Madrépore branchu étoilé, de la même espéce que le précédent. Il est remarquable en ce qu'il s'est formé sur un gros Litho-

phite, dont il recouvre deux des principales MADRÉbranches; il est aussi chargé de plusieurs huî- PORES, tres. Les autres branches du Lithophite qui s'étendent en éventail sont recouvertes de l'écorce tartareuse, rouge & celluleuse qui leur est propre. 30. 1.

20 bis. Un Madrépore branchu des Indes Orientales, rare, blanc de lait, à branches fines, nombreuses, chargées de petites tubules étoilées, fort serrées. Sa forme est des plus gracieuses, & il adhère par sa base à un Polypier en sorme de concrétion blanche & branchue de l'espéce

des faux Coraux. 72."

21. Un très-grand Madrépore rameux de la Méditerranée, à étoiles larges & profondes situées aux extrêmités des branches; le reste de fa superficie est simplement strié, sans pores * Donati sensibles, & tire sur le rougeâtre *. Cet arbre mer Adriaties qui est d'une beauté surprenante, porte dixneuf pouces de haut sur autant de large. 250. 1.

22. Un autre de la même espéce, grisâtre, à branches moins grosses, & portant treize pouces de haut sur dix-sept de large. 47.2.

23. Un autre des mêmes espéce & couleur, mais d'une nature beaucoup plus compacte, & à branches très grosses. Ce morceau, qui est d'une pesanteur remarquable pour un Madrépore, a 14 pouces de haut sur autant de large. 27.2

24. Un autre de même espéce, chargé de

MADRÉ-

branches de Corail rouge, de Tubes vermicus laires, d'Huîtres, d'Anomies, de Corallines & autres Corps marins qui rendent cet article fort curieux. Il a onze pouces de haut sur autant de large.

25. Un autre avec les mêmes accidens, mais

moins large. 23.19.

26. Un autre semblable de treize pouces de

haut sur sept de large. 18-1!

27. Un très-grand Madrépore abrotanoïde gris-jaunâtre, appellé Bois de Cerf, à rameaux arrondis, pointus, dont toute la superficie est hérissée de Tubules saillantes, étoilées en-dedans. Ce beau morceau porte vingt-cinq pouces de haut sur vingt-trois de large. 72

28. Un autre Madrépore Bois de Cerf, adhérent naturellement à un grand Millepore, d'un blanc sale, étendu en éventail, dont l'extrêmité des feuilles est profondément découpée. A cette particularité près, ce groupe ressemble parsaitement, tant pour la grandeur que pour la forme, Descr. de à celui qui est représenté dans Séba *. 60.

Defere de fon Cab. tom. 3, pl. 114,

29. Un autre Madrépore de même espéce gris-cendré, à grosses branches, se subdivisant vers l'extrêmité en plusieurs rameaux en sorme de bouquets. Il porte quinze pouces de haut sur autant de large. 18*1

deur, dont un gris-jaunâtre en forme de bou-

MADRÉ-

quet, à branches minces & pointues, garnies de Tubules plus saillantes que dans l'espéce précédente, ce qui lui a fait donner le nom d'Épi de Bled; & un en forme de buisson d'un blancbleuâtre, à branches plus grosses & plus rassemblées, également hérissées de longues Tubules. C'est le Madrepora albida digitata de Gualtieri*.

* Ind. tellas.

31. Un Madrépore blanc en buisson, de six N°.30. pouces & demi de diamètre, d'une forme arrondie très-agréable, à branches minces & petites, partant en grand nombre d'un même tronc d'où elles s'élevent en tout sens. Elles sont chargées de Tubules saillantes, étoilées endedans comme les espéces précédentes.

32. Un autre Madrépore en buisson, à branches plus grosses, & d'un beau blanc de neige, de forme presque ronde & de la plus parfaite conservation. Il a dix pouces de diamètre, & est porté naturellement sur son pied qui est aussi garni de Tubules, mais moins saillantes que celles des branches. 82.

33. Un autre Madrépore en buisson, de couleur grise, ayant près d'un pied de diamètre. Il est pareillement porté sur une base de même nature que le reste. 18.

34. Un beau Madrépore branchu, blanc sale mêlé de rouge, à branches épaisses, tuberculeuses qui s'élevent ensemble de la tige dans Madré- une direction presque verticale, larges & sourpores chues aux extrêmités. Leur surface est entiere-

* Gualtieri ment couverte de petits pores étoilés *. Il porte ind. test. N°. neuf pouces & demi de haut sur huit & demi de large. 24.

35. Un très-beau Madrépore de la même espéce, blanc-sauve, à branches plus nombreuses, dont les principales se subdivisent en d'autres plus petites & comprimées qui s'étendent en différent sons se initiant les Chaus sur deux se différent sons se initiant les Chaus sur deux se

*Idem. N° en différens sens, & imitent les Choux fleurs *.

Il a onze pouces de haut sur presque autant de large. 50"

36. Un autre de même espèce d'un très-beau blanc, de forme ovale. Son plus grand diamètre est de neuf pouces & demi, & sa hauteur de cinq pouces & demi. 116. 10.

37. Un autre d'un blanc-jaunâtre, à branches plus larges, plus applaties & plus éparses, mais du reste semblable au précédent. Il adhére à un autre Madrépore de forme orbiculaire, dont toute la surface est parsemée de petites étoiles, & qui lui sert de base. Ce morceau, des plus agréables, a dix pouces de haut sur quatorze de large. 72.

38. Deux Madrépores de moyenne grandeur, dont un blanc rougeâtre, en forme de buisson, à petites branches qui se subdivissent de tous côtés en d'autres plus perites à plusieurs sourches, & adhérent à une branche de l'es-

péce

pèce décrite Art. 27, sous le nom de Bois de MADRÉ-Cerf. L'autre est de même espéce que celui de l'Art. 35. 18".1.

39. Deux autres de moyenne grandeur, dont un de l'espéce du premier de l'Art. précédent, & un de celle de l'Art. 33.15. 18.

40. Un autre Madrépore blanc, en buisson, à branches fort serrées, fourchues & tuberculeuses. Cette espéce paroît tenir le milieu entre celle de l'Art. 35 & la premiere de l'Art. 38.48.11.

41. Un Madrépore gris, à rameaux arrondis, fort serrés les uns contre les autres, épais, mousses & noueux aux extrêmités, parsemés de pores étoilés, très-petits. On remarque à sa base * & sur quelques-unes de ses branches, des * séba, tom: Madrépores agaries qui s'y font attachés. Ce No. 11. morceau, qui a cinq pouces & demi de haut sur huit de large, est fort grand pour son espéce. 12.

42. Deux Madrépores en buisson, dont un de moyenne grandeur, blanc-jaunâtre, à branches sinueuses & tortues qui se joignent par les côtés en façon de treillis. Elles sont hérissées de tubules & chargées de petits rameaux qui forment, en s'élevant, une espèce de coupe à bords évafés; & un de l'espéce du premier de l'Art. 38. 12".1!

43. Deux autres, dont un de l'espéce du premier de l'Article précédent, & un de celle de l'Art. 35. 7.1.

Tome I.

18 44. Un grand & rare Madrépore gris-obscur; MADRÉà rameaux larges & applatis, femblables aux PORES. Cornes de Daim; leur superficie est hérissée * séba, tom de tubules *. Ce morceau porte un pied de haut sur dix-huit pouces de large. 18. 3, pl. 113.

45. Un autre, blanc-sale, ressemblant à une grande feuille contournée, dont les bords fe rapprochent un peu en forme de cornet. On remarque çà & là dans l'intérieur quelques rejettons de la même forme. Ce Madrépore est couvert de tubules fort faillantes, & connu fous le nom de Char de Neptune, il porte vingt-& un pouces de haut sur vingt de large. 100.

46. Un autre Char de Neptune de moyenne grandeur. 7.10!

47. Deux jolis Madrépores de moyenne grandeur, dont un d'Amérique, rare, de forme mince & applatie, semblable à l'Agaric, à surface supérieure couverte de sillons ondu-* scha, pl. leux & étoilés *, & un de l'espéce de l'Article précédent, mais de couleur plus blanche. 6." 110, Nº. 6

48. Un Madrépore agaric de forme trèsgracieuse; différent du précédent en ce que ses feuilles font en grand nombre, & ont nonseulement la surface supérieure, mais encore l'inférieure couverte des mêmes fillons ondu-

* séba, ibid-leux & étoilés *. Il porte dix pouces de haut sur neuf de large. 72". 1.

différence. 3.4!

49. Un autre de même espéce, mais de forme MADRÉ-

50. Un Madrépore agaric en forme d'éventail. 3.10.

51. Un autre à plusieurs feuilles, diversement contournées. 7.8.

52. Un Madrépore, nommé Calice ou Taffe, fait en forme d'entonnoir, & duquel les furfaces intérieure & extérieure sont légerement cannelées & hérissées de petits trous étoilés peu Saillans *. 35 . 2.

53. Cinq petits Madrépores rares & d'ef-Gualtieri, inpeces différentes; sçavoir, un à petites bran- dex testar. ches chargées de rejettons tortus & frisés, difposés en éventail & couverts de petits grains arrondis & inégaux dont ils paroissent hérissés * . * Gualtieri, ind. telt. N°. Un en forme d'If, à tige principale environnée 121. dans toute sa longueur de petites branches alternes & fourchues, forées à l'extrêmité de tubules plus fensibles que dans les autres parties. Un en petit buisson, à branches arrondies, se croisant & s'entrelaçant de maniere à former une espèce de réseau à jour malgré son épaisseur. Elles sont parsemées de petits pores étoilés. Un à femilles crêpues & fort serrées, parsemées en entier de pores étoilés très-fenfibles. Et un en forme d'Agaric, d'une espèce particuliere. La surface supérieure de ses feuilles est criblée çà & là de larges & profondes ctoiles, légerement faillantes, & dont les stries

Bij

PORES.

prolongent sur les parties des feuilles qui en sont dépourvues. On y remarque aussi quelques gros tubercules striés comme le reste. 35.7-

54. Trois petits Madrépores; sçavoir, un Agaric à surface extérieure parsemée de pores étoilés peu saillans, assez larges, & dont les stries sont en-dedans, adhérant à un gros gallet qui sert aussi de support à quelques Astroites & à un petit Madrépore, peu différent du second de l'Article précédent; un de l'espéce du premier de l'Article 38, formant un petit bouquet sur un autre Madrépore auquel il adhére; & un de l'espéce du quatriéme de l'article précédent. 38 s

55. Quatre petits Madrépores; sçavoir, un rare de Curação, à branches peu nombreuses, larges, épaisses, tuberculeuses, dont l'extrêmité est applatie & comprimée. Toute sa superficie est couverte de pores étoilés comme l'espéce de l'Art. 41, dont il paroît être une variété. Un Madrépore agarie, semblable au premier de l'Art. 47. Un Madrépore branchu de l'espéce décrite Art. 41; & un semblable au second de l'Article précédent. 13.2!

55 (bis). Un Madrépore Agaric blane, très. rare, à partie supérieure, revêtue de protubérances cylindriques grosses, étoilées, plus ou moins saillantes, formées de lames très finement dentelées, qui en rendent la furface comme veloutée. La partie inférieure ne différe en rien de celle des

autres Madrépores Agarics. Ce morceau curieux nous est arrivé depuis peu des Indes. 75". 15".

GENRE TROISIÉME. ASTROÏTES.

OLYPIERS de la nature des précédens, & qui n'en différent que par leur Astroïtes. structure. Ils sont composés de subes parallèles joints ensemble par leurs côtés, & dont la cavité est remplie de plusieurs lames qui partent de leurs parois & vont aboutir à un centre, ce qui forme des étoiles rondes, ovales ou anguleuses plus ou moins grandes & à plus ou moins de rayons. Les Astroïtes différent des Madrépores en ce qu'ils ont des pores étoilés joints & parallèles qui n'en font qu'une seule masse, & des Tubipores, en ce que ceux ci ont des tubes fourchus & irréguliers fort faillans & non parallèles. Les Polypes des Astroîtes occupent l'extrêmité des cellules comme dans les Madrépores.

56. Un très-bel Astroite oblong, à partie supérieure convexe, & inférieure applatie, à B iij Astroites grandes étoiles orbiculaires bordées de petits jets saillants qui se répandent de tous côtés dans * Seba, pl. les interstices des étoiles *. Il porte seize pouces

de long sur neuf de large. 220.1.

57. Un bel Astroïte globuleux, à petites étoiles radiées, qui vont en pente vers le mi-

* Seba, pl. lieu, & dont les bords ne sont point frangés *. Ce morceau, d'une beauté singuliere, est de forme orbiculaire applatie, & groupé avec un autre de même espéce & de même forme auquel il tient par une espéce d'étranglement. Ce groupe est encore embelli par un grand Millepore feuillu, étendu en forme d'éventail, & par un Madrépore agaric de l'espèce décrite Art. 47. Le tout porte vingt & un pouces de long sur quatorze de large. 230.1.

58. Un Astroite globuleux à pores étoilés, amples, non-arrondis, mais anguleux; les jets * S-ba, pl. dont ils font bordés font minces & élevés *. Il 111. Nº. 10. adhére à un joli Madrépore en buisson de l'espéce de l'Art. 31, & porte neuf pouces de haut

fur sept de large. 18."

59. Deux Astroites, dont un en forme de calotte tuberculeuse, parsemée de petits pores * 5°ba, pl. éroilés fort nombreux *, & posée naturelle-112, N°. 18. ment sur une base de même nature & un peu feuilletée. Cet Astroite vient de Curação, où il est connu sous les noms de Tête de More, ou de Perruque à l'Angloise. L'autre est de même

espéce, mais en forme de rocher, & percé çà ASTROÏTES. & là de tubes cylindriques très-prosonds qui paroissent l'ouvrage de quelques Polypes para-

sites qui s'y logent. 20 . 8!

60. Un autre en forme de monticule creusée par de profonds & larges fillons, inégaux entr'eux. Cet astroite à petites étoiles, & de même espéce que le précédent, a été trouvé sur la patte d'un ancre de vaisseau dans les Indes Orientales. Il adhére dans toute sa base à une plaque du ser de l'ancre sur laquelle il s'est formé, ce qui le rend fort curieux.

61. Un Astroite mince & seuilleté en forme d'Agaric. La surface supérieure de ses seuilles est parsemée de petits pores étoilés fort nombreux comme l'espèce de l'Article précédent dont il paroît être une variété. Il est de sigure arrondie, & porte treize pouces de diamètre. 19

62. Deux Astroïtes globuleux, rares & d'une belle grandeur, dont un à larges & très profondes étoiles irrégulieres, dont les bords sont 'minces & élevés; & un à étoiles arrondies, dont les bords larges & lamelleux sont séparés par de petits intervalles sur lesquels les lames se prolongent *. 36.1.

63. Dix Astroïtes de diverses grandeurs; fçavoir, deux à larges étoiles arrondies de l'espéce de celles de l'Article précédent; trois à étoiles arrondies, mais plus petites & de l'es-

Biv

* Seba, pl 12. N°. 15, ASTROÎTES. péce de l'Article 56; un de l'espéce de l'Artis 57; un en sorme de poire à étoiles irrégulières, de l'espéce de celles de l'Article 58, mais dont les bords sont plus larges; deux de sorme globuleuse un peu tuberculée, à très-petites étoiles, de l'espéce de l'Article 59; & un coupé en dissérens sens pour faire voir le méchanisme des cellules intérieures.

GENRE QUATRIÉME.

TUBIPORES.

différe en rien des précédens. On ne les en distingue qu'à cause de leurs petits tuyaux fort saillants, quelquesois bisourchus, ramassés en une masse solide en forme de buisson. Ces tuyaux sont étoilés comme ceux des Astroïtes, mais au lieu d'être joints ensemble par leurs côtés, ils sont isolés en partie & ne sont joints que par leur base. L'animal occupe la même place que dans le Genre précédent.

64. Un très-beau Tubipore de la Méditer-

ranée en forme de buisson, à tuyaux longs, Tubipores bisourchus, isolés, & prosondément étoilés: ils s'élevent en tout sens d'un centre commun, qui leur sert de base; ce morceau porte cinq pouces de haut sur six de large, & est grand dans son espèce *. 40."

engagés en partie dans une concrétion pierreuse, qui leur donne une forme orbiculaire * . * Seba, pli Ces tuyaux fortent plus ou moins de la matière pierreuse qui les enveloppe, & sont plus épars que dans l'espèce précédente dont ils sont une variété, 19.

65 (bis). Un autre aussi des Indes, mais rare, à tuyaux plus gros, plus saillans & à étoiles sormées de lames minces, déliées, presque perpendiculaires, & disposées à-peu près comme dans l'Œillet de Mer. 48.



GENRE CINQUIÉME.

MILLEPORES.

MILLE-PORES. drépores, des Aftroîtes & des Tubipores, en ce que dans ceux-ci les étoiles se présentent d'une manière très-distincte, au lieu que les Millepores n'ont que des trous simples non-étoilés, du moins ils ne le paroissent pas à l'œil. Ces Polypiers ont communément la forme d'arbre ou de buisson, rameux ou feuillus comme les Madrépores : leur superficie est couverte de petits trous quelquesois peu sensibles, même à la loupe, qui pénétrent dans l'intérieur, & servent de retraite aux animaux qui les bâtissent.

66. Un rare & beau Millepore de Curação, à feuilles blanchâtres, larges, minces, étendues & piquées de petits trous ronds; il reffemble à un grand choux qui ne feroit pas pommé, ce qui peut le faire appeller Millepore à feuilles de Choux. L'huître extraordinaire

dont parle Séba * peut donner une idée des feuilles de ce Millepore, que nous n'avons trouvé rores. gravé dans aucun Auteur. 100.1.

67. Un autre de même espéce, mais à seuilles plus épaisses, moins éparpillées & plus serrées, dont les extrémités ont des plis & replis qui imitent la fraise de veau. Il a quinze pouces

de haut sur dix-huit de large. 119". 19.

68. Un beau Millepore de Curação, de même hauteur & largeur que le précédent, à grandes feuilles travaillées à jour, profondément dentelées & frangées dans leurs extrémités. 100.

69. Un autre de même espéce, adhérent à une grosse Cérébrite, qui lui sert de support. Ce groupe magnisique est encore embelli par dissérentes espéces d'Astroïtes & de Méandrites naissantes qui sont au pied. Il porte quinze pouces de haut sur un pied de large. 30.

70 Un autre Millepore de forme très-agréable, à feuilles aplatties, minces, nombreuses & profondément découpées. Il porte treize pouces de large sur huit de haut, & est monté

sur un pied de bois doré: 37."

71. Deux Variétés de cette espèce, dont une à dentelures plus allongées, plus droites, & en forme de petites mains étendues, qui l'ont fait appeller Digitata; l'autre incruste les branches

MILLEPO- d'un Lithophyte porté sur un petit pied de bois marbré. 15"

72. Deux autres Variétés de moyenne grandeur, dont une en éventail, à branches applaties, s'entrelaçant en façon de grillage, & une moins évafée, ayant pour base naturelle un groupe d'Astroïtes & de Corallines, 15.19.

73. Un autre de même espéce, mais trèsremarquable, en ce qu'il s'est formé sur une
grosse bouteille, dont il revêt la superficie.
Toutes les branches seuillues de ce Millepore
sont adhérentes au goulot de la bouteille, d'où
elles s'étendent en dissérens sens & forment un
bouquet aussi agréable que curieux. Les Polypes ont étendu leur ouvrage tout autour des
bords du goulot, sans en sermer l'orifice ni
pénétrer en-dedans, comme on s'en est assuré
par une ouverture pratiquée au ventre de la
bouteille pour voir dans l'intérieur. Ce morceau intéressant a été pêché à la Barbade. 600.

74. Un beau Millepore en buisson, à branches moins applaties, dont les extrémités se terminent en rameaux bisourchus, arrondis & pointus. Il porte dix pouces de haut sur quinze

de large. 60",

75. Un grand Millepore des Indes, rare & des mieux conservés, à branches chargées de rameaux nombreux & délicats, diversement contournés, s'entrelaçant les uns dans les au-

SOLIDES OU PIERREUX. tres, & formant un buisson des plus épais, MILLEPOd'une figure agréable. Ce morceau a quinze RES. pouces de long sur quatorze de large. 240.1?

75 (bis). Trois jolis Millepores, dont un à branches courtes & rondes, qui se divisent en plusieurs petits rameaux fourchus & comprimés : un à branches applaties, dont les ramifications se partagent comme le bois de Cerf, ce qui lui en a fait donner le nom *, & un à bran- * Marsigly; ches arrondies, d'un gris verdâtre, granuleu Mer, pl. 33, ses, chargées de petits rameaux très - délicats fig. 160. disposés en forme d'éventail *. 6". 1"

* Ibid. fig.



GENRE SIXIÉME.

RETÉPORES ET ESCARRES PIERREUSES.

Rétépores & Es Polypiers qui approchent beaucoup des Millepores pour la forme de leurs trous, n'en dissérent que parce qu'ils sont à seuilles plates & irrégulières en forme de dentelle, d'écorce ou d'éventail: Leur substance est mince, poreuse & percée ou piquée d'une infinité de trous, dont les uns sont à jour & très-sensibles, les autres le sont moins, & les autres sont à peine visibles. C'est dans ces petites cavités que logent les animalcules.

76. Un beau Rétépore de la Méditerranée d'un blanc rougeâtre nommé Manchettes de Neptune; il est à larges feuilles, minces, & délicates, percées à jour de trous ovales com-* Seba, tom. me de la dentelle *. Ce morceau, qui a quatre 3, tab. 101, pouces & demi de haut fur fix & demi de large, est rare de cette grandeur. 12.1.

77. Quatre autres Escarres pierreuses ou frondipores de belle grandeur; sçavoir, une à larges

SOLIDES OU PIERREUX.

-31

feuilles, dont les bords se joignent ensemble Rétépores irrégulièrement de côté & d'autre, & dont les deux superficies sont composées de cellules ovales *. Une de même espèce groupée avec de * Ellis Cogros tubes vermiculaires, diversement entor-No. 30, tillés sur un gallet, qui leur sert de base, & deux Escarres à plusieurs seuilles couchées les unes sur les autres en forme d'Agaric, dont les petits pores sont à peine visibles, même à la loupe *. 8. 6.

78. Huit petites Escarres, tant Rétépores que nat. p. 600. Frondipores; fçavoir, un Frondipore en façon d'écorce ou de croûte piquée de petits points comme de trous d'aiguille, formant plusieurs couches concentriques sur une branche de Fucus. Un dont les petites branches applaties ressemblent aux Cornes de Daim, & lui en ont fait donner le nom; un de l'espéce des deux premiers de l'article précédent; un à trèspetits pores de l'espéce des deux derniers du même article, mais en forme de bouquet. Trois Rétépores dentelles, dont deux de l'espécé & couleur de celui de l'article 76, & le troisiéme des Indes, d'un très-beau blanc à pores moins ouverts *. Un Rétépore à larges mailles chargées de petits nœuds granulés, imitant un filet, 100, No. 11. & différent de toutes les espéces précédentes. 11.12.

79. Six autres Escarres pierreuses, dont une en forme d'écorce incrustant une grosse épon-

32 POLYPIERS.

ge; une de l'espéce de la premiere de l'arti-Rétépores cle 77; deux de celle de l'article 76; & deux à larges mailles, comme la derniere de l'article précédent. 77,6.

GENRE SEPTIÉME.

MÉANDRITES.

DOLYPIERS qui différent des précéMéandri- dens en ce qu'ils ne sont ni liss, ni
poreux, ni étoilés, mais prosondément
sillonnés de différentes manières : ils
sont ordinairement de sorme orbiculaire avec des amfractuosités sur la surface & aux extrémités qui représentent
des Ondes, des Vermisseaux ou un Cerveau humain, ce qui leur a fait aussi
donner le nom de Cérébrites. L'animal
occupe la superficie comme dans les
Madrépores.

80. Une très-grosse Méandrite d'Amérique de forme orbiculaire, à côtes minces, aigues, sinueuses, & lamelleuses, laissant des inter-valles peu larges, au milieu desquels les lames viennent

POLYPIERS.

viennent aboutir *. Elle porte dix pouces & MEANDRI-

demi de diametre, & adhère à un grand Panache TES. de mer. 60". 1!

81. Une grosse Méandrite, à côtes plus éle- Nº 44 vées que la précédente, d'une forme très-particuliere. Outre les sinuosités qui sont propres à ce genre, elle est encore traversée par de larges amfractuosités très - profondes, qui la font ressembler à un groupe de plusieurs Méandrites posées les unes sur les autres. 18."

82. Deux autres Méandrites à côtes minces; dont une a la forme du gros Coco de mer des Maldives qui représente deux fesses. Les côtes dont elle est fillonnée sont garnies de lames dentelées & faillantes. L'autre, qui ressemble au fabot d'un cheval, a les côtes moins lamelleuses & un peu plus épaisses *. 12.1.

83. Une autre de forme orbiculaire, à côtes plus épaisses que les précédentes, laissant de larges intervalles, chargés de lames dentelées; Son diametre est de sept pouces * 6"1.

84. Trois autres assez grandes & des espéces ci-dessus décrites. 6. 2 ?

85. Six autres, dont quatre de moyenne grandeur & deux petites; sçavoir, une en forme de Priapolite, à bandes larges & applaties dont les contours tortueux forment par intervalles des étoiles *. Cette variété est rare & curieuse. Une de la Vera-Crux, à côtes minces x12. No. 6.

Tome I.

* Séba ; pla 112. Nº . 76

* Seba , pl.

Méandai- & de couleur rougeâtre ; & quatre de l'espéce de l'Art. 80, dont les deux petites paroissent

être une variété. 7.7.

86. Une magnifique Méandrite orbiculaire, à bandes très-faillantes, plus larges & d'une structure plus serrée que les sillons qui les séparent. Ces bandes ont ceci de particulier, qu'au lieu d'aller en s'étrecissant vers le sommet, comme dans les autres espéces, elles sont creusées en gouttieres, s'étrecissent vers la base & forment comme autant de ruisseaux tortueux dont le lit est plus ou moins large. Cette espéce n'est pas commune, celle que nous citons * 1bid. tab. de Séba * en approche; mais les bandes en pa-

roissent plus petites & les interstices plus larges que dans la nôtre, qui a sept pouces de diamètre. 50".1.

87. Une autre de même espéce, de trois pouces & demi de diamètre. 36. 10

88. Une autre de forme oblongue & de même espéce, à bandes encore plus larges. Elle tient le milieu pour la grosseur entre les deux précédentes. 46."

89. Une belle Méandrite de forme sphéroïdale applatie, à côtes épaisses par la base, minces & canelées à leur extrêmité, séparées par * 56ba, pl. de profonds & larges fillons lamelleux *. Elle porte onze pouces de diamètre. Cette espéce

a beaucoup de ressemblance, par sa partie in-

SOLIDES OU PIERREUX.

férieure, à l'espéce de Fongipore, appellée Œitlet de mer : elle est, comme lui, garnie d'un TES. pédicule, & n'en différe qu'en ce que ses cali-

ces se joignent ensemble & forment une seule masse, dont la partie supérieure est sillonnée & ondulée. Nous avons cru pouvoir la ranger dans ce genre avec d'autant plus de fondement qu'elle paroît servir de passage aux véritables Champignons de mer, dont nous parlerons dans le suivant. 80. 1.

90. Une autre de même espéce, de forme ovoide applatie. Elle différe de la précédente en ce que l'extrêmité de ses côtes, au lieu d'être creusée par un petit sillon, est garnie d'une fuite de petites cellules formées par l'extrêmité des lames qui se joignent. Elle est encore remarquable par un grand trou à bords lamelleux en forme d'Umbilic, placé vers le milieu de sa surface supérieure. Ce beau morceau, qui a neuf pouces & demi de long fur fix & demi de large, est dans une boëte vitrée. 49.

91. Une autre de l'espèce de l'Art. 89, mais plus petite *. 15". 3.

92. Quatre autres jolies Méandrites qui sont ind. test. No. des variétés des précédentes; sçavoir, une à côtes minces garnies de lames larges & trèsfines; une à plis groffiers & lamelleux, dont les interstices sont très-profonds *; & deux de * Séba, pl, forme ovoïde, à bords élevés & repliés, en

* Gualrier

MÉANDRI. forme de festons, dont les jointures sont plus ou moins serrées; & les intervalles des plis gar-

* séba, ibid. nis de lames plus ou moins larges *. 30".

pl. 112. No. 23 -- 27. Muſæum

Richter, tab. 24. Litt. C.

GENRE HUITIÉME.

FONGIPORES.

Fongiro- L'OLYPIERS de substance dure & pierreuse, comme les précédens. Ce qui RES. les différencie est leur structure lamelleuse ou feuilletée, & plus ou moins femblable à un Champignon terrestre dont la partie inférieure seroit en-dessus. Les espéces en sont fort nombreuses; les unes sont à lames dentelées, les autres à lames unies. Les Polypes habitent les interstices des lames.

93. Un très-beau Fongipore en bouquet; des Indes Orientales, connu sous le nom d'Œillet de mer. Les Oeillets dont ce pied est garni 26.4. soilleurs ? * séba, pl. saillantes & pointues, & à petites dentelures *. 94. Trois autres Fongipores en bouquet 109: Nº . 6. sçavoir, un à Oeillets de forme regulière & arrondie, garnis, tant dans le calice que le long

de la tige, de lames à grandes dentelures *; un Fonciroà Oeillets plus petits, & à dentelures de lames RES. peu sensibles *; & un à sleurs, de même forme 109. No. 2 que celles de l'Art. précédent, mais plus peti- No. 1. tes & très-semblables aux véritables Oeillets. 7. 4.

95. Trois autres Variétés; sçavoir, une à trois plis réguliers, comme les bords d'un chapeau; une à huit plis, comme celle représentée dans Séba *, mais de forme arrondie & plus * Ibid. pl. ramassée; & une à un seul calice de forme ovale & comprimée, qui tient à un long pédicule. Cette derniere vient de Curação, les deux autres sont des Indes. 4. 2!

96. Trois autres Oeillets de mer, des Indes, dont un en bouquet de forme un peu sinueuse & fort applatie; un de forme ovale & applatie, à lames très-larges & dentelées, adhérant à un gros fucus qui lui sert de pédicule *. Le *Séba, pl. dernier approche du précédent, & tient à un lett. A. Caillou avec quelques Astroites *. 5" 16!

97. Trois Fongipores en bouquet, à branches comprimées, des Variétés déja décrites, l'un à grands Oeillets, l'autre à petits *, & l'au- * Séba, pl. tre de moyenne grandeur. 5.

98. Neuf Variétés intéressantes; sçavoir, 1°. des Caryophilloïdes en bouquet *. 2°. Six * Rumphius Caryophilloides détachés, dont un lisse à calice part. 6, tab. profond, un articulé, trois striés*, & un à ca
87, N°. 3.

10. des Caryophilloides détachés, dont un lisse à calice part. 6, tab. profond, un articulé, trois striés*, & un à ca
87, N°. 3.

11. des Caryophilloides détachés, dont un lisse à calice part. 6, tab. lice, en partie fermé & en partie ouvert. Tous,

* Séba , pl.

* Ibid. pla

Ciij

Fongipo- excepté celui-ci, adhérent à de petites branches de Corail rouge. 3°. Un Fongipore rare, de forme ovale comprimée, dont la circonférence est garnie de lames plus ou moins grandes & non dentelées, chaque interstice des grandes lames en contient trois plus petites & moins saillantes. 4°. Deux petits Boutons étoilés, qui sont l'analogue marin des Porpites. 5°. Deux Oeillets des espéces déja décrites. 19.

> 99. Six gros Oeillets, rapportés en forme de bouquet sur une tige, où ils sont placés d'une maniere fort naturelle. Le pied de la tige est garni d'astroites & de glands de mer. 16.3

> 100. Un très - rare Fongipore, appellé le Chou de mer. Il est du plus beau blanc, à feuilles papiracées, frisées & dentelées, dont les deux surfaces sont couvertes de lames longitudinales. Ce morceau, qui est d'une beauté finguliere & très-grand dans son espèce, porte cinq pouces de haut sur sept de large. 200.1.

101. Un de même espéce, mais plus petit *. 102. Idem. 24:1.

> 103. Le grand Bonnet de Neptune, ou la Mitre Polonoise, de forme arrondie & trèsgracieuse. Sa partie convexe est terminée par un gros tubercule en façon de Bouton, d'où partent, en tout sens, des lames minces fort ferrées, dont les dentelures très-faillantes for

ment, de distance en distance, de petits Tuber- Fongirocules étoilés, qui le distinguent des autres es- RES. péces. Sa partie concave est garnie de stries granuleuses & pointues *. Ce rare morceau a *Rumphius herbar. Amb. cinq pouces de haut fur huit de large. 120".

104. Un autre de même espéce, mais plus N°. 3. Mém. petit, qui en différe d'ailleurs en ce qu'il n'a scan. 1700, p.

point de bouton à fon sommet. 29"1:

105. Un beau Champignon de mer, de forme arrondie un peu conique, à lames minces, larges, légérement dentelées, partant d'une fente profonde qui est au sommet de la partie convexe, & allant aboutir en droite ligne à la circonférence, où elles se replient pour remonter au sommet de la partie concave. Il est plus grand que celui que nous citons *. 9.

106. Un autre de même espéce & à peu-près de même forme, mais un peu plus grand. Les lames dentelées y sont disposées d'une maniere régulière, & forment, vers le fommet, quelques plis & replis semblables à la fraise de veau. 6 tunos animen al esganti animi s care

107. Deux champignons de moyenne grandeur, de forme moins convexe, mais d'ailleurs femblables à ceux des Art. 105 & 106. L'un des deux est de plus remarquable par huit petits Champignons naissants qui adhérent à sa par-The section is the section of the se tie concave. 17.

108. Deux autres Champignons de même Civ

* Séba, pt;

Fongipo, grandeur, dont un a sa partie concave enrichie de huit pet is Champignons en forme d'œillets; l'autre ne différe des précédens qu'ence qu'il est de forme applatie. 15.

109. Deux Champignons de forme oblongue, à partie supérieure convexe & inférieure applatie. L'un est à lames minces, droites & * séba, pl. légerement dentelées *; l'autre en différe par 112, Nº. 29. ses lames sinueuses & entrecoupées qui lui don-

nent un œil chatoyant, 6".

110. Un grand Fongipore de l'espéce des Bonnets de Neptune, de forme ovoide allongée, très-convexe, à sommet traversé d'un fillon peu profond, à lames dentelées, non continues, mais par boucles irrégulières, imitant assez la toison d'un mouton, & à bords fes-* séba, pl. tonnés, un peu comprimés vers le milieu *;

Att, No. 1 il porte 16 pouces de long sur 5 & demi de haut, 5 dans sa plus grande largeur, & 3 dans l'étranglement du milieu, 299". 19.

111. Un autre Fongipore de forme oblongue, moins allongée & moins convexe, appellé la grande limace; ses lames sont, comme dans le précédent, interrompues dans leur direction; mais à écailles plus grandes, légèrement dentelées, & formant à la partie supé-* séba, pl. rieure un sillon assez profond *. Ce morceau porte un pied de long sur quatre pouces de large. 48" 3.

SOLIDES OU PIERREUX.

me très-allongée, ayant plus de 11 pouces de RES.

long sur 3 de large. 36". 1?

gée, différent des précédens, en ce qu'il est couvert de lames écailleuses très-petites, environnées d'autres plus minces, & plus enfoncées, qui partent de différens centres. Il a pouces de long sur 4 de large, & ressemble assez, quand il est sur fa base, à un chien accroupi sur ses quatre pattes, dont la queue seroit repliée en-dessous. 240.

mes minces, écailleuses, droites, fort serrées les unes contre les autres; on voit sur le milieu du dos un sillon sait en pente, garni de lames radiées *. Ce joli champignon est connu sous le nom de Taupe Marine ou de Che-& pl. 112, N°. 6

nille. 18". 15

bé de façon qu'il ressemble parfaitement à une grosse chenille pliée en deux, dont la tête & la queue e rapprochent. 80.

& fort convexe, différent de tous ceux cidessus décrits, en ce qu'au lieu du sillon plus ou moins profond dont ils sont pourvus, celui-ci est garni de lames à grandes denteluFONGIPO- res & parallèles qui s'étendent dans toute sa longueur, & se prolongent jusqu'aux bords. Celles des côtés sont disposées comme dans l'espéce de l'art. 105. 18.





ORDRE SECOND.

______ POLIPIERS

DE SUBSTANCE MOLLE OU FLEXIBLE.

GENRE PREMIER.

FAUX CORAUX.

OLYPIERS qui sont en général d'une substance moins dure que les précédens, quoiqu'il s'en rencontre quelques espéces d'une dureté assez considérable. Nous avons cru devoir comprendre dans ce Genre toutes celles qui ne conviennent à aucuns des Genres cidessus décrits; de ce nombre sont les faux Coraux articulés, dont la subsrance alternativement dure & flexible paroît servir de passage du premier au second Ordre. Les Polypiers de ce Genre différent des vrais Coraux en ce

FAUX Co- qu'ils sont plus cassants & d'une substance cornée ou moins serrée. Ils différent des Madrépores, Millepores, &c. en ce qu'on n'y voit point de pores ni d'étoiles. Il y en a de beaucoup d'espéces qui sont toutes en forme d'Arbrisseau. mais qui différent en grandeur, en couleur & en dureté. Les Polypes habitent la superficie des branches & du tronc.

117. Trois faux Coraux, dont un rare; en buisson, à branches fines, arrondies, articulées, blanches, & se divisant en petits rameaux qui partent plusieurs ensemble de la même articulation en forme d'étoiles, & font en s'entrelaçant une masse fort toussue. Les deux autres sont à petits rameaux arrondis, courts, non articulés, & adhèrent chacun à un petit coquillage du genre des Sabots. qui est aussi recouvert de la même substance * séba, pl. blanchâtre *. Cette circonstance, jointe au défaut de pores, de cavités, & d'écorce celluleuse, pourroit faire regarder ce faux Corail comme une véritable concrétion, s'il n'avoit d'ailleurs une organisation aussi réguliere que celle des autres Polypiers, 10011

118. Trois variétés de faux Coraux de l'Isle de France, à branches fines, arrondies,

granuleuses, qui ne diffèrent que par leur FAUX Cocouleur, elle est blanche dans l'un, rouge RAUX. dans l'autre, & jonquille dans le troisiéme. Plus, deux faux Coraux blanchâtres, dont un à branches articulées, fourchues, granuleuses, & percées d'une petite cavité à l'extrémité; & un à très-petites branches ramassées ensemble en forme de pelotte, de l'espèce des deux derniers de l'article précédent. 12".

119. Cinq autres faux Coraux de même espéce, formant quatre variétés; sçavoir, un blanc - sale tirant un peu sur le lilas, à branches applaties & tuberculeuses, dont les extrémités sont fourchues & comprimées; un blanc-jaunâtre à branches arrondies, noueuses & fort serrées, dont les extrémités finissent en boutons, comme certaines Stalagmites; un à branches nombreuses, fines, granuleuses, bifourchues, de couleur blanche; & les deux autres à branches minces, arrondies, tuberculeuses, qui s'étendent en tout sens, & forment une masse orbiculaire *. 9. 2!

120. Un très-bel arbriffeau de faux Corail blanc articulé, dont les digitations sont d'une substance pierreuse, gris blanchâtre, assez profondément striées, & dont les articulations font presque lisses, petites, & d'une substance * Scha, pl. cornée, d'un brun noirâtre *; il porte 13 pou- Gualtieri. inces de haut sur 10 de large, 170. 12!

* Séba, ibid.

dex testar.

FAUX Co-RAUX.

121. Trois petits faux Coraux articules : l'un approche de l'espéce précédente, mais il en diffère par ses articulations qui sont beau-* seba, pl. coup plus groffes & plus larges *; l'autre est

Rumph. herb. le faux Corail rouge articulé *, & le troisséamb. tom. 6: me est une espèce particulière de couleur blan-tab. 84, litt. * Séba, pl. che, à branches fines, déliées, demi transpa-104, No. 1. rentes, dont les articulations, au lieu d'être enfoncées, sont plus saillantes que le reste; ce qui peut le faire nommer faux Corail noueux ou géniculé. Il se termine par un pédicule applati, & a beaucoup de ressemblance avec

* Séba, pl. celui que nous citons *. ? 6.3. 106. No. 4.



SECOND GENRE.

KÉRATOPHITES OU LITHOPHITES.

précédens, mais différens en ce qu'ils précédens, mais différens en ce qu'ils ou Lithofont d'une substance moins dure, plus phites.
flexible, & totalement cornée. Leurs
troncs & leurs branches sont ordinairement revêtus d'une espèce d'écorce
celluleuse & friable qui varie beaucoup,
soit pour la forme & l'épaisseur, soit
pour la couleur. C'est dans les trous de
cette écorce que logent les Polypes.
Les Kératophites, comme les Coraux,
se trouvent attachés à des rochers, à
des coquilles ou à d'autres corps durs,
auxquels ils adhérent par le moyen d'un
pédicule assez large qui leur sert de base.

122. Un très-grand Kératophite des Indes', connu sous le nom impropre de Corail Noir. Il est légèrement strié, & ses principales branches se divisent en un très-grand nombre de petits rameaux slexibles, dont les extrémités sont très-sines, d'un roux noirâtre, & demi-

KERATO- transparentes *. Il adhère par un gros & large PHITES pédicule à un Madrépore de l'espèce des Méan-OU LITHOdrites qui lui sert de base. Ce morceau a trois PHITES. * Seba, pl. pieds & demi de hauteur. 15"3.

123. Un Kératophite ou Corail noir de Malthe, lequel ne diffère du précédent que par ses branches, dont les extrémités, quoique très-déliées, ne sont nullement transparentes; il a près de deux pieds de hauteur. 10.

123. (bis). Cinquitres variétés de Corail noir : l'une est le vrai Corail noir, à rameaux peu nombreux, arrondis, d'une groffeur presque égale dans toute leur longueur, extrêmement lisses & luisans; l'autre est en forme d'éventail à rameaux applatis fort tortueux, légèrement striés, & d'un noir moins foncé. Les trois autres morceaux sont dépoutvus de branches, & ne consistent qu'en une tige plus ou moins grosse & tortueuse. Dans l'un, cette tige est de la grosseur du petit doigt, peu courbée, & parsemée de petits points rudes au toucher: l'autre est plus tortueuse, de la grosseur d'une plume à écrire, & comme chagrinée à la surface; l'autre enfin est encore plus fine, & s'étend en spirale comme un tire-bourre. Elle est revêtue d'une écorce blanchâtre & épi-

*séba, pl. neuse, chargée de petites escarres * & de rété-*14. No. 3. pores-dentellés. 7.6.

> 124. Deux autres Kératophites, dont un brun

platies, d'où partent, à distances é ales & phites ou dans une direction presque horisontale, plusieurs petits jets granuleux & pointus, qui lui ont fair donner le nom de Lithophite plume de Mer*, il a plus de deux pieds de hauteur; * Séba plusieurs petits prondère, est à tige ronde, droite, jettant de tous côtés quantité de rameaux courts, roides, déliés, épineux. Il est connu sous le nom de Cyprès Marin *, & a beaucoup de ressemblance avec les branches d'asperges. 13.

applaties, revêtues en partie de leur écorce celluleuse qui est d'un beau rouge de Corail. Les parties qui sont dépourvues de cette écorce, ont la couleur & la transparence de l'écaille.

Il porte deux pieds de haut. 3". 1!

à branches principales chargées de petits rameaux capillaires, revêtues d'une écorce tartareuse d'un rouge pâle, dont les cellules sont
très-petites & peu sensibles *. La substance cornée de ce Lithophite est d'un beau noir: il adhère hist phys. de
par sa base à une grande pierre fort pesante, fig. 83.
& porte deux pieds de haut sur autant de
large. 13. 1.

garnies dans toute leur longueur de jets nom-

breux & un peu recourbés; la ressemblance PHITES Ou singuliere qu'il a avec le Romarin lui en a fait Lithophi- donner le nom. Son écorce est d'un gris rougeâtre. Il adhere par sa base à un Astroite, & porte vingt pouces de haut sur seize de large. 3.6.

128. Un autre d'Amérique à branches moins droites, & chargées de jets beaucoup plus longs, qui, par leur flexibilité, forment une espéce de Panache. La couleur de l'écorce est d'un gris jaunâtre; il a trois pieds & demi de haut sur vingt pouces de large. 6.9.

129. Un de même hauteur, mais un pen

moins large. 5.1!

130. Un très-beau Kératophite à tige garnie de branches alternes, nombreuses, fléxibles, étendues en éventail, revêtues d'une écorce blanchâtre, dont les cellules sont fort saillantes & disposées autour de la tige, & des rejettons en forme de petites grappes à égale distance les * Marsigly unes des autres *. Ce morceau qui a deux pieds

pl. 20. fig. 94. de haut fur dix-sept pouces de large, est encore hist. de laMer. remarquable par une vingtaine de petites étoiles de mer, de l'espèce des Scolopendroides qui

y sont adhérentes. 5. 4.

131. Un Kératophite de Malthe, brun verdâtre, à branches principales, garnies aux extrêmités de petits rameaux capillaires très flexibles; il est de plus recommandable par deux huirres de l'espèce connue sous le nom d'Hiron.

delle, qui y sont adhérentes. Sa hauteur est de deux pieds sur autant de large. 3".

132. Un autre de Cadix, à tige se subdivi-Lithophisant en un petit nombre de jets droits & extrêmement longs, revêtus d'une écorce rougeâtre ; la substance intérieure de ce Lithophite est verdâtre. Il a trois pieds & demi de hauteur, & adhere à un rocher chargé de vermiculaires. 4.

133. Trois jolis Kératophites arbrisseaux peu communs; sçavoir, deux à substance intérieure opaque & noire dans les parties les plus grofses, transparente & couleur de corne aux extrêmités des branches qui sont applaties ; ils différent entre eux par l'écorce celluleuse dont ils sont revêtus. Elle est granuleuse & violette dans l'un, jaune ponctuée de pourpre dans l'autre; & un couleur de lilas, de l'espéce de celui de l'article 127, adhérent par sa base à une petite Huitre. //."

134. Quatre Kératophites; sçavoir, un en éventail, à branches principales se subdivisant en plusieurs rameaux qui montent droit en haut *. L'écorce tartareuse dont il est revêtu est - * séba , p. grisstre sur certaines branches, rouge de plomb lett. a. sur d'autres, épaisse, sistuleuse & verdâtre en quelques endroits. Un à branches tortueuses, couvertes d'une écorce noueuse, rouge pâle *. Un à écorce brune plus épaisse & à tubercules 106, n°.;. plus saillans; & un de l'espéce de celui de

Kérato- l'article 126, dont les branches sont chargées PHITES OU d'un groupe de vermiculaires, minces & déliés LITHOPHI comme des fils. 4.

135. Dix petits Kératophites; sçavoir, un à écorce grisatre, épaisse, un peu applatie, hérissée de tubules faillantes & friables. Un à branches chargées de rameaux longs, étroits, applatis, blanchâtres, & femblables aux feuilles de Lavande. Un couleur de lilas de l'efpéce du dernier de l'article 133. Un comme le premier de l'article précédent. Un en forme d'éventail & de couleur poupre, à rameaux plus nombreux, dont plusieurs se réunissent * Séba, pl. en s'abouchant *. Un à écorce jonquille, hérissée de tubules. Un à écorce noueuse d'un rouge pâle, de l'espece du second de l'article

variétés déjà décrites 12.1! 136. Un Kératophite de l'espèce décrite art. 126, adhérent par sa base à une grosse bouteille de terre, sur laquelle il s'est formé. 66.2.

précédent. Et trois à branches très-fines, des

137. Un Kératophite digité de la grande efpece, à branches de la groffeur du doigt, fourchues, couverres d'une ecorce grifatre fort épaisse, parsemée de tubules peu faillantes. Ce morceau qui vient d'Amérique, porte 17 pouces de haut sur autant de large. 19.1.

138. Un Kératophite digité d'Amérique, à branches moins groffes, dont les principales se partagent en deux plus petites, chacune desquelles se divise encore en deux, & celles-ci de PHITES OU même. Il est revêtu d'une ecorce épaisse, rouge TES.

& parsemée de pores très-sensibles comme certaines espéces de Madrépores. Il adhere à son rocher avec un Astroite, & porte près de deux

pieds de hauteur. 16."

139. Un Kératophite arbrisseau d'Amérique, revêtu d'une ecorce pierreuse, grisatre, ridée, annuleuse; ses branches sont garnies de deux rangs de petits rejettons, courts & disposés en forme d'arrête, qui sont probablement, ainsi que l'ecorce, l'ouvrage de Polypes d'un autre genre.Ce morceau porte deux pieds de hauteur. 12.

140. Deux autres Kératophites d'Amérique, dont un en forme d'éventail, à branches trèsnombreuses, grosses & peu flexibles, revêtues d'une écorce grisatre, épaisse & parsemée de petits trous; l'autre est en arbrisseau, & a quelquesunes de ses branches couvertes d'une ecorce tartareuse, épaisse & friable, d'un rouge pourpre, ayant tous les caracteres de ce genre de Polypiers: mais les autres branches ont servi de retraite à des animaux d'un autre genre qui s'y font attachés, & qui les ont recouvertes, les uns de l'incrustation grisatre & annuleuse de l'article précédent, les autres d'une incrustation pierreuse du genre des Millepores; cette derniere substance recouvre aussi plusieurs glands

Di

de mer qui s'étoient fixés sur ce Lithophites PHITES OU Ces divers accidens le rendent extrêmement LITHOPHI curieux. 14.1. TES.

141. Six Kératophites d'Amérique en forme d'éventail, dont trois revêtus d'une écorce brune, mais avec ces différences que dans l'un cet e écorce est parsemée de petites tubules qui ne d'bordent point la superficie; dans l'autre * Mém. de ces tubules sont saillantes & très-nombreuses *;

P. 34 pl. 2.

l'Académ des elles sont aussi saillantes, mais plus grosses & plus éparfes dans le troisiéme. Un à ecorce griscendré, applatie, & à pores peu saillans. Un à ecorce de même couleur, mais arrondie & parsemée de pores assez larges. * Et un de l'espéce

* Ibid. pl. 3, de celui de l'article 139. 6.4.

142. Deux grands Kératophites d'Amérique, dont un digité de l'espèce de celui de l'art. 138, adhérent à un rocher formé de concrétions marines qui lui sert de support. L'autre est de l'espèce du quatriéme de l'article précedent. 7.10!

143. Un magnifique Panache de mer d'Amérique, se partageant dès la racine en plusieurs rameaux anguleux, chargés d'un g and nombre d'autres, dont les extrêmités s'entrelacent * Marfigly, en forme de res *. Il est couvert d'une ecorce

pl. 19, fig. 86. couleur de li'as, ainsi que les petits rejettons qui y adhérent, & porte trois pieds de haut sur autant de large. 10.19.

MOUX OU FLEXIBLES.

144. Un Kératophite à branches reticulées, Kératoqui ne differe du précédent que par son ecorce PHITES OU qui est de couleur jaune. Il a quarante pouces TES. de haut sur plus de deux pieds de large. 7: 12!

145. Deux autres Kératophites à panache, dont un est totalement incrusté d'une matiere grifâtre & pierreuse, de l'espèce de celle de l'arricle 139, ce qui le rend fort pésant; l'autre est de l'espèce de l'article précédent, & adhére à une concrétion pierreuse. 10.



TROISIEME ET QUATRIEME GENRE.

CORALLINES ET ESCARES MOLLES.

CORALLIou crustacée, ou pierreuse, qui ont la forme de plantes, & qui sont composées de plusieurs branches minces, subdivisées en fines ramifications, comme quelques espéces de mousses, ce qui les avoit fait ranger dans cette classe par les Botanistes, avant les découvertes de M. Ellis. Cet habile Observateur les distingue en vésiculeuses, en tubuleuses, en celluleuses & en arriculées *. Comme son de Phist. nat. ouvrage est entre les mains de tout le des Corallines.

200. La Haye monde, nous ne dirons rien ici des caractéres spécifiques qui différencient ces Polypiers, ni des animaux qui les

*Ellis, pl. l'une est la Queue d'Ecureuil * adhérente à un paux jets de cette Coralline, ont plus d'un paux jets de hauteur. L'autre est le Cheveu de mer

habitent.

adhérent à une moule aussi bivalve. Plus le CORALLImême sur un gros sucus. 24.10.

147. Cinq Corallines vésiculeuses; sçavoir, le Tamaris de mer , le Sapin de mer , adhé-no. 1. rent à une coquille, l'Antenne d'Ecrevisse , la Queue d'Ecureuil sur une moitié de coquille, l'hid. pl. 2. le Cheveu de mer sur une moule. 10. 2!

148. Douze jolies Corallines, dont sept vésiculeuses qui sont l'Antenne d'Ecrevisse ou barbe de mer, des deux variétés décrites dans Ellis 4. 9, no. 14 Le Cheveu de mer, adhérent à un fucus. Le Cy-let. a. & b. près de mer 5. La Coralline à lentes 6. La Co- 5 Ibid. pl. 35 ralline à cosses environnant un fucus 7, & la 61bid.pl. 150 Queue d'Ecureuil. Deux Corallines tubuleuf s; no. 24, b. 7 Ibid. pl. 7, sçavoir une à petites ramifications 8; & une du no. 12. b. Cap de Bonne Espérance, ridée comme la 16, fig. a. Trachée-artire formant un faisceau de petits tube: paralleles & fort ferrés?. Trois Corallines &g. b. celluleuses adhérentes à des fucus; sçavoir, la 20, n°. 3. b. Rampante 10, la Coralline à cils 11, & la Co- 11 Ibid. pl. ralline à touffe couleur d'yvoire 12; plus trois 21, 10 d. pla. Escares molles qui sont l'Escare à feuilles étrois 21, 10 d. c. 21 tes 13, celle à feuilles larges 14, & l'Escare mille 28, fig. a. 14 loid. pl. pore spongieuse & irréguliere, dont les ouver-29, n°. 2. 2. tures sont garnies de poils 15. 9. 15 Ellis pl

149. Douze Coralline articulées, sçavoir, 31, sig. b. la Bugle coralline, ou Consoude moyenne à tubes déliés 16 la bugle coralline à tubes plus épais: 16 Bid. pl. la commune, ou blanche des Apothicaires: 17 la 17 Ibid. pl. 24 20. 2, 3. POLYPIERS

CORALLI - commune à extrémités terminées en bouton : la Coralline à têtes en forme de lance & à articu-I Ibid. pl. 24, lations plattes I: la Coralline rouge semblable 10. 4. c. 2 Ibid. fig. e. à des cheveux 2: la blanche à articulations de-3 Ibid. fig. d. liées 3: la Coralline à branches arrondies, dont les extrêmités s'applatissent & se contournent à la dernière articulation : la Coralline à branches applaties, rameuses & mobiles de la grande espéce : la Coralline à seuilles très-applaties, rondes au fommet : la blanche à 4 Ibid. pl. feuilles atticulées de la Jamaique 4, & une 25, fig. b. très - rare à longue tige, ornée à l'un des bouts d'une houpe de filamens articulés, trèsdéliés, semblables à un pinceau. C'est le vrai pinceau de mer. 35".1.

150. Les deux espéces d'Acétabule, décrites dans Tournefort & Bauhin. L'un est le grand Acétabule de mer, formant un groupe de six pouces de haut sur autant de large, adhérent - Tournesort, à une pierre s. L'autre est de la petite espèce & achere à une valve de coquille du genre des cœurs. Il n'est pas bien décidé que cette production finguliere foit un Polypier. M. Donati dont l'autorité est d'un grand poids en cette

Donati, matiere, la range dans les plantes marines 3. mer adriatiq.

\$1. 378.



GENRE CINQUIEME.

EPONGES.

& élastique, composés de plusieurs sibres qui s'entrelaçant les unes dans les autres, s'unissent & forment une espece de rézeau percé de tubes plus ou moins larges & prosonds; ces tubes paroissent remplis d'une substance molle & blanchâtre, & il résulte de leurs diverses inflexions, un grand nombre de variétés dans les éponges.

Les cavités dont elles sont remplies, sont probablement l'ouvrage & la demeure d'une certaine classe d'animal-cules encore peu connus.

151. Deux très-grandes Eponges fines, de l'espéce commune, l'une en forme de manchon & l'autre en chapeau rabattu, nommées le Manchon & le Chapeau de Neptune. 21:19

152. Quatre autres de la même espéce, remarquables par leurs formes singulieres, nomEponges.

mées l'Eventail, le Turban, la Calotte, & le Mortier. 0".1.

153. Onze Eponges fines de formes trèsvariées, de l'espéce des précédentes, & l'Eponge

des Frotteurs. 7". 3.

de forme longue comprimée, à côtés garnis de petits trous, à partie supérieure percée d'une suite de trous larges & prosonds, rangés sur une même ligne, qui lui ont fait donner le nom de Flutte de Pan, elle a seize pouces de de long; l'autre est rameuse & digitée, à seuilles applaties, & adhere à une belle moule Magellanique de l'espèce chatoyante.

155. Deux Eponges rameuses, à branches nombreuses de substance friable, qui dans l'une sont étendues en éventail, comme certains lithophites, & ramassées en forme de gerbe dans l'autre. La premiere porte vingtsix pouces de haut, & la seconde vingt-deux.

156. Quatre Eponges rameuses, dont trois de substance molle & sléxible, plus ou moins * séba, pl. fines & serrées*, & une de l'espece décrite dans

7, nº.5, 6 l'article précédent. 6.

fibres rudes & serrées, à circonférence parsemée de grandes cavités irrégulieres, & à sommet percé d'une large ouverture cylindrique, qui pénétre jusqu'à la base. Elle est de couleur rousse.

158. Trois Eponges en colomnes; sçavoir, Eponges. une à tissu sin peu serré, uniforme dans toute sa longueur, sans autre grande cavité que celle qui la traverse d'un bout à l'autre *; une de la *séba, si grosseur du doigt, un peu applatie, qui au lieu d'être percée dans sa longueur d'une seule cavité comme la précédente, l'est transversalement de deux rangées de trous opposés, qui se suivent à distances égales; elle paroît être une variété de la slutte de Pan; la troisième est de l'espèce de celle de l'article précédent; mais elle a deux cylindres joints par les côtés.

midale, de couleur brune, nommée le Cierge, elle differe des précédentes, en ce que ses fibres sont plus serrées, & qu'elle est comme crevas-sée dans tout son pourtour. Ce beau morceau

a 26 pouces de haut. 8. 2!

160. Une autre de même forme, mais à tissu encore plus serré & plus compaste, brun-noi-râtre & à superficie hérissée de tubercules. Elle est sur-tout remarquable par sa hauteur qui est

de 41 pouces. 24.1.

161. Une Eponge de même espéce, mais différente pour la forme. C'est un groupe de cinq gros tuyaux, placés l'un près de l'autre, comme des tuyaux d'orgue; il a 22 pouces de haut. 10.1.

162. Trois Eponges en colomne des variétés

EPONGES.

déjà décrites. L'une est à deux tuyaux, de même tissu que la premiere de l'article 158; l'autre à quatre tuyaux, de même spéce que celle de l'article 160. La troisiéme réunit sur un seul tube le tissu compacte & serré, & le tissu mince & lâche de ces deux espéces. 4.2!

163. Une grande Eponge, nommée le Bonnet de Neptune, sa partie convexe est tuberculeuse & à larges canelures, & sa partie concave tapissée de fibres longitudinales qui vont du sommet à la circonsérence, d'une maniere fort réguliere. 6.",!

164. Trois jolies Eponges de formes singulieres. L'une applatie, d'un tisu fort serré garni de pointes, ressemble exactement à une Mitre d'Evêque. L'autre d'un tissu plus lâche, aufse hérissé de pointes, n'imite pas moins bien une Crosse; la troisième, d'un tissu semblable à la mie de pain, est de forme ovale comprimée, & s'appelle le Gobelet de Neptune. 6"

165. Deux Eponges de même espéce que la premiere de l'article précédent, dont une semblable aux feuilles de l'Opuntia, adhérente à un Astroite qui lui sert de base; l'autre composée de quatre tubes un peu applatis, d'un tissu peu serré, & parsemés de tubules ar-

rondies. 10.

166. Une autre de même espéce, mais digitée, sa forme lui peut saire donner le nom de

Fand de Neptune; elle adhere par sa base à un faux Corail & à un petit Keratophite. [6.1.

EPONGES.

167. Deux Eponges, dont une rare en forme de cornet, appellée Trompette de mer. Le tissu en est mince & fragile, & remarquable par quantité de petits trous cylindriques, dont la cavité & les bords extérieurs sont revêtus d'une croute pierreuse, striée & étoilée, qui en bouche quelquefois l'ouverture. L'autre Eponge est à peu près de même forme, mais de texture plus solide, & privée des cellules pierreules qu'on remarque en la précédente. 6. (!

168. Sept petites Eponges, dont une à feuilles minces & découpées, en forme d'Agaric; une rameuse à tubes noueux & tuberculeux, d'un tissu très-sin & très-serré; une en forme d'entonnoir un peu comprimé; une en crosse; une en bouquet, imitant la fleur de Jacinthe; & deux à tubes cylindriques, des espéces déjà décrites. 24.1.

169. Deux Eponges rares, l'une appellée la Morille, à cause de sa ressemblance parfaite avec ce végétal. Elle adhere à un faux Corail. L'autre de forme orbiculaire, peut être nommée l'Eponge oursin. Les pointes dont elle est hérissée, & qui la traversent de part en part. font liées les unes aux autres par des fils épars, minces & déliés comme de la toile d'araignée. 16.2!

170. Trois Eponges, dont une peu com-

Eronges, mune, en forme de buisson à petites seuilles nombreuses découpées & fritées, portées sur un rocher qui leur sert de base, & deux de l'espéce de celles de l'article précédent, dont une est la Morille à feuilles plus petites, plus

* Mém. du nombreuses & plus comprimées *. L'autre a les Chev. Turgot fur l'hist. nat. pointes entierement engagées dans ces fibres pl. 24, let. E. éparses, que nous avons dit ressembler à la toile

d'araignée. 7"

171. Une très-rare & magnifique Eponge rameuse, de couleur brune-obscure, dont les branches rondes vers la tige, s'élargissent & s'applatissent en s'élevant, & prennent la figure de cornes de Daim, elles sont entierement couvertes de petites feuilles drues, plissées & comprimées, d'un tissu ferme, serré, peu slexible. Ses branches les plus larges sont reticulées à peu près comme le Lithophite éventail. Elle porte vingt-un pouces de haut sur un pied de large. 48 . 5!

172. Neuf Eponges de différentes espéces; sçavoir, une Eponge agaric, à feuilles blanches, nombreuses, frisées, comprimées, percées çà & là de cellules arrondies & tuberculeuses en forme de verrues, dont la cavité intérie re est incrustée d'une substance friable & crétacée. Trois semblables à la mie de pain, de substance friable & comme vermoulue; l'une de forme applatie, comme un morceau de

liége,

liége, les deux autres de forme irréguliere. Eponges. Une globuleuse, percée de larges cavités cylindriques & irrégulieres, rangées parallelement comme dans les Astroites. Deux minces & plattes, dont le tissu roide, quoique lâche & peu serré, forme des cellules à réseau, fort nombreuses & jointes les unes aux autres, comme celles des mouches à miel. Une à rameaux arrondis, entrelacés les uns dans les autres, comme un groupe de tuyaux vermiculaires. Il est d'autant plus aise d'en faire la comparaison, qu'on voit plusieurs de ces derniers qui y adhérent; & une mince & platte, plissée comme une fraile de veau. 16.8!

173. Seize petites Eponges de formes trèsvariées. Sçavoir, deux digitées, l'une grise & l'autre brune, à rameaux creux & cylindriques, percés de trous plus ou moins larges. Une rameuse, grise, qui paroît être une variété de celle décrite article 171. Six variétés d'Eponges rameuses, à branches applatties, l'une à seuilles larges, velues, profondément découpées; l'autre à feuilles étroites & allongées; l'autre à feuilles frisées; l'autre à petites branches rondes applatties & bifourchues; l'autre à feuilles d'Agaric, repliées les unes sur les autres; & l'autre à feuilles terminées en bouton tubuleux. Une à branches arrondies *. Une sembla. * Séba, pl;

Tome I.

EPONGES. de main. Une applattie comme la feuille de l'Opuntia. Une à fibres droites & isolées. Une cannelée; & deux globuleuses. 18.1.

GENRE SIXIÉME.

ALCYONS.

ALCYONS.

M. Ellis, paroissent principalement destinés à servir de nids & de matrices à des animaux de mer. Les Alcyons varient beaucoup dans leur sorme & dans leur substance; celle-ci est spongieuse dans quelques espéces & charnue dans d'autres. Ils ont aussi différentes sortes d'enveloppes, les uns ont une peau graveleuse, elle est calleuse, coriace ou friable dans les autres.

174. Le grand Guepier de mer. Cet Alcyon en forme de ruche, est d'une substance dure & cartonneuse, de couleur rougeâtre, percée çà & là d'un grand nombre de petits trous. Au sommet est une large ouverture en cône renversé, qui laisse voir les compartimens celluleux dont l'intérieur est garni. Ce morceau ALCYONS. curieux a dix pouces de haut sur huit de large. 19.1.

175. Huit Alcyons; sçavoir, un en forme de Poire de substance lisse & friable, d'un rouge de, brique *. Son extrêmité est percée d'une cavité profonde & conique, qui laisse appercevoir les hist de la mer, cellules intérieures. Un de même espéce, de pl. 16, fig. 79. couleur grise, adhérant à un groupe d'autres Alcyons en forme de Figue, revêtus d'une écorce rude & épineuse, & troués au sommet. Un de l'espéce du premier de cet article, ressemblant à des figues jointes par les côtés, & se terminant en une seule queue. Un de forme globuleuse, d'où partent en tous sens des tubes creux & spongieux, & quatre de forme plus ou moins ronde, à tissu spongieux. celluleux & peu flexible; parmi ces derniers, trois adhérent à des corallines & à des fucus. 7"4!

176. Trois Alcyons branchus peu communs, en forme de cornes de Daim. La substance de l'un est spongieuse, friable, percée de distance en distance de trous arrondis qui laissent voir les cellules intérieures; celle de l'autre est coriace, dure & semée de cavités peu prosondes. Dans le troisséme, elle est membraneuse, celluleuse & épineuse. 25.14.

177. Quatre Alcyons de l'espéce du premier de l'article précédent; dont un singulierement contourné. Deux Agarics , de substance Accyons. spongieuse & friable, semée de petites cavités intérieurement celluleuses; & une autre variété d'Agaric, revêtue d'une écorce cartonneuse, percée en sept à huit endroits de trous comme les précédens, mais beaucoup plus larges. 17:11

178. Deux Alcyons, l'un desquels est une grosse masse songueuse & tuberculeuse en forme d'Agaric *, dont l'écorce est de même constitue.

**Sébapl. 96 me d'Agaric *, dont l'écorce est de même constitue que celle du dernier de l'article précédent; l'autre est en forme de coupe jovale, à bords un peu comprimés, de substance dure, coriace, ridée & de couleur brune. 6...

179. Trois jois Alcyons de substance car-

tonneuse; sçavoir, un à feuilles larges & frisées, dont les plus grands rameaux tiennent
ensemble à l'aide d'un tissu mince & membraneux; elles sont flexibles, un peu élassiques,
* séba pl. & semblables à des feuilles désséchées *. Un à
feuilles plus étroites, épineuses & semblables
à celles du chardon, ce qui l'a fait nommer
Chardon de mer. Le troisséme est une feuille
large & spongieuse, qui recouvre totalement
les branches d'un petit sucus, excepté les ex-


180. Quatre Alcyons différens; sçavoir, un rare des Indes, à branches rondes en forme de corail, de substance assez dure, spongieuse,

friable, non élastique. Un d'Amérique, dont la substance est une espèce de peau calleuse & savonneuse, couverte de tubercules en forme de verrues trouées dans le milieu, laquelle enveloppe une concrétion de mer. Le troil éme est une masse assez informe, roide, membraneuse, celluleuse & piquante, de couleur brune tirant sur le noir *. Et un qui approche affez * Séba, ibid. du précédent, mais d'une substance plus spon-pl. 95, n°. 3. gieuse & néanmoins plus compacte. 36"

181. Treize petits Alcyons, dont un en masse arrondie, se partageant en plusieurs petites tiges velues & pointues, de substance friable & spongieuse *. Un en sorme de vesse de * Imperaire lib. 27. Cap. 8 loup; un dans la cavité duquel est logé Bernard fig. 6. l'Hermite; un en forme de petit chapeau; les

autres sont des espéces déjà décrites. 10". 1.

182. Huit espéces différentes d'Ovaires ou Matrices de coquillages, dont quelques-unes portent le nom vulgaire de Savonettes de mer-Sçavoir, 1°. une d'Amérique, composée de petites vessies jaunes, rondes, applaties, jointes ensemble en une de masse irréguliere, & adhérentes à une branche de Madrepore; ce sont les matrices des Pourpres communes. 2°. Une de même espéce venant de nos mers; elle est en masse arrondie * 3°. Une *Ellis Corat. à vessies en forme d'entonnoir, dont les bords sont festonnés; ce sont des matrices de Euc-



cins de la Jamaïque. 4°. Des matrices de bucAlevons.

* Ellis, pl.

3. fig. a. & tubes droits, dont le sommet est rouge de corail,
Lister, pl. 878

ils adhérent à un buccin. 6°. Deux à vessies

noires triangulaires & à tête applatie. Et trois
autres variétés de matrices, des Indes orientales. 7.





SECONDE PARTIE.

Coquilles ou Testacées.

VANT d'entrer dans l'énumération des Coquilles que nous possédons, COQUILLES. nous croyons devoir dire un mot de l'ordre que nous suivrons dans leur distribution, & donner quelques notices préliminaires & succinctes qui puissent rendre ce Catalogue utile, par l'ordre que nous tâcherons d'y observer.

Nous avons présenté dans la premiere Partie les habitations pierreufes * ou ligneuses des plus petits Ani- * Les Polymaux connus dont les Mers soient peuplées; nous avons compris dans la même Classe les productions d'Animaux encore inconnus, telles que les Eponges, &c. & enfin celles qui paroissent destinées à servir de nid & de matrices à certains Coquillages de Mer : ce qui

nous mene, par une gradation presque Coquillages infensible, à traiter des Coquillages mêmes : ce sera le sujet de cette seconde Partie.

> On distingue primitivement trois fortes de Coquilles, celles de Mer, celles d'Eau-douce, & celles de Terre. Nous en ferons trois Sections; dans la premiere nous rangerons les Coquilles Marines, dans la seconde les Fluviatiles, & les Terrestres dans la troisième.

> Les Coquilles Marines fe trouveront ici divisées, à l'exemple de la plûpart des Auteurs qui en ont traité, en rrois Classes:

> > Les Univalves. Les Bivalves. Les Mutivalves.

Nous fous-diviferons encore, conformément à la méthode la plus suivie, chaque classe en un certain nombre de familles, chaque famille en genres, chaque genre en espèces, & celles-

Coquildes


Mais il est bon de prévenir que, ne s'agissant ici que de Coquilles où ne se trouvent plus les Animaux auxquels elles ont été propres; ces divisions ne pourront être les mêmes qu'elles auroient été, si elles avoient dû se rapporter aux Coquillages entiers, comprenant à la fois l'Animal & la Coquille, telles qu'on en trouve de trèsheureuses & de trèsjustes dans l'histoire des Coquillages du Sénégal, par M. Adanson, de l'Académie Royale des Sciences.

On a cru d'ailleurs ne devoir point négliger de joindre aux descriptions de chaque espéce ou variété de Coquilles, les noms tirés presque toujours de quelqueressemblance frappante, & sous lesquels elles sont le plus connues, sussent ils même du nombre de ceux dits vulgairement de guerre, ou qui ne sont en usage que chez quelques Amateurs ou chez les Marchands.

74

On a de plus placé dans quelques Coquilles familles, à titre de Coquilles improprement dites, des fourreaux ou habitations d'Animaux, formées d'un grand nombre de fragmens de diverses Coquilles, joints à des brins de bois, à de gros sable, &c. sur-tout lorsque ces * Coquilles se sont trouvées à peu-près semblables pour la forme, à celles de ces familles.

Quant aux Coquilles Fluviatiles & Terrestres, comme nous ne connoissons des premieres que de deux sortes générales, les Univalves & les Bivalves; & des secondes que d'une sorte seulement, sçavoir les Univalves; & que d'ailleurs les familles en sont analogues à celles des précédentes, & en même tems moins nombreuses: nous ne décrirons la collection, assez variée cependant, que nous avons des unes & des autres, que par forme d'autant d'appendices, qui feront la seconde & la troisiéme Section.



SECTION PREMIERE.

Coquilles DE MER.

CLASSE PREMIERE.

UNIVALVES.

Nous rangerons dans cette Classe toutes les Coquilles où l'on ne remar- UNIVALque pour l'ordinaire qu'une seule pièce. Nous disons pour l'ordinaire, parce que plusieurs de ces Coquilles en ont deux lorsqu'elles sont habitées par l'Animal: mais il n'y en a qu'une qui retienne proprement le nom de Coquille, l'autre est connue sous le nom d'Opercule.

Ces Opercules se trouvent rarement dans les Cabinets avec les Coquilles auxquelles ils appartiennent, & les familles & genres de ces Coquilles n'étant pas même assez bien déterminés par opposition aux autres, nous n'avons point jugé devoir, comme ont fait quelques Auteurs, très estimables d'ail-

Unival- leurs, tirer la division générale des Univalves, ou même certaines de leurs divisions ultérieures, des caractéres de n'être point, ou d'être en effet operculés.

> Nous avons donc préféré de puiser ces diverses divisions dans la forme générale des Coquilles, & ce sera de caractères moins apparens que dériveront les différences des genres, des espéces & des variétés. Les Coquilles Univalves peuvent être partagées en douze familles, qui sont:

- 1. Les Lépas ou Patelles.
- 2. Les Oreilles de Mer.
- 3. Les Tuyaux vermiculaires.
- 4. Les Nautiles.
- 5. Les Limaçons.
- 6. Les Buccins.
- 7. Les Rochers.
- 8. Les Pourpres.
- 9. Les Tonnes.
- 10: Les Vis.
- II. Les Volutes.
- 12. Les Porcelaines.

PREMIERE FAMILLE.

LÉPAS OU PATELLES.

Ce sont des Coquilles ouvertes, évales, non contournées, de la figure Les Le'Passe
d'un cône tronqué, qui s'attachent aux
rochers ou à quelqu'autre corps dur.
Elles sont ou entieres, ou percées, ou
chambrées, ou à appendice intérieur;
& c'est delà que nous tirerons leur division en quatre genres, qui sont:

- 1°. Les Lépas à Coquille simple & entiere.
- 2°. Les Lépas à Coquille percée endessus.
- 3°. Les Lépas à Coquille chambrée.
 - 4°. Les Lépas à Appendice en demicornet.



GENRE PREMIER

LÉPAS A COQUILLE SIMPLE ET ENTIERE:

1. UN Lépas des Indes, ters-rare, blanc, de Les Lépas, forme presque ronde & applatie, creusé endessus de sillons ondés concentriques, & endedans de stries fines qui s'étendent du centre à la circonférence. Le bouton du sommet est jonquille, le milieu de l'intérieur est jaune. Ce Lépas qu'on pourroit nommer Parasol Chinois, porte trois pouces deux lignes sur trois pouces quatre lignes de diamétre. 72.1.

2. Le même, avec cette seule dissérence, que le milieu du dedans est fauve tirant sur le

gris de lin. 80. 13.

3. Un Lépas des Indes, rare, à tête située vers les deux tiers de la longueur, à stries longitudinales, à base ovale, & de l'espèce nom-* Argenv. mée Bouclier imitant l'Ecaille de Tortue *; il est marbré en-dessus, & nacré en-dessous. LS

4. Un Bouclier semblable, un peu plus grand, dépouillé, & dont les stries ont disparu. Ses couleurs ont un grand éclat. 48.5.

5. Un autre dépouillé & fans stries, moins grand, & de marbrure plus chargée que le pré-

* List. tab. cédent *. 40.1. 531 11°. 9.

6. Un très-beau Bouclier à onze bandes lon-

gioudinales, de forme un peu moins élevée que les précédens, sa tête est blanche & Les Lépas. nacrée *. Il porte trois pouces, sur deux pou- * Rumph. ces six lignes de diamétre. 52.19.

tab. 40. litt.

7. Un autre moins grand de l'espèce du pré-

cédent, mais dépouillé. 36.3:

8. Un grand Lépas Magellanique, papyracé à stries longitudinales peu élevées. La tête, le bord de la base, & une zône intermédiaire sont flambés de lie de vin sur un fond blanc, l'intérieur est nacré. 13.

9. Six Lépas de l'espéce de celui de l'article précédent, mais moins grands, de fonds

& de marbrure variés. 8.

10. Sept Lépas de moyenne grandeur, sçavoir, un blanc tacheté, de forme un peu applatie, à stries longitudinales serrées & granuleuses; un à tête élevée placée près de son milieu, & de forme presque conique, à stries longitudinales bien marquées. Deux Lépas coniques jaunes, l'un dans l'état naturel à tête plus obtuse, & l'autre poli. Deux de l'espéce de l'article précédent, & un Bouclier imitant l'Ecaille de Tortue. 8. 14.

11. Deux très-grands Lépas Magellaniques en pendant, de forme oblongue, à tête fort élevée & chatoyante, à grosses stries ou côtes longitudinales rabotteules, de couleur brune moirée en-dessus, nacrée en-dedans. 10.11

I. FAM. Les Lépas. 12. Deux autres de forme plus applatie. 6.

13. Deux autres de l'espèce de ceux de l'article onze; à cela près, qu'ils sont blancs nués de marron; les sommets sont comme dans les précédens.

14. Deux grands Lépas rares Magellaniques, à côtes affez larges & peu faillantes, brun-foncé en dessus, nacrés en-dedans, à tête élevée, de forme à peu-près conique, & nommés en Hollande Entonnoirs. 9.

15. Deux autres qui ne différent des précédents qu'en ce que les cannelures de l'un sont blanches, & qu'on remarque aussi un peu de blanc dans le haut & le bas des cannelures de l'autre. 18.

16. Cinq Lépas de moyenne grandeur & fort jolis; sçavoir, un rare à stries blanches & cannelures amaranthe-clair, chargées de petits grains très-fins; un autre rare encore à stries sines & serrées, à peine sensibles, rassemblées en plusieurs faisceaux alternativement blanc & cerise; deux sond blanc nué de bleu, nacrés en-dedans, & un Entonnoir de l'espèce du premier des précédens.

17. Trois Lépas rares, sçavoir, un grand blanc, nué de violet vers le haut, & de verd dans le bas, à côtes longitudinales nombreuses, & nacré tant en-dedans qu'en dehors; un de l'espéce du premier de l'article précédent,

mais

finais plus grand; & un autre un peu plus grand, nué & marbré de fauve roux , à côtes peu éle- I. Fait. vées, & nacré tant en-dessus qu'en dessous., 5.2.2.

18. Sept Lépas de moyenne grandeur ; sçavoir, un à stries & cannelures longitudinales, granuleuses & à tête élevée, bariolé de noirâtre, de fauve & de blanc *. Un à groffes * Arg. pl. .. côtes longitudinales, laissant entr'elles de pro-lett. H.s fondes cannelures, nué de marron clair sur un fond blanc, à tête blanche & de forme applatie. Un à stries larges & peu élevées, fond brun avec une zône blanche, nacré par-tours Un à seize côtes longitudinales, marron, & autant de cannelures verdâtres. Deux semblables au premier de l'article précédent; à cela près, que les cannelures en sont couleur de rose, & qu'ils sont plus applatis, & un de même espéce nué de gris-de-lin. 13. 13.

19. Six Lépas, sçavoir, deux à peu-près semblables aux deux premiers de l'article précédent. Un semblable au premier de l'article 16 ; un granuleux bariolé d'orangé & de blanc; un semblable au quatriéme de l'article précédent, mais plus grand; & un grand Lépas Magellanique mince, à côtes peu élevées; ondées & irrégulieres marron, sur un fond blanc & nacré: 18.12.

20. Deux grands & beaux Lépas de forme an poù applatie; l'un à côtes longitudinales Tome I.

grandes & petites, alternatives, & débordant I. FAM. la base en sorme de rayons; il est panaché en zigzag de blanc, de jaune clair & de brun, & a le sommet noir; on le nomme Œil de

*Arg. pl. 2. rubis radié *, l'autre est à stries blanches &

tab. 534. fig. cannelures couleur de rose. 24.1.

21. Deux semblables, à cette dissérence près, que l'Œil de Rubis est à stries moins élevées, moins radiées, & à zigzags plus marqués; & que l'autre Lépas est ici plus grand, plus oblong, & nué seulement de couleur de rose. 18.

22. Trois Lépas, sçavoir, deux fauves à stries légeres & nombreuses, de forme oblongue, à côtés comprimés, ressemblants par-là à

* List. tab. des bateaux, & nommés en esset de la sorte *, (41. fig. 25. & un œil de Rubis semblable à celui de l'arti-

cle précédent. 16.2. 23. Trois grands Lépas, l'un à côtes gran-

des & petites, alternatives, débordant la base, de forme applatie, à tête marbrée de blanc & de fauve, brun dans le reste, & nommé Œil

* Arg. pl. de Bouc radié *; l'autre poli, de forme un peu élevée, arrondie vers le haut, à tête & bords brun-soncé, blanc-nacré dans l'intervalle; & un blanc du Brésl, marbré de fauve-roux, à grosses côtes, chargées de stries inégales, onduleuses & rabotteuses, & à base dentelée. 12.1.

24. Trois autres, sçavoir, un Œil de Rubis,

un Œil de Bouc; & un comme le dernier de l'article précédent, mais moins grand. 7."

25. Quatre grands Lépas, sçavoir, deux blancs à stries longitudinales, saillantes en vive arrête & dentelées, débordant la base; un blanc un peu orangé, à tête élevée, & à stries fines; & un semblable, à stries plus larges, chargé de Glands de Mer. 3". 10!

26. Sept Lépas, sçavoir, un grand, blanc nué de fauve, de forme applatie, à larges côres peu élevées & à stries fines & serrées *; un à stries longitudinales, bariolé * Gual. ind. de zônes fauves, blanches & noires; un semblable aux deux premiers de l'article précédent, mais moins grand; un à tête plus élevée & à stries non dentelées. Un granuleux femblable au premier de l'article 18, & deux de l'espèce nommée Œil de Rubis. 11". ?!

27. Trois très-grands Lépas, sçavoir, un d'Amérique, à stries inégales & rabotteuses, marbré de blanc, de fauve & de gris-verdâtre. Un de la Méditerranée à stries saillantes, rabotteuses & débordant un peu la base, marbré par zônes de marron, & de blanc; & le troisiéme dépouillé, d'un beau blanc, à tête élevée & pointue. 7.1.

28. Huit grands Lépas, sçavoir, un blanc à stries inégales, revêtu de son épiderme. Un autre dépouillé paroissant de même espèce

LES LEPAS

chargé de trois tuyaux vermiculaires. Deux à Les Lepas, grosses stries longitudinales débordant la base, & marbrés par zônes de marron-clair & foncé,

*Gual ind. & de verd d'eau *; deux Magellaniques de cab. 9. litt, H. l'espèce de ceux de l'article 11, & deux blancs dépouillés, semblables au dernier de l'article

précédent. 10.

29. Vingt-quatre Lépas de moyenne grandeur, sçavoir, quatre à bandes larges, alternativement blanches & brunes, & à stries fines & serrées. Deux fauves nués de verd & de gris, de l'espéce du premier de l'article 26. Deux verdâtres à stries inégales, serrées & rabotteuses, parmi lesquelles il y en a, dans un, onze orangées placées à distance presqu'égale les unes des autres. Un souci lisse, à tête blanche; un à stries peu élevées, & à zônes brunes hachées sur un fond jonquille; un verd de terrasse strié, à bandes alternatives, fauves & brunes; deux à stries transversales & à petites bandes hachées, blanches & rougesbrunes. Deux petits Magellaniques papyracés, à stries brunes & cannelures blanches, mieux prononcées dans l'un que dans l'autre. Deux autres Magellaniques papyracés, de la variété de l'article 9. Quatre Œils de Rubis, dont deux radiés & revêtus de leur épiderme; les deux autres dépouillés & non radiés. Deux de l'espéce du premier, de l'article 28, & un en bateau comme les deux premiers de l'article 22. 8. 1.

LES LEPAS.

30. Cinquante Lépas de moyenne grandeur & petits, scavoir, deux petits & plats à stries capillaires, marbrés, par zônes inégales, de brun & de gris, & à sommet blanc *. Deux autres de forme conique & à stries fines alterna- 539.f. 22. tives, blanches & noires. Deux à tête comprimée, à stries fines, blanches & grises. Deux lisses & applatis, à lignes longitudinales, brunes, interrompues, fur un fond blanc. Deux applatis d'un beau couleur de rose, à stries capillaires & à sommet blanc. Un semblable, mais brun-obscur. Un blanc à grandes taches couleur de rose, régnantes dans une large zône. Deux un peu plus élevés, fauves-gris. Deux blancs à côtés comprimés, & à stries longitudinales & transversales, groffes & rabotteuses, formant un réseau imparfait. Un noir de forme conique, à huit côtes élevées, d'un blanc d'émail. Un de même espéce, à neuf côtes, blanc nué de fauve roux, & à sommet noir applati. Un à base dentelée & à côtes Ariées, alternativement blanches & brunes *. * tift. tabi Le petit Lépas peint en façon de refeau *. 532. fig. 11. Deux Lépas bruns, dont les cannelures & les 530. fig. 8. stries sont hérissées de petits points rudes *. * List tab. Deux autres semblables, mais rougeâtres. Un 536. fig. 150.

blanc à stries fines, granuleuses & à base pres-Fiii

I. FAM. que circulaire. Cinq Magellaniques, dont qua-Les Lepas. tre de l'espèce de l'article 9, & un Entonnoir à bandes alternatives blanches & brunes. Deux wils de Rubis radiés, un Bouclier, & dixsept autres variétés. 30.

31. Sept Lépas peu communs, tous à grands rayons, en forme d'étoile, & nommés par cette raison Astrolépas; sçavoir, un blanc de forme plate, à seize rayons saillans en-dehors, & creusés en-dessous en goutiere; trois blancs roussatres à tête plus élevée, à rayons plus serrés & dentelés; un blanc à rayons épais & granuleux; & deux blancs marbrés de noir,

*Arg. pl. 2. l'un à sept, l'autre à huit rayons *. 20. lett. M.
Lift. rab. 532. 32. Deux Lépas à tête recourbée & à stries fig. 10. fines & serrées, nommés Bonnets de Dragon;

l'un d'une belle couleur de chair, & plus grand que celui représenté dans la premiere Planche

*Arg. app. de l'Appendice de d'Argenville *; l'autre n'en différe qu'en ce qu'il est un peu moins grand & de couleur blanche. Ils sont de la plus parfaite conservation.

33. Deux rares Lépas Magellaniques papyracés à tête recourbée, & grands dans leur espèce. Ils sont en sorme de gondole, à tête placée à l'une des extrémités de la base, & un peu recourbée sur ce même point, à stries transversales qu'on n'apperçoit qu'à la loupe, blancs en-dessus, nacrés en-dedans, 6.

34. Douze autres Lépas Cabochons de moyenne grandeur & petits; sçavoir, deux Les Lepas. fauves nués de marron, à stries longitudinales, granuleuses vers le haut, tuilées dans le bas, & à léger recourbement de tête regardant l'un des deux bouts *. Un autre avec son * Gualt indi épiderme à stries, alternativement granuleuses tab. 9. litt. V. & hérissées de petites tuiles fort saillantes. Un petit blanc de la Barbade, à stries transversales & ridées, à base irréguliere, & à recourbement de tête regardant un des côtés *. Un * Litt. taba petit blanc du même lieu à stries longitudi- 544 fig. 31. nales, revêtues de Drap Marin, à base ronde & à recourbement de tête contourné *. Un * List. tab. petit blanc à stries fines, transversales, gra-544. fig. 32. nuleuses & à base ronde *. Deux blancs & gris, nués de verd, de forme conique à stries 544. fig. 30. longitudinales, & à sommet un peu recourbé. Un blanc à stries transversales, onduleuses & ridées, & à recourbement de tête descendant jusqu'à la base. Deux Bonnets de Dragon de l'espéce de ceux de l'article 32, mais plus petits *; & un petit de l'espéce de ceux de l'ar- * Arg. pl. 28 ticle 33. 3.

35. Un Lépas rare de couleur fauve, à groffes stries rabotteuses, longitudinales, & à petites transversales qui se croisent en réseau, à base ovale & à tête recourbée sur l'un de ses côtés; l'intérieur ressemble à une valve de

Arg. pl. 2.

came qui seroit destituée de charniere, ce qui I. FAM. lui a fait donner le nom de Concho-Lépas *.

GENRE SECOND.

LÉPAS A COQUILLE PERCÉE EN DESSUS,

36. Un Lépas rare de Magellan, à base ovale, de plus de trois pouces de long, sur plus de deux de large, de forme affez élevée, à stries longitudinales, serrées, coupées par quelques autres transversales, & à vingthuit larges rayons alternativement blanes & violets, nués d'incarnat vif, le trou ovale du sommet a un demi-pouce de long sur trois lignes de large, & est bordé de blanc. 6.1:

37. Un de même espéce, à cela près qu'il est plus large, & que ses rayons sont alternativement violets & blancs nués de ver-

dâtre. 3.6.

38. Deux Lépas en pendant, de la variété de. celui de l'arricle précédent, mais un peu moins

grands. 3.7.

39. Douze Lépas de différentes grandeurs, tous percés au sommet; sçavoir, un à large ouverture, & à côtés comprimés, qui lui donnent la forme d'un canot. Un marbré de blancfale & de verd céladon, à stries inégales & serrées, & à bords dentelés ; le Lépas réticulé, blanc safrané; le Treillis à pointes de Lister 3; Les Lépas. le Lépas à Treillis plus serré 4; le Lépas d'Afri- (1) Gual. que légérement strié, blanc-verdâtre en dedans, tab 9, litt. N.
(2) Bonan,
brun-roux en dessus 5; le Lépas verd à stries no. 6. Argenv.
pl. 2. lett. I. blanches, alternatives, & dont le trou du som- (3) List tab. met est noirâtre tant en dedans qu'au dehors 6; (4) 1bid. tab. le Lépas blanc taché de verd, à stries 527. fig. 2. noueuses 7; le Lépas blanc tacheté, remar- 528. fig. 4. quable par le trou circulaire de son sommet 8; fig. 7) Ibid. le Lépas à dix rayons fascié d'incarnat & de sig. 6. (8) Ibid. brun; & deux grands Lépas en pendant de fig. 73 l'espéce de celui de l'article 37. 6."

40. Trente-quatre autres de différentes grandeurs, tant réticulés que striés, de toutes les variétés de l'article précédent, excepté la

seconde. 7. 11.

GENRE TROISIEME.

LÉPAS A COQUILLE CHAMBRÉE,

41. VINGT-UN Lépas de moyenne grandeur & petits; scavoir, deux blancs * flambés * 118. 126. de brun-rougeâtre, de forme plate, à base Adans, Histodu irréguliere, à tête saillante en forme de bec fig. 8, un peu recourbé, & à cloison paralléle à la base, occupant près de la moitié du dedans,

Quatre autres, dont trois blancs, nués de fauveLes Lepas. clair, & un orangé, à stries longitudinales, inégales & hérissées de petites pointes, à tête recourbée & contournée qui leur donne une forme approchante de celle des Oreilles de Mer; leur chambre est à peu-près semblable à celle des précédens. Un de forme peu dissérente, mais lisse & à robe verd-de-terrasse, picottée de petits points grisatres. Deux blancs, lisses, de forme un peu bombée, & à tête recourbée de biais jusqu'à la base, imitant trèbien une Nacelle: ils ont beaucoup de resseme.

* Hist. du blance avec le Garnot de M. Adanson *. Deux séneg, pl. 2. blancs papyracés, de forme ovale très-applatie,

approchant beaucoup du Jenac du même Au*Ibid.fig. 10. teur *. Deux autres blancs papyracés, de forme plus allongée, & qu'on nomme Sandales.
Deux à coque épaisse, à tête un peu recourbée, descendant presque jusqu'à la base, &
fous laquelle on apperçoit en dedans une espéce de très-petite chambre; leur robe est lisse

& panachée de petites larmes en losange, *Rumph. blanches, vertes & violettes *. Deux de mêtab. 40. litt. O. me espéce, mais à fond brun & larmes fauves. Deux petits fauves de la Méditerranée, en forme de cônes évasés, & à petite chambre

* Arg. pl. 2. dont l'ouverture s'étend du centre à un des lett. F. Bonan. cl. 1. n°. 12. points du bord *, nommés le Bonnet Chinois; list. tab. 146. fig. 38.


& deux des Indes de même espéce, mais blancs; dont un à stries longitudinales, iné-LES LEPASS gales & peu ferrées, & l'autre lisse au sommet, imitant le bout d'un mammelon. 17.1.

GENRE QUATRIEME.

LÉPAS A APPENDICE EN DEMI-CORNET.

42. TEUF Lépas, sçavoir, deux blancs papyracés, à stries longitudinales, très-fines, & à groffes stries transversales, onduleuses, à base irréguliere, à tête élevée & saillante en bec de Corbin, & de l'espéce nommée Cabochon *. Deux autres de la même espéce, mais * Arg. pl. 23 lett. K, Gualt. dont les grosses strais transversales serpentent ind. tab. 94 & se croisent en divers sens; ce qui les fait litt. Z. paroître comme ridés. Deux autres Cabochons blancs de Saint Domingue, différens des précédens, en ce que les stries longitudinales en sont fortes & bien marquées, & que les transversales y paroissent à peine. Deux petits blancs feuilletés, formés chacun comme de sept autres papyracés, empilés, à distance inégale les uns fur les autres, & qui vont en diminuant de volume à mesure qu'ils approchent du sommet, imitant par-là un toît Chinois à plufieurs étages, d'où ils ont tiré leur nom de

*Arg. pl. 2. Toîts Chinois *; & un petit blanc & conique à stries longitudinales bien marquées, à trois renslemens circulaires, terminés par un petit bouton, & nommé Bonnet de Matelot. 10.11.



SECONDE FAMILLE.

OREILLES DE MER.

II. FAM. CE font des Coquilles ouvertes & apOREILLES platies qui n'ont qu'une seule spirale,
& qui ressemblent assez bien à l'oreille
humaine, d'où elles ont pris leur nom.
Elles ont ordinairement une rangée de
trous ronds disposés sur une ligne courbe; mais quelques-unes en étant privées, nous en ferons un genre à part.
Ces deux genres sont:

1º. Les Oreilles de Mer à trous,

2°. Les Oreilles de Mer sans trous.



Rumph.

GENRE PREMIER.

OREILLES DE MER A TROUS.

43. UNE Oreille de Mer, des Indes, rare, II. FAM: dépouillée, d'une très - belle Nacre, ayant OREILLES plusieurs semences de Perles dans son milieu, de Mer. & portant cinq pouces & demi sur quatre * 72. ** Gualt. ind. & portant cinq pouces & demi sur quatre * 72. ** Gualt. ind. & portant cinq pouces & demi sur quatre * 72. ** Gualt. ind. & portant cinq pouces & demi sur quatre * 72. ** Gualt. ind.

44. Deux autres un peu moins grandes, non tab. 69. litt. dépouillées, à profonds fillons, à stries élevées en vive arrête, onduleuses & rabattues toutes d'un même côté en forme de feuilles roulées.

La Nacre du dedans offre aux yeux toutes les couleurs de l'Arc-en-ciel * 6" * List tab

45. Deux comme les précédentes, dont une 613. fig. 5.

dépouillée. 3.

46. Trois belles Oreilles de Mer, Orientales, de forme étroite allongée, l'une à stries prefqu'imperceptibles, revêtue de sa pellicule d'un beau verd-pré, tacheté de blanc - sale; les deux autres dépouillées & très-grandes dans leur espèce. Leur Nacre intérieure est du plus bel Orient * 856

47. Sept jolies Oreilles de Mer, sçavoir, E. F. Arg. pl. 3. une rare des Indes, jaune, marbrée de blanc-lett. E. sale, à stries longitudinales ondu euses, coupées d'autres plus fines transversales, à bord

II. FAM. extérieur granuleux, mais fur-tout remarquaOREILLES ble par une suite de tubercules paralléles aux
trous dont l'Oreille est percée, & qui se prolongent en spirale jusqu'à la clavicule où ils
forment une espèce de Couronne. Deux autres aussi des Indes à robe aurore réticulée,
& à deux larges cannelures bordant des deux
côtés la rangée de trous & de tubercules.
Deux de Rio de la Plata à coque plus mince
& à stries plus régulieres que celles de nos Mers;
& deux petites de l'espèce de l'article précédent. 10"44.

48. Douze Oreilles de Mer de nos parages, fçavoir, un affortiment de six à peu près de même grandeur, percées de 4,5,6,7,8 & 9 trous, confervant leurs pellicules marbrées en forme lett. A. F. Hold, lett. D. de feuilles ou rides très-faillantes *. Deux grandes chargées de Glands de Mer, & trois dépouillées, dont une orangée aurore & cerise, de diverses nuances & d'un grandéclat, tant en dessus, qu'en dessons, & au-dedans de laquelle adherent des semences de Perles, mais dont le bord paroît avoir été rogné jusqu'en



deçà des trous qui y manquent. 4.2.

GENRE SECOND.

OREILLES DE MER SANS TROUS.

blanches de forme applatie, & nommées II. Fam.
Oreilles de Venus, à stries très-fines *; & une de Mer.
petite très-rare d'une autre espéce, blanche, * Arg. pl. 3.
lett. C.
marbrée d'orangé, légerement striée, nacrée
en dedans, & de forme bombée *. g. 1.

* List. tabe



TROISIEME FAMILLE.

TUYAUX ET VERMICULAIRES.

C e sont des espéces d'Etuis testacés, III. Fam. tantôt coniques, tantôt cylindriques, III. Fam. Tuyaux droits, recourbés, sinueux ou tortillés, et Vermiqui ont servi de logement à des espéculaires. ces de Vers de Mer, & qui adherent souvent les uns aux autres & à d'autres corps.

On les appelle ou Tuyaux de Mer, ou Vermiculaires, selon qu'on les ren-

coquilles univalves

III. FAM. contre ou isolés, ou groupés ensem-TUYAUX ble en masses plus ou moins grosses, & ET VERMIront lieu à les partager ici en deux Genres:

- 1º. Les Tuyaux de Mer.
- 20. Les Vermiculaires.

Auxquels nous ajouterons, par forme d'appendice, un troisséme Genre, qui sera composé de ceux qui sont formés d'une substance cartilagineuse & flexible, ou de grains de sable & de fraga mens de Coquilles, ou de grains de sable seulement, liés ensemble par un fuc glutineux, foit qu'on les trouve seuls ou groupés. Quoique nous ne regardions pas ceux de ce dernier genre, comme des Coquilles proprement dites, nous n'avons pas cru devoir les ranger ailleurs, vû leur ressemblance avec les précédens.



GENRE PREMIER.

TUYAUX DE MER.

d'Amboine, nommé l'Arrofoir ou le Pinceau III. FAM.

de Mer, de six pouces & demi de long & parsaitement conservé. Il est de couleur blanche à culaires.

tête arrondie en forme de gland, & percée de petits trous, couronnée d'une espéce de fraise formée de petits tubes accolés & tenans les uns aux autres, comme autant de portions de rayons d'un même cercle *.120. 1.

* Arg. pl. 3.

51. Deux Arrosoirs de la côte Coromandel, tett. G. lift. moins grands que le précédent, & à tuyau 3 un peu recourbé, l'un à tête & fraise applaties, & l'autre à fraise fort irréguliere. Une tête d'Arrosoir, coupée au-dessous de la fraise pour faire voir l'organisation intérieure, & un Tuyau d'Amérique blanc nué de violet, ridé, & à deux replis irréguliers, dont l'extrêmité la moins grosse est fermée par une demi-sphére lisse & luisante.

52. Le grand Tuyau de mer de l'espèce des folen du sable, de sorme cylindrique, droite, ridée, & composé comme de plusieurs pièces entées l'une sur l'autre, sormant un seul tube,

Tome I.

THI. FAM.

TUYAUX
en deux par une cloison longitudinale d'un
ET VERMIpouce de long. Il est fort épais, d'un blanc fale,
culaires. & a dix-huit pouces de haut sur quinze lignes
de diametre dans le bout le plus gros. Sa forme
qui ressemble parfaitement à un cierge, lui en
156ba,tom. peut faire donner le nom 1. 48. 1.

thein cab. p. fig. 3.

53. Onze autre:, sçavoir, quatre de l'espéce du précédent, & dont le plus gros qui est courbé, a 5 pouces & demi de long, sur un pouce & demi de diametre. Un cylindrique, de huit pouces & demi de long, de cinq lignes de diametre, & sormé de quatre additions ou jets; & six petits d'Amérique un peu courbés, dont le diametre va en s'étrécissant comme aux pré-

2Rumph.tab. cédens 2. 26. 10.

54. Dix-huit Tuyaux de mer; sçavoir, deux grands Dentales des Indes, cannelés, de couleur verte foncée dans le bas, qui s'éclaircit 3 Arg. p¹. 3. jusqu'au blanc vers la pointe 3. Deux sembla-lett. HH. Bonanni, n°. 8. bles, à cela près qu'ils sont plus minces, & 4 Lister, tab. à cannelures plus étroites 4. Deux autres blancs 5 Arg. stid. droits & courts à cannelures plus prosondes 5. Huit Antales, lisses & blancs 6. Et quatre ausanni. n°. 9. Huit Antales, dont deux aurore nués nanni. n°. 9. par zones de blanc, & deux couleur de rose nués par zones de verd 7. 20.

7 Gualt, tab.

55. Un tuyau de mer des Indes & de la plus grande rareté, de couleur blanche, auquel sa

ressemblance avec un Escalier a sait donner le nom Italien de Scalata. C'est un tuyau contour- III. FAM. né régulierement en spirale de huit orbes, qui se ET VERMIfurmontent les uns les autres en forme de vis CULAIRES. conique, & dont le plus bas revient en cornet former une bouche ovale; il est revêtu extérieurement & à distance égale, d'anneaux blancs, faillans en vive arrête, se rapportant & partie se joignant d'orbe en orbe, & laissant entre deux, d'un orbe à l'autre, des jours à raison de neuf par orbe, à commencer de la bouche même que le premier borde. Il a deux quo. 1 pouces de haut & est des mieux conservés *. * Rumph.tab.

56. Deux gros tuyaux de mer, rares, de 49. litt. A. Gault tab. 10. couleur grise, de forme presque cylindrique, lett. ZZ. Arg. contournés en spirale, & nommés Tire-bourres. Cette espéce est remarquable par des stries circulaires onduleuses & ridées, & par une fente droite qui regne dans la longueur de toutes les spires, & qui en laisse voir en plusieurs endroits le dedans. La clavicule est applatie dans l'un & faillante dans l'autre *. 97 ?!

57. Cinq Tire-bourres de l'espéce du dernier des précédens, groupés à côté les uns des autres sur une production de mer grisâtre & couverte de houpes de petits poils transparens, semblables à des filamens d'alun de plumé. 80.

58. Quatre autres plus grands que les précédens, groupés sur une production marine de même espéce. 46.12!

*Séba pl. 94;

59. Six rares Tuyaux de mer de l'espéce TUYAUX nommée Solen Serpent; sçavoir, deux III. FAM. ET VERMI- fauves, dont les replis se terminent par une culaires. clavicule en forme de vis très-aigue à son ex-*Gualt. tab. trêmité*, & qu'on peut nommer Vilebrequin; Arg.pl. 4 lett. deux ridés & tortillés, de couleur rousse, dont un lisse & l'autre strié; un à côtes longitudinales épineuses, à sillon dentelé, & à replis *Rumph.tab. tortueux, imitant ceux des vers de terre *; Gualt, tab. 10 & un gros & long à trois faces, dont deux plates, & la troisiéme arrondie, à stries lon-

* Bonanni. gitudinales & transversales *. 30.2! tab.20. litt.F.

60. Dix Tuyaux de mer ; sçavoir , un gros Serpent, à stries longitudinales granuleuses, plié en spirale & adhérent à un morceau de corail oculé blanc. Trois accolés ensemble & formant divers plis semblables à ceux des intestins. Deux rares à robe rabotteuse, roulés en forme de cornes d'Ammon, l'un à trois &


* Arg. pl. 4- l'autre à deux contours *. Un grand nombre de très-petits blancs, adhérens à l'Algue malett. H.

* List. tab. rine, nommés par Lister Nautiloïdes *. Trois 554.f. 5. Klein petits Tire-bourres de l'espéce du premier de l'article 56, & trois autres de l'espéce des deux I. f. 2. premiers de l'article précédent. 9".

61. Deux Tuyaux de mer d'Amérique, rares, d'un petit diametre, & d'une extrême longueur, tortillés chacun en deux spires d'un grand nombre de révolutions, & ressemblans à des petits pains de Bougie, ce qui nous leur en fait donner le nom. 24.1.

II. FAM. Tuyaux

62. Huit Tuyaux de mer chambrés; sçavoir, et Vermiun très-rare aurore clair, à six replis irréguliers, & ouverture longitudinale dentelée des deux côtés, à petites chambres intérieures, tournant leurs convexités du côté du bout le plus mince, & qui paroissent destituées d'un siphon qui les traverse toutes, tel qu'on l'observe dans celles des Nautiles chambrés. Six autres, ronds, roulés en spirale plate, à cloisons nacrées, traversées d'un siphon, nommés Ammonies, & en Hollande Cornets de Postillon*. Un autre de même espèce, percé de *Arg. pl. 54 quelques trous latéraux pour en faire yoir les chambres; & quelques diaphragmes ou cloi-



sons détachées garnies de leur siphon. 18.1?

GENRE. SECOND

VERMICULAIRES.

63. ROIS grands & beaux groupes, l'un de III. FAM. gros Tuyaux Vermiculaires du Golfe de Vetuvaux nise, à stries longitudinales granuleuses; les et vermiculaires. deux autres de la Méditarranée, moins gros, lisses & blancs. Ils adhérent l'un à un grand Peigne, l'autre à une valve de Cœur de Bœuf*.

* Arg. pl. 4. 164. Quatre autres groupes, des deux varié
* Ibid. pl. 4. tés de l'article précédent * . 16. 19.

65. Neuf Variétés de Vermiculaires, sçavoir, un groupe de Vermiculaires peu communs, minces comme du sil sin & diversement tortillés *. Un autre de deux tubes à plis ciratab. 100.11° culaires en vive arête de distance en distance, qui les sont ressembler à plusieurs gobelets empilés les uns dans les autres, & qu'on nomme Tuyaux Trompettes. Une grosse Came chargée de vermiculaires blancs & triangulaires à côte longitudinale en vive arête sur le milieu du corps. Et six autres Variétés dont quelques-unes déjà décrites.

66. Quatre groupes de Vermiculaires, dont deux blancs operculés du Sénégal, nommés Ver* Adanson, mets *. Et deux réguliers d'un beau pourpre

foncé, connus sous le nom de Tuyaux d'Orgue.

Plus un opercule de Vermet détaché, ainsi T
que l'animal *. 9.2.

III. FAM.
TUYAUX
ET VERMIT
CULAIRES.

67. Un groupe de Tuyaux d'Orgue, de « Arg. pl. 43 près de huit pouces de longueur, sur près de lett. A. six de largeur & autant de hauteur. 18. 1.

68. Un autre groupe de Tuyaux d'Orgue; moins gros que le précédent, mais de couleur

plus vive. 14.

Vermiculaires de la Méditerranée, partie operculés, partie de l'espéce appellée Tuyaux Trompette, lequel renserme plusieurs pétoncles. 15.5.

70. Deux amas de Vermiculaires très-blancs, groupés à l'entour de fragmens de bâtons, & qui posent sur des pieds de bois des Indes; & un autre amas de Vermiculaires, semblable à celui de l'article précédent, mais plus petit. 4.19.

71. Un gros groupe de Vermiculaires du Sénégal, des deux espéces, brune & blanche, nommées Vermets & Dofans*, formé en *Adans. pla éventail, auquel adhérent des huîtres feuillettées & des glands de mer: il a dix pouces de haut sur douze de large, & est posé sur un pied de bois noirci. 145.



GENRE TROISIEME.

TUYAUX ET VERMICULAIRES NON TESTACÉS.

72. A RENTE-CINQ Tuyaux de mer; sçavoir, III. FAM. fix cartilagineux, dont un fimple & mince, Tuyaux un peu élastique, brun rougeâtre, les cinq autres TT VERMI- un peut danique, bruit ougearte, ies em autres culaires. font des étuis de Scolopendre, à double coque, dont l'extérieure est mince, grise noirâtre & ridée, l'intérieure un peuplus épaisse, très-lisse, de la dureté & transparence de la corne. M. Ellis *Ellis, pl. 34. les nomme Coraline tubuleuse de Malte *. Trois mar. tab. 1. f. d'une autre variété, cartilagineux, longs, minces & fragiles. Douze à robe raboteufe & fragile formée de sable & de fragmens de co-* Klein. tub. quilles *. Deux autres de même espèce, mais mat. tab. 1.f. de confistance plus solide; six autres adhérens à autant de pointes d'oursins. Quatre papyracés de forme conique tronquée, lisses & fragiles, *. Et un de la côte de Coromandel 1* Klein Ibid. à robe seulement formée de fragmens de cotab. 1.f. 5. quilles. Plus une Scolopendre de l'Isle de Saint-Helene, avec son tuyau, conservés dans l'Esprit de vin. 13.3. 73. Un gros groupe de Tuyaux Vermicu-

> laires de l'Océan, formés de fable & de fragmens de coquilles; la surface, où aboutissent

les bouches des tuyaux, offre à l'œil des compartimens à peu près femblables à ceux des III. Fam. Tuyaux et gâteaux des mouches à miel *, mais dont les Vermicu-cellules feroient rondes & non exagones; il Laires. est de la plus belle conservation, & porte 15 * Ellis, pl. pouces 3 lignes de large sur 5 & demi de haut. C. Mém. de

74. Deux groupes de Vermiculaires; fça-PAcad. des Seevoir, un de l'espéce de ceux de l'article pré-134, pl. 2, facédent, mais d'un volume à pouvoir entrer dans des tiroirs, & un d'autre espéce formé de gros sable blanc seulement, & venant de l'Isle de l'Ascension: plus des boëtes où sont des sables & autres fragmens provenans de la décomposition d'une partie de chacun, qu'on a rassemblés pour pouvoir à volonté les examiner au Microscope. 36.1.



QUATRIEME FAMILLE.

NAUTILES.

IV. FAM.

en spirale de trois révolutions, toutes dans un même plan, & dont la dernière paroît seule extérieurement. Elles ont l'apparence d'un petit navire ou gondole à poupe élevée.

Les Coquilles de cette Famille sont ou épaisses & cloisonnées, nacrées en dedans, à carenne lisse & arrondie; ou papyracées & non cloisonnées, ni nacrées, à carenne tuberculeuse plus ou moins large, d'où résulte leur division en deux genres.

19. Les Nautiles épais & chambrés!

2°. Les Nautiles papyracés non chambrés.



GENRE PREMIER.

NAUTILES ÉPAIS ET CHAMBRÉS

75. N grand Nautile des Indes, fauve trèsclair, à flammes onduleuses cannelle dans la moitié de sa robe la plus voisine de la tête, & à grande tache noire dans l'origine de la seconde révolution *. II.

76. Un autre blanc qui differe du précédent lett. E. en ce que sa tache noire y est plus grande & se prolonge en une raye fine qui borde l'intérieur de la bouche *. 18.19.

77. Un autre fauve foncé, à flamme can-17, fig. A., nelle, & où la tache noire ne forme qu'une zone

peu large. 16. 10.

78. Un autre dépouillé & par-là nacré, tant en dedans qu'en dehors, & d'un bel orient. 17.1.

79. Trois Nautiles chambrés & umbiliqués, dont un de moyenne grandeur à flammes blanc de lait dans toute sa robe, & deux petits dépouillés *.24.*

80. Les mêmes Nautiles qu'à l'article pré-lett. F. Gualt. cédent, excepté que l'un des deux petits n'est

* Arg. pl. 55

point dépouillé. 25.7.

81. Un grand Nautile chambré, coupé en deux fuivant sa longueur pour en laisser voir l'inté-

rieur *. Un percé de divers trous du côté qui IV. FAM. répond à ses chambres, & vers la tête d'un NAUTILES. plus grand, laissant à découvert un intervalle * Gualt. pl. de trois cloisons; & la portion chambrée d'un autre, ouverte en divers autres sens. 20. 2.

GENRE SECOND.

NAUTILES PAPYRACÉS, NON CHAMBRÉS.

82. N Nautile papyracé de la Méditerranée, blanc de lait, à stries onduleuses unies, à carenne étroite, brune dans la moitié de sa longueur, de 7 pouces 4 lignes de long, avec son

*Arg. pl. 5, polype desséché & bien conservé *. 36. Zoomorp. pl. 83. Le même Nautile, mais moins long d'un 2, f. 2 & 3. demi pouce, & sans polype. 35. 19.

84. Un Nautile semblable aux précédens; à cela près que la couleur blanche en est moins vive, & que les bords d'une partie de la carenne en sont plus noirs. 25.

85. Un Nautile des Indes papyracé, blanc tirant sur le fauve, à stries chargées de petits tubercules en forme de grains de ris, à deux crochets saillans ou oreilles, à carenne large, *Arg. pl. 5, & de 5 pouces 4 lignes de long *. \$5.2.

86. Un du Bresil de l'espèce du précédent, mais moins grand, & d'un beau blanc de lait.

50.

87. Deux Nautiles, l'un de l'espèce du précédent, mais beaucoup plus petit; l'autre sans tubercules, de couleur blanche tirant sur le Nautiles, roux, à carenne large & très-petit *.21.1.

88. Un Nautile de moyenne grandeur, lett. B. Seba, tom. 3, tab. à stries chargées de grains de ris, mais dif-34, n°. 9 & férent de ceux des articles 85 & 86, en ce qu'il n'a pas d'oreilles, & par-là plus rare *. *Seba, tom. 3, tab. 84,



CINQUIEME FAMILLE.

LIMAÇONS.

en spirale, depuis deux orbes jusqu'à V. FAM. dix, dont on distingue trois genres; LIMAÇONS, square,

1°. Les Limaçons à bouche ronde, & à levre extérieure, presque perpendiculaire à la base.

2°. Les Nerites ou Limaçons à bouche demi-ronde, & à levre extérieure, presque perpendiculaire à la base.

3°. Les Sabots ou Limaçons à bouche ovale & à levre intérieure, presque parallele à la base.

GENRE PREMIER.

LIMAÇONS A BOUCHE RONDE.

89. Limaçons, l'un lilas vif, l'autre V. FAM. blanc, nué de gris de lin, nommés Dauphins *.8." LIMAÇONS 90. Deux autres Dauphins un peu plus * Arg. pl. 6, lett. H. Scha, grands, l'un couleur de lilas, & l'autre sans tab. 59, n°. 15 avoir été nétoyé *. 7. 3.

82 16. * Seba, ibid. n°. 20 & 21.

91. Deux autres plus grands, à pointes & feuilles plus nombreuses, mais moins saillantes

* Séba, ibid. qu'aux précédens *. 12".

nº.7,8811. Gualt. tab.68, litt. D.

92. Deux très-grands Limaçons des Indes, de forme renslée, & du genre des Burgaux nommés Olearia, parce que les anciens s'en servoient pour mettre de l'huile. L'un est umbiliqué & d'un verd foncé; ce qui le fait aussi * Bonan. cl. nommer Pot-verd *. L'autre différe du premier en ce qu'il n'a point d'umbilic; il est dépouillé & montre en dehors comme en dedans

Gualt. tab. 64, 25: 19. une très-belle nacre *. Plus un grand Oper-* Gualt. tab. cule qui appartient aux Coquilles de ce genre. 68, litt. A.

2 , nº. 9.

93. Deux Burgaux dépouillés de l'espèce du dernier des précédens, mais moins grands. 48.3.

94. Deux Burgaux, l'un plus grand, l'autre moins, à robe verte, marbrée de blanc & de marron, nommés en Hollande Princesses, Dans le plus grand, la côte la plus élevée se = rend à la bouche par un gros pli formant en y, FAM. dedans une espèce de gouttiere *. L'autre est Limaçons. d'un verd moins foncé. 24".

* Rumph. tab.

95. Deux Burgaux rares, sçavoir, un dé-séba, tab. 74, pouillé en partie, dont la robe n'offre aux yeux que du noir & de la nacre, & qu'on nomme Veuve perlée; & l'autre dépouillée jusqu'à la nacre qui est très-brillante; tous deux à tête orangée *. 66.19.

* Arg. pl. 85 96. Un plus gros, de même espéce, aussi dé-lett. B. pouillé, à robe nuée de rouge & d'orangé, de

l'éclat du rubis. 396.2!

96. Le même Burgau que le précédent, dépouillé en partie seulement, noir & orangé. dans le reste, nommé Burgau perlé. 21. 1.

98. Deux Burgaux rares de la Chine, verd foncé, nués de jaune, à cannelures & stries circulaires & inégales, croifées d'autres transversales, fines & onduleuses, à cinq pas de spirale, & à très-petite quene: l'un à cinq rangs de tuiles saillantes, diminuant de grandeur de la bouche à la tête, & l'autre à deux rangs seulement. 48"1.

99. Deux beaux Burgaux en pendant, blancs marbrés principalement par zônes d'un beau verd, dépouillés en quelques endroits jusqu'à la nacre, à tête un peu élevée, à fix orbes, & nommés Perroquets perlés. 57."

V. FAM. traits blancs interrompus, nommé Veuve, & LIMAÇONS. cinq autres flambés plus ou moins régulière-

Bonanni, cl. 04 to 12 Trois beaux Limaçons, sçavoir, un à 3, nº. 29 & 101. Trois beaux Limaçons, sçavoir, un à 30. Arg. pl. 8, fries circulaires & tuberculeuses, nommé Boulett. G.

2 Arg. pl. 6, che d'or 2; un à stries circulaires, sans tuberculett. D. Séba, che d'or 2; un à stries circulaires, sans tuberculett. D. Séba, ibid. longitudinales, serrées & peu prononcées, 150. 4, Rumph.

tab. 19, n°. 3. nommé Ruban 4. 18.

4 Séba, ibid.

102. Trois Coquilles des espéces précédenn°. 27. Arg.
pl. 6, lett. K. tes, mais un peu différentes par la grandeur
& les couleurs. 15.13.

103. Trois autres de marbrure différente, séba, pl.74, sçavoir, une Bouche d'or s, fermée par son n°. 108 11. opercule, une Bouche d'argent 6 & un Ruban. 6 Séba, ibid. 104. Trois Limaçons semblables aux précé-

dens, à cela près que les couleurs en font un peu différentes, & que la clavicule de la Bouche d'argent est d'un rouge de corail. 30.

105. Deux Rubans un peu différens des précédens, & l'un de l'autre, & une Bouche d'argent qui différe de celle de l'article 101, en ce que les pas en sont applatis & bordés extérieurement d'une strie plus sorte que les autres. 12.3.

106. Deux grosses Bouches d'argent d'Amérique, & d'espèce rare, marbrées par bandes longitudinales, obliques & irrégulieres, l'une

de

Le blanc & de fauve de diverses nuances, l'autre de blanc & de verdâtre, à groffes fries V. FAM. transversales, un peu applaties, croisées d'au-Limaçons tres longitudinales & obliques, très-fines & serrées, à tête élevée, à six orbes arrondis, & à pas creusés en dedans. 14.1.

107. Six Limaçons de moyenne grandeur; sçavoir, deux Rubans, deux Bouches d'or & deux Bouches d'argent qui sont à stries & à tuz bercules, comme les Bouches d'or. 15. 10!

108. Six autres, sçavoir, un à taches blanches, olives, & brunes, nommé Peau de serpent *; deux Bouches d'argent, l'une marbrée * Arg, pl. 61 de fauve & de brun, l'autre de verd & de noir; lett. C. un Perroquet perlé, un Petit-deuil & un Ruban. 20.1.

109. Dix Limaçons un peu moins grands que les précédens, & par pendans deux à deux; sçavoir, deux blancs tachetés par compartimens de noir, sans umbilic, & qui peuvent former une seconde espèce de Petits-deuils : deux Petits-deuils de la premiere espèce, deux Peaux de serpent, deux Perroquets perlés & deux Rubans. 18.

110. Vingt - fix petits Limaçons; sçavoir, deux noirs, nués de fauve dans le bout, nommés Marrons rôiis *; deux de forme à peu près *Ibid. lett. 7. semblable, & rayés par zônes de fauve, de jaune & de noir *; deux de forme bombée & * Gualt- tab. à bouche argentée, dont la robe est chargée 45, lit. A, C,

Tome I.

d'une suite de petites taches oblongues, pourpre-clair, rangées par lignes circulaires 1; deux Limaçons. blancs tachetés de noir, par bandes longitudi-Lister, tab. nales en zig-zag, & du reste, semblables aux * Ibid. fig. 33. précédens 2; deux petits Burgaux à tête élevée, marbrés de blanc sale & de noir, dont un dépouillé en partie & par bandes obliques jusqu'à la nacre; deux autres umbiliqués de l'espéce des Peiits-deuils ; deux Bouches d'or, deux Bouches d'argent, deux Rubans, un Limaçon dépouillé, d'une belle nacre, très-singulier en ce que la tête en est rouge de corail très-vif; un couleur de noiserte, à tête dépouillée, jouant l'opale; six autres dépouillés & nacrés partout. Plus deux bracelets faits, l'un de petits Burgautins dépouillés, enfilés enfemble, & l'autre de gros fragmens de Petits-deuils, avec un lambeau de ceinture de Sauvage, tissu de petits morceaux de coquilles, violets & blancs, cylindriques & creux. 18.

111. Deux Burgaux des Indes, très-rares, verds, marbrés, l'un de blanc, l'autre de rouge & de blanc, à tête orangée, à quatre pas un peu applatis & obliques, bordés de tubercules peu élevés, à umbilic & à un pli dans l'angle des deux lévres, du côté de la bouche le plus près de la spirale. 18.

112. Dix Limaçons des Indes; fçavoir, deux fauves qui différent des précédens par leurs stries

granuleuses, & en ce que l'un des deux n'est point umbiliqué ; un de l'espèce de ce dernier, V. FAM. dépouillé & d'une belle nacre; un petit, d'ef-Limaçons? péce à peu près semblable, verd soncé, marbré 1 List tab. de blanc ; deux petits Burgaux de la forme des précédens, fauves, nués de verd, umbiliqués & légérement striés; un à robe marron clair. chargée de grandes taches blanches, & de huit lignes circulaires, ponctuées de blanc, nommé en Hollande le Turban Turc 2; le même dépouillé & d'une belle nacre, & deux blancs, à 74, nº. 14. quatre orbes poin illés de pourpre, à stries granuleuses & à gros tubercules 3. 13." 3 Arg. pl. 6,

113. Cinq gros Burgaux; scavoir, une Bou-lett. Q. che d'argent d'une grandeur extraordinaire & de couleurs très-vives; une Veuve, un Limacon dépouillé 4; deux percés à jour en diffé- 4 seba, taba rens sens, pour donner la facilité d'en observer 74, nº, 7. le dedans, & un opercule d'Olearia. 9.5!

114. Vingt-einq opercules de Limaçons, à bouche ronde, dont douze variétés; sçavoir, un grand d'Olearia, blanc & lisse en dessus, à spirale fauve en dessous 5; un moins grand, de s Rumph. tab. forme plus bombée, à stries fines & onduleuses 20, litt. A. Gualt. tab. 70, en dessus 6; deux aurore, nués de brun vers le litt. A. fommet 7; deux autres couleur de chair dans 20, litt. G. le bas, noirs aux sommets, qui ont appartenu à 7 Ibid. litt. B. Guale. ibid. des Bouches d'or; un blanc légérement strié, litt L. lisse & verd d'Eméraude au sommet 8; deux litt. M.

\$70, fig. 21.

20, litt. I.

granuleux, l'un blanc en dessus, & l'autre blanc LIMAÇONS. nué de fauve dans le bas, verds au sommet; un grand, blanc, hérissé de tubercules dans sa * Gualt. tab. partie convexe *; six Nombrits de Vénus, lisses, convexes vers les bords, mais creux au milieu,

* Ibid litt de couleur rouge, un peu nuée de blanc *; E, F. Rumph. deux autres petits Nombrils de Venus, blancs & ibid, litt. C, E. deux autres petits Nombrils de Venus, granuleux en dessus; un très-petit, blanc, nué de couleur de chair, & six autres entiérement

blancs. 8.1.

GENRE SECOND.

LES NÉRITES.

115. A ROIS Nérites des Indes, rares ; sçavoir, une blanc-sale, à stries longitudinales, très-fines & serrées, un peu onduleuses; elle ne différé de la petite oreille blanche sans trous, de l'article 49, que par sa clavicule plus élevée & sa forme plus bombée *; une de même es-

* List. tab. péce, fauve-clair nué de blanc, polie, & dont les stries ont presque disparu, & une blanche à coque très-épaisse, à stries fines transversales, à levre intérieure garnie de dents, & s'extra-6. vasant en forme d'excrescence sur toute la base.

116. Trois grandes Nérites umbiliquées, la premiere des Indes, fauve foncé, à quatre fascies blanches, tachetées de flamines brunes en zig-zag 1; les deux autres nommées Cordonbleu par Dargenville 2. Celles-ci sont terrestres, V. Fam. & appartiennent à la troisséme Section. 40.2! Limaçons.

dans; sçavoir, deux des Indes, nommées Testi-2 Ibid. pl. 17, cules 3, & deux de l'espèce de la premiere de lett. B. 15. 1. l'article précédent, mais un peu moins grandes, lett. V.

118. Deux Nérites rares des Indes, fauves en dessus, blanches en dessous, nommées le Jaune d'œuf applati 4. 26.

blanches, mouchetées de souci 5, & deux Tef- 5 Gualt. tab. 67. litt. 8.

voir, deux Grives 6, deux Mammelons blancs 7, 6 Arg. pl. 7, & deux umbiliquées, nommées en Hollande Jau-lett. B. 7 Ibid. lett. nes d'œufs 3. 15.6.

121. Dix Nérites par pendans; sçavoir, deux tab. 22, lit. A. à lévre intérieure garnie de deux dents, surmontées d'une tache rouge, & nommées pour cela Quenottes saignantes?; deux blanches, 9 Arg. pl. 7, nuées d'incarnat, à quatre zones blanches, ta-lett. H. O. chetées de roux, & umbiliquées 10; deux de l'espéce des premieres de l'article 119; deux Jau- 560, nº. 3.
nes d'œufs, & deux Grives, dont une à stries fines, quoiqu'à larges cannelures. 18.

122. Deux Nérites des Indes, rares, blanc de lait, lisses, à quelques plis près qui regnent autour de leur spirale, umbiliquées, à appen-

V. FAM. se plongeant dans l'umbilic, & à angles des lé-LIMAÇONS, vres, très-saillans. 6.

fçavoir, deux rares de la Chine, fauve roux, à trois bandes longitudinales blanches, & umbili*Arg. pl. 7. quées *; deux Mammelons blancs, & deux Mammelons souci, à tête & base blanche, ce qui

les rend rares. 17.4!

124. Douze Nérites des Indes, par pendans, fçavoir, deux blanches, à trois bandes longitudinales, bariolées de canelle, dont les intervalles

* Gual. tab. font ponctués de même, & umbiliquées *; deux 67. litt. Q. blanches, picotées de marron clair, à tête éle-

* Ibid. litt. vée, & umbiliquées *; deux à groffes stries lon-N. Arg. pl. 7, gitudinales noirâtres, & cannelures profondes punâtres, à lévres intérieure & extérieure gar-

* Arg. pl. 7. nies de dents *; deux marbrées par grandes taches de blanc & de verd noirâtre, à stries sines

* Ibid. lett. E. & égales *; deux Mammelons blancs nues de couleur de chair, & deux Quenottes saignantes des plus vives couleurs. 13."

dans; sçavoir, deux gris de lin, à trois bandes * Rumph, longitudinales blanches *, & dont une conserve tab. 22. 18.2. 19.2. son opercule; deux blanches à stries longitudinales raboteuses, à lévres garnies de dents, confervant toutes deux leurs opercules; deux blanches, tachetées de noir, & à cannelures larges

& profondes *; deux semblables aux deux premieres de l'article précédent; deux comme les
feptieme & huitieme du même article; deux

Mammelons, l'un blanc, l'autre souci, & 599. fig. 15.
deux très-belles Quenottes saignantes. 16.

voir, deux des Indes, à stries longitudinales noires, & cannelures grises plus ou moins profondes, dont une avec son opercule; deux d'Amérique, noires, ponctuées de jaune pâle *; *Arg. pl. 7. quatre petites de la Méditerranée, jonquille, de no. 4. forme renssée *; quatre autres, marron fascié * List. tab. de fauve clair *; deux de l'espéce de la troisseme * Ibid. sig. & de la quatrieme de l'article précédent; deux 40. grandes Quenottes saignantes d'Amérique; deux grands Mammelons blancs; deux Jaunes d'œuss; & deux Grives. 11. 19.

voir, deux de la Méditerranée, blanc de lait, à fix orbes renflés, à tête un peu élevée, & umbiliquées *; deux des mêmes parages, & de forme semblable aux précédentes, mais d'un brun 67. litt. E. verdâtre; deux de l'espèce de la premiere de l'article 116; deux à peu près semblables aux septieme & huitieme de l'article 124; deux grandes Quenottes saignantes; deux Jaunes d'œufs, & deux Grives. 15.1.

128. Dix-huit Nérites, par pendans; sça-voir, deux des Indes, à fond blanc picoté de

Hiv

noir, & à deux larges zônes noires*; deux pe-V. FAM. tites des Indes, blanches, tachetées & ponc-Limaçons. tuées par zônes de roux, & umbiliquées; deux * Arg. pl. 7. blanches, ondées en zig-zag de fauve roux: * Adans. Hist. c'est le Gochet de M. Adanson *; deux à robe 13. fig. 4. noire; deux petites, jonquilles, semblibles aux * List. tab. 167. fig. 17. quatre de l'article 126; deux Quenottes saignanses; deux grandes Grives; deux Jaunes d'œufs, & deux Mammelons blancs. 10. 10.

129. Huit belles Nérites des Indes; sçavoir, une blanche, marbrée de fauve clair, à trois larges bandes longitudinales cramoifies; deux à trois bandes pourpre, & bariolées de blanc & de verdâtre; une de même espéce, mais à bandes plus prononcées, & taches verdâtres isolées; une gris de lin, tachetée par zône de brun & de verd céladon, à quatre orbes de forme bombée, à bouche nacrée & doublée en dessus de blanc mat; ce qui a fait nommer cette Coquille Bouche double; une de même espéce, dépouillée, d'une belle nacre, à tête verd d'éméraude & à stries circulaires bien prononcées; deux blanches, umbiliquées, à lignes roussâtres, * Lift. tab, transversales & onduleuses *, & deux Quenot-

tes faignantes. 72.1: 359. nº. 1.

> 130. Sept Nérites des Indes peu communes; scavoir, deux à bandes longitudinales, alternatives blanches & noires, & à tête aurore; une àbandes alternatives noires & blanches nuées de

lilas; deux de même espéce, dont les bandes v. Fam. Limaçons: dans l'une, & de jaune dans l'autre i; deux Bouches doubles; plus six petites Nérites, à lé-lett. M. vre extérieure non garnie de dents, de Lister; qui sont, la blanche à lignes noires fines, onduleuses, ombrées 2; celle à lignes larges, blanches & noires alternatives 3; celle à taches jau- liste fig. nâtres 4; l'ondulée 5; la réticulée 6; & la blan- libid. fig. che à taches noires triangulaires 7. 15:4.

res, dont une blanc fale nué de gris, à ffries 28. transversales onduleuses, & à un rang d'épines 7 Ibid. fig. couronnant son premier orbe; on la nomme Epineuse 8; & une blanche, nuée dans deux tab. 22. lit. O.


bandes longitudinales de jonquille pâle, umbiliquée & à stries longitudinales & transversales, piquées, partout où elles se croisent, d'un petit point creux. 6.2.

132. Vingt-une jolies Nérites, d'especes, sormes, couleurs & marbrures déja décrites, & très-variées.

133. Idem. 16.1.

134. Trente-quatre Nérites, d'espéces, formes & couleurs non moins variées que les précédentes, dont deux d'une beauté singuliere, à trois zones orangées, & tachetées de verd & de noir sur un fond blanc. 14. 10.

135. Deux cartons contenant soixante-



V. FAM. Limaçons.

feize petites Nérites des Indes & d'Amérique, d'un très-beau choix, & d'une très-grande variété. 3.1.

Nérites, plus petites encore que les précédentes, des mêmes parages, & non moins variées.

137. Quatre Nérites des Parages de Hollande, recouvertes d'une incrustation grise granuleuse & épineuse, qui paroît être un ouvrage de Polype; l'une est occupée par un Bernard l'Hermite. Six petites Nérites de Lister *. Un carton contenant soixante - quinze

* List. rab. Nérites choisies & très - variées. Une petite 605. sig. 31. & boëte de semences de Nérites de la Barbade, 34. 35. 36. 37. d'un verd clair. * Une autre de petites Nérites 38.

* List. tab. du Brésil, bariolées de diverses couleurs, & nommées Pois de Mer. Une grosse Nérite fauve découpée en spirale pour en faire voir le dedans, & six opercules de Nérites de différentes gran-

* Gualt. tab. deurs, dont trois variétés *. 3.3.

Rumph. tab.
20. nº. 5 & 6.

List. tab. 560.

fig. 4.



GENRE TROISIEME.

LES SABOTS.

platie, nommé l'Escalier ou le Cadran *.15. LIMAÇONS.

139. Un Cadran semblable au précédent. 1.2. séba, tab.

139. Un Cadran lemblable au precedent. La Seba, tao. 140. Un grand Cadran de la Côte Coro-40. n°. 1 & 2.

mandel, à stries transversales, plus prosondes, à taches moins régulières & plus grandes que

celles des précédents, dont il est une variété * 1 bid. n°.
141. Deux Cadrans d'une troisiéme variété, 41 & 42.

& moins grands que les précédens *. 20. * 1bid. n°

142. Quatre Sabots de forme peu élevée: 13 & 14. Arg. fçavoir, deux d'Amérique umbiliqués, l'un blanc nacré, & l'autre verd nacré, appellés l'Eperon, tous deux grands dans cette espéce *; & deux Cadrans de moyenne grandeur, * List. tab.

ce *; & deux Cadrans de moyenne grandeur, * List. tab. de l'espéce de ceux des articles 140 & 141 ... 6. Arg. pl. 8. let.

143. Neuf Sabots; sçavoir, deux des Indes H.

à stries granuleuses, à bouche nacrée, & à umbilic, connus sous le nom de Bouton de camisole *; deux de la Méditerrannée, aussi umlett. L.Q. List.
biliqués, & de l'espéce nommée Sorciere *. Un pl.637. sig.25.

Eperon semblable à ceux de l'article précédent, lett. s.

à sa couleur près, qui est nuée de citron, de
verd & de blanc. Deux autres petits Eperons
fauve - clair, de forme sort élevée, & sans

V. FAM. de l'article 141. 21.12!

*Séba tab. 144. Dix Sabots par pendans deux à deux;

*Séba tab. 144. Dix Sabots par pendans deux à deux;

*Séba tab. 144. Dix Sabots par pendans deux à deux;

*Séba tab. 144. Dix Sabots par pendans deux à deux;

*Séba tab. 144. Dix Sabots par pendans deux à deux;

*Esba tab. 144. Dix Sabots par pendans deux à deux;

*Esba tab. 144. Dix Sabots par pendans deux à deux;

*Esba tab. 144. Dix Sabots par pendans deux à deux;

*Esba tab. 144. Dix Sabots par pendans deux à deux;

*Esba tab. 144. Dix Sabots par pendans deux à deux;

*Esba tab. 144. Dix Sabots par pendans deux à deux;

*Esba tab. 144. Dix Sabots par pendans deux à deux;

*Esba tab. 144. Dix Sabots par pendans deux à deux;

*Esba tab. 144. Dix Sabots par pendans deux à deux;

*Esba tab. 144. Dix Sabots par pendans deux à deux;

*Esba tab. 144. Dix Sabots par pendans deux à deux;

*Esba tab. 144. Dix Sabots par pendans deux à deux;

*Esba tab. 144. Dix Sabots par pendans deux à deux;

*Esba tab. 144. Dix Sabots par pendans deux à deux;

*Esba tab. 144. Dix Sabots par pendans deux à deux;

*Esba tab. 144. Dix Sabots par pendans deux à deux;

*Esba tab. 144. Dix Sabots par pendans deux à deux par pendans deux à deux pendante par pendans deux à deux pendante par pendan

cave, & umbiliqué. 14.

pendant; l'un blanc-sale, mêlé de verdâtre, de forme conique un peu élevée, à stries longitudinales larges & un peu onduleuses, à trois tours de spire, à bords dentelés & à base * List. tab. concave *; l'autre nué de verd & de grisde lin, de forme conique plus élevée, à stries longitudinales moins larges & moins prononcées, à sept tours de spire, à base très-con-

146. Deux Sabots d'Amérique, de forme conique, à robe recouverte de diverses sortes de coquilles, ou fragmens de Coquilles, de Madrépores, de Cailloux, &c. à orbes renflés, raboteux, comme hachés à coups de marteau, & se recouvrant l'un l'autre de haut en bas, à base très-concave, & striée en spirale, & de l'espèce nommée en France Fripiere, & en Amérique Conchiliologie. Ceuxci sont très-grands dans leur espèce. 10.

147. Trois Fripieres moins grandes que les précédentes, dont une chargée d'un grand V. FAM. nombre de très - jolies Coquilles, & les Limaçons. deux autres en pendant, moins chargées de Coquilles, mais sur chacune desquelles on voit un Fongipore de l'espéce nommée Œillet de Mer. of.

148. Deux Sabots des Indes & très-rares, noirs, à sept orbes bombés, à stries longitudinales, obliques, onduleuses, croisées irréguguliérement par d'autres transversales, à base fauve dans l'un, fauve nué de noir & de verd d'éméraude dans l'autre, & à bouche

d'une très-belle nacre. 60.5!

149. Douze Sabots par pendans deux à deux, sçavoir, deux des Indes à tête élevée, & à plufieurs étages chargés de tubercules finissant en pointe, qui les ont fait nommer la Pagode ou le Toît Chinois *; deux de la Méditerranée de forme * Arg. pl. 8. moins élevée, à cinq orbes renflés, & cou-lett. A. Rumph. tab. ronnés de tubercules longitudinaux en forme 21. litt. A. de plis, à bouche nacrée, & à lèvre inférieure bordée d'aurore *; deux de même espéce dé- * Bonan, cl. pouillés & nacrés: deux Sorcieres, deux Boutons 3. nº. 11. de Camisole, & deux Cadrans. 12". 3.

150. Huit Sabots; sçavoir, deux grands umbiliqués, à tête élevée, de l'espéce nommée Cul-de-lampe, & qu'on appelle plus particuliérement Bouton de la Chine *, l'un desquels * Arg. pl. s.



est dépouillé de distance en distance jusqu'à la na V. FAM: cre. Deux verds & blancs, dont toutes les spires Limaçons. font chargées de petites tuiles couchées de haut * Gualt. tab. en bas, un peu saillantes, & à bouche nacrée *. 62. litt. H. Deux de l'espèce des troissème & quatrième de l'article précédent, dont un conserve son opercule, & deux des Indes, verd nué de blanc, à robe réticulée, & à grosses côtes obliques on-

* Arg. pl. 8. duleuses *. 6. lett. I.

151. Deux Culs-de-lampe de l'espèce des deux premiers de l'article précédent, mais plusgrands. 16.4.

152. Deux autres de même espéce, mais à base plus large, l'un desquels est taché par flammes plus grandes & moins confuses; l'autre est en partie dépouillé jusqu'à la nacre. 17.19.

153. Cinq Culs-de-lampe moins grands que les précédens : sçavoir, un blanc, fauve & verd, à stries circulaires granuleuses *: un à-& Gualt. tab. peu-près de même forme, & dépouillé en li-60. litt. C. gne spirale, & trois umbiliqués, dont un à spirale bordée d'un cordon de tubercules *, & * Rumph. tab. 21. nº. 3. les deux autres de l'espèce de ceux de l'article

151. 7.5%

Do. litt. M.

154. Seize Culs-de-lampe de moyenne grandeur : sçavoir, deux Toîts Chinois de nos mers, verdâtres, nués de blanc-sale, à étages moins faillans, & à moins vive arrête que ceux des * Gualt. tab. Indes *; deux Culs-de-lampe verds nués de blanc, à base dentelée, & à tours de spire, chargés de tubercules *. Deux des mêmes V. FAM. couleurs, à base plus large, granuleuse & den-LIMAÇONS. telée, à stries tuberculeuses, & umbiliqués*; deux 60. litt. N. à flammes longitudinales, alternatives blanches & rouges, à stries granuleuses, & umbiliqués *: * 1bid. tab. deux marbrés de blanc & de verd, de forme 61. litt. E. un peu renflée, à stries granuleuses & tuberculeuses, aussi umbiliqués *; deux à flammes lon- * Ibid. litte gitudinales, alternatives blanches & vertes, à DD. stries granuleuses, & à base un peu concave *: * List. tab. deux de l'espèce du premier & des deux der- 631. fig. 17. niers de l'article précédent, & deux dépouillés. 15.

155. Dix-neuf Culs-de-lampe de moyenne grandeur, & au-dessous; sçavoir, deux lisses marbrés de rouge & de violet, à orbes séparés par un cordon *; deux à stries fines circulaires, * Gualt. taba marbrés de blanc & de jaunâtre *; deux cou- * Ibid, litt. leur de souci, lisses & à bouche moins com- G. primée *; deux rose-seche, à stries circulaires fines & granuleuses, à base un peu con-L. vexe, tachetés çà & là de petits points rougeâtres *. Un rare à stries circulaires blanches & ficelées, & à cannelures noires, chargées elles- M. mêmes de stries obliques très - fines, à base platte, & umbiliqué. Deux petits à robe-grise tachetée de violet-foncé, à cinq étages de spire bombés & détachés, à côtes longitudinales un peu tuberculeuses, & umbiliqués. Un cou-

* Gualt, tab.

* Thid. litt.

leur de rose, à larmes blanches disposées régui liérement & à distances égales autour de sa LIMAÇONS. spirale, à stries circulaires, fines & granuleuses, & umbiliqué. Un marbré de blanc & de rouge, à stries circulaires granuleuses & tuberculeuses. Deux tachetés de verd, de noir & de violetclair, à stries cordelées, à base renssée, & à bouche nacrée, doublée de blanc mat, ce qui les fait nommer Bouches doubles, & quatre dépouillés, dont deux umbiliqués. 60.1?

156. Neuf gros Sabots, sçavoir, deux d'Amérique blancs nués de couleur de rose pâle & de verd, à cinq orbes renflés, bordés chacun dans le bas de trois cordons, tuilés de distance en distance, & chargés de stries & de plis tuberculeux, à base striée & tuilée circu-* Séba, tab. lairement, & à bouche dentelée *; deux 50. n°. 1 & 2. Culs-de-lampe de l'Isle de France, blancs nués

de verdâtre, de forme conique très-élevée, à

côtes tuberculeuses saillantes le long de la spi-* Bonan, cl. rale & à base dentelée *; un du même endroit, gris verdâtre, à groffes côtes longitudi-2. fig. 90. nales obliques, disposées de façon que celles d'un pas répondent aux cannelures de l'autre pas, à base striée circulairement & dentelée;

deux comme les troisiéme & quatriéme de l'article 149, & deux comme les derniers de l'article 150. 6.10.

157. Trente-deux jolis Sabots de couleur &

. de

de formes très-variées, & des espéces déja décrites: sçavoir, dix Cul-de-lampes gran leux, V. FAM. dont deux dépouillés; huit lisses, dont quatre dépouillés; quatre striés, dont un dépouillé & un découpé en spirale pour faire voir le dedans; deux Toits Chinois de nos mers, deux Cadrans, deux Boutons de Camisole, deux Bouches doubles, & deux petits Sabots de l'espéce des troisième & quatriéme de l'article 149.28.10!

158. Neuf Limaçons rares; sçavoir, deux des parages de Mississipi, violet trèsfoncé, lisses, à cinq orbes renssés, & à tête orangée, l'un desquels est dépouillé en partie jusqu'à la nacre, qui est striée circulairement, & d'un bel orient ; six Magellaniques papyracés, perlés & à stries circulaires très - fines, dont deux à petites zones couleur de rose; deux à raies noires circulaires, & deux blancs; un gris-noirâtre des Indes, à grandes taches blanches quarrées, placées à distances égales dans le bord supérieur de chaque orbe, & à mouchetures blanches dans le reste, à stries circulaires très-fines, de forme un peu applatie, à six orbes, dont le premier est très-large & umbiliqué. 12 . 2!

159. Deux cartons contenant 120 petits Sabots des Indes, tous de même forme, un peu applatie, de couleurs, marbrures & desseins extrémement variés. 35.19!

Tome I.

160. Idem. 20.

V. Fam.

161. Quatre très-grands Cul-de-lampes;
fçavoir, un blanc flambé réguliérement de rougeâtre, à orbes renssés dans le bas, un peu concaves dans le haut, & à base un peu convexe; un à flammes plus irrégulières de l'espèce du premier de l'article 150, auquel adhere un Madrépore, & deux dépouillés & découpés en spirale pour en faire voir l'intérieur. 16.5.



SIXIEME FAMILLE.

BUCCINS

CE sont des Coquilles contournées en volute, à plusieurs spirales, dont la plus Buccins. basse est beaucoup plus grande que les autres; ce qui les rend groffes par le milieu. Elles sont ordinairement dépourvues de pointes & de tubercules, & ont toutes une grande bouche oblongue qui est ou entiere, ou échancrée, ou terminée par une queue plus ou moins longue, d'où nous les diviserons en quatre genres; sçavoir,

- 1º. Les Buccins à bouche entiere, dépourvue de queue.
- 2°. Les Buccins à bouche échancrée, dépourvue de queue.
- 3°. Les Buccins à bouche garnie d'une queue peu longue.
- 4°. Les Buccins à bouche garnie d'une longue queue.

VI. FAM. Buccins.

Les Naturalistes out été fort peu d'accord jusqu'à présent sur la distribution de cette famille, qu'ils ont aggrandie ou resserrée, suivant l'idée plus ou moins étendue qu'ils attachoient au mot Buccin, qui, de lui-même, est assez vague. Nous aurions bien destré suivre une autre route, en partageant cette nombreuse famille en plusieurs autres petites, dont les caracteres auroient été plus précis; mais, comme nous n'avons dessein que de jetter un peu d'ordre dans ce catalogue, & non de faire un traité de Conchiliologie, nous avons cru qu'il suffiroit de suivre les divisions déja reçues, en y faisant les changemens qui nous ont paru indispensables.



GENRE PREMIER.

BUCCINS A BOUCHE ENTIERE, DÉPOUR-VUE DE QUEUE.

162. Un Buccin des Indes, revêtu de son épiderme marron à huit orbes, à bouche cou- VI. FAM. leur de chair garnie de deux dents, & de for-Buccins. me approchante de celle d'une oreille, ce qui l'a fait nommer Oreille de Midas, il est très-grand dans son espéce *.30".1.

163. Une Oreille de Midas de l'espèce de la 10. lett. G. précédente, & de même grandeur, mais dé-6g. 21 & 22. pouillée, & d'une belle couleur de chair. 32" 3.

164. Deux petites Oreilles de Midas, dont une grise à stries longitudinales onduleuses & granuleuses, à bouche blanche garnie de deux dents, & à quatre orbe; seulement *; l'autre est * List tab. 324 semblable, mais dépouillée. 6." fig. 30.

165. Cinq petites Oreilles de Midas; sçavoir, deux flambées de blanc & de marron-clair dans le corps, à levres retroussées en dehors, l'extérieure sinueuse & l'intérieure armée d'une seule dent : deux fasciées de blanc & de marron-clair à tête peu élevée, à bouche garnie de deux dents, & imitant encore mieux que les précédentes la forme d'une oreille *, & une légére- * rbid. tab.

8;4. fig. 59.

I iii

VI. FAM. garnie d'une seule dent, & nommée Ave-Buccins. line *. 12.

* Lift. tab. \$35. fig. 58.

€. 324

166. Quatre Buccins de forme à-peu-près femblable aux précédents, & nommés pour cela fausse Oreille de Midas; sçavoir, deux de Cayenne, dont un fauve-clair, & l'autre fauve-nué de gris-de-lin, à stries fines longitudinales, à cinq orbes un peu bombés, à bouche

* Mid tab plus large que l'Oreille de Midas & sans dents *; 23. fig. 21. Séba, pl. 71. un de Rio de la Plata, qui ne differe de ceux-

ci que par ses orbes moins rensses, & sa couleur orangée, & un de Rio-Janeiro, à orbes plus rensses que tous les précédents, revêtu de son épiderme, fascié par bandes longitudinales de fauve clair & de fauve roux. Ces Coquilles, ainsi que celles des articles 162, 163 & 164 sont terrestres, & nous ne les avons mises ici, que pour faire voir sous un seul point de vue, toutes les variétés de cette espèce de Buccins. 6.

167. Deux Buccins à orbes renflés, & nom-

més Perdrix rouges, l'un flambé de blanc & de *Séba pl. 71. rouge-brun & dépouillé *, l'autre avec son épi-

fig. 2 & 3. derme marron-foncé. So.

168. Deux autres Buccins, dont un revêtu de fon épiderme, à raies longitudinales onduleufes, alternativement blanches & rouge-brun,

* stba, inid. & grand dans son espèce, nommée le Zebre ou sign 4 es y.
Are Append, l'Ane rayé*; & une Perdrix rouge, semblable plus tett. L.

à celles de l'article précédent, mais dont on a coupé une portion du premier orbe & la co- Vi. Fant.
Buccins. lumelle entiere. 14.

169. Une Perdrix rouge & un Ane rayé, moins grands que les précédens. 13.

170. Deux Buccins de la forme des précédens; sçavoir, un à bandes longitudinales, nuées de violet & de bleu, à tête flambée de

rouge & de jaune, & à bouche violette *, & * List. tab. une Perdrix rouge. 26.2.

171. Deux Buccins en pendant, de l'espéce du premier de l'article précédent, mais dépouillés de leur épiderme, polis, & devenus par-là d'un couleur de rose très-vif. 48.19.

172. Vingt petits Buccins; sçavoir, deux peu communs blancs, flambés par bandes Iongitudinales onduleuses de brun & d'incarnat, à levre extérieure en bourrelet, & intérieure garnie de quatre dents : deux fauves tigrés de blanc, à sevre extérieure en bourrelet, dentelée en-dedans, & du reste semblables aux précédens. C'est la Porcelaine de M. Adanson*; * Ibid. tab quatre blancs mouchetés par zônes de petites 818. fig 29. Adanton, pl. taches ou traits longitudinaux marron, de for-4. f. 1. me semblable aux précédens *; deux blanc- * List, tab jaunâtre, l'un flambé, l'autre pointillé de mar-803. fig. 10. ron, à stries circulaires très-fines, & à orbes litt. Q. renflés *; deux très-petits de même forme à * Ibid. robe flambée de blanc & de violet; deux petits 44. litt. Z.

Tiv

vi. Fam. berculeuse, où l'on ne remarque aucunes spires, & à très-petite bouche ovale, nommés Mures de haies; deux verd-bleuître à levre extérieure en bourrelet, & intérieure garnie de quatre dents, & à tête se confondant avec le corps; deux plus petits, qui ne différent des précédents qu'en ce que la levre extérieure est * List. tab garnie de cinq dents *, & deux gris légere-

ment fasciés, privés totalement de tête, & à levre garnie de trois dents. 9 %.

GENRE SECOND.

Buccins A bouche échancrée, dépourvue de queue.

*Rumph. ton, & nommé Pavillon d'Orange *; il est de la plus parsaite conservation, & porte deux pouces cinq lignes de large, 584.

174. Deux Buccins des parages Magellaniques, rares & en pendant, à robe marronfoncé, à stries transversales tuilées, alternativement plus ou moins élevées, à levre extérieure dentelée & armée en-dedans vers l'extrémité inférieure d'une dent saillante, ce qui leur a fait VI. FAM. donner le nom de Licorne. 18".

175. Deux Buccins en pendant peu communs, blancs, à grandes taches marron, disposées par zônes, & paralleles les unes aux autres, umbiliqués, & des plus grands dans leur espéce *. 37."

Bonan, cl. 3:

176. Deux Buccins semblables aux précé-n°. 23 & 26. dents, mais moins grands. 15."

177. Deux Buccins blancs, flambés & tachetés de fauve, & de même forme que les précédens, à cela près, que les pas en sont plus creusés en-dedans en forme de fillons *, 12 ".

178. Dix Buccins; sçavoir, un rare blanc Bonan. cl. 33 à stries circulaires, les unes élevées, les autres pl. 17. lett. Ma non, à côtes longitudinales rabotteuses, à six orbes terminés par des pas applatis, sur lesquels les côtes se prolongent, à levre extérieure dentelée & à umbilic; deux gris à stries fines circulaires, à côtes longitu dinales obliques, qui s'étendent depuis la clavicule jusqu'à la moitié du corps, & à pas des orbes arrondis *; deux * séba, pl. de forme à-peu-près semblable aux premiers 37. n°. 76,77. de cet article, mais à stries plus fines & plus ferrées en vive arrête, & un peu tuilées *; un * 11st. tab. blanc nué de fauve-roux, à robe réticulée, & 896.f. 16. à levre intérieure garnie de deux dents *; un * Ibid. tab. ventre de biche à stries circulaires, dont les in-830, f.

tervalles font remplis d'autres plus fines, à pas VI. FAM. des orbes arrondis, & du reste semblable aux BUCCINS. précédens, aux dents près, dont il est dépourvu; deux blancs à stries circulaires peu prononcées, & à cinq orbes, dont les pas sont un pen concaves en se relevant, & un de l'espéce de ceux de l'article 177, mais différem-

* Séba, pl. ment tacheté * 6.

73. n°. 24 & 179. Vingt - deux petits Buccins; scavoir, deux rares, blancs nués de fauve, à stries circulaires fines & ferrées, à levre extérieure, fi-* List. tab. nissant en un bourrelet, & dentelée en-dedans *;

831.f. 55. deux de même couleur à stries circulaires ficelées & ondées, séparées par de larges canne-

* Séba, tab. lures, à cinq pas applatis, & umbiliqués *; un 52. Ro. 11. fauve nué de gris à grosses stries longitudinales granuleuses, fort distantes les unes des autres, à fix orbes, dont les pas sont un peu applatis; un fauve blond, à robe en réseau granuleux, ventru & à huit orbes; quatre, dont deux blancs & deux gris, à côtes longitudinales, & à levre intérieure, retroussée jusqu'au haut du premier

* List. tab. orbe *; un très-petit à une bosse sur le dos, 970. f. 24.

& à rebrouffement de la levre jusqu'au haut du * Ibid. tab. troisiéme orbe *; quatre blancs, dont deux fasciés de souci . & deux partie de souci & par-971. f. 26. tie de marron; quatre, dont deux blancs & deux marron à stries fines circulaires, tuilées; deux fauves ventrus à pas des orbes bordés d'un rang de taches marron , & deux fauves roux, dont un lisse à trois côtes longitudinales blanches, & un à stries circulaires bien prononcées: plus, un collier dont les Indiennes se 975. f. 30. parent, fait de petits Buccins, dont le rebrous-sement des levres s'étend jusqu'à la clavicule. 6. 12.

180. Vingt-cinq autres petits Buccins intéressans; sçavoir, deux blancs marbrés par grandes taches de fauve roux, granuleux par bandes longitudinales 2; deux des mêmes fond 2 Gualt, tab. & forme que ceux-ci, à lignes circulaires ca- Argen. pl. 9. nelle & lisses, aux derniers orbes près, qui lett. I. font striés en longueur 3; deux fauve-roux & Rumph. marron, à côtes longitudinales chargées de tab. 29. litt. P. stries onduleuses 4; deux blancs & fauves, nués 4 Ibid. litt. de marron, à robe réticulée, & à levre garnie de dents 5; deux blancs fasciés de marron, s List. tab. à stries circulaires noueuses 6; deux petits noirs 965. f. 21. de la Barbade 7; deux fasciés par zônes alterna- 969. f. 23. 7 Ibid. tab. tives de blanc & de noir 8; un blanc strié, & 976.f. 32. fascié de zônes noueuses marron 9; deux mar- 834. f. 61. ron, fasciés de lignes blanches, à côtes longi- 954. fig. 5. tudinales & stries fines transversales *; deux de * Gualt. tab. même forme, mais entierement marron; un 44 litt. C. blanc à côtes longitudinales chargées de stries transversales onduleuses & bien prononcées; un gris-de-lin à stries circulaires fines & granuleuses; un fascié de taches alternatives blanches & marron, à stries circulaires très-fines

BUCCINS.

entre quelques autres plus grosses; un marbré VI. FAM. de blanc & de marron à stries circulaires peu prononcées, & deux lisses, verdâtres, à pas des orbes granuleux. 15.7.

> 181. Un grand Buccin Magellanique rare, blanc, nué de fauve & de jaune, avec quelques zig-zags marron, de forme allongée, à sept orbes terminés par un mammelon, à levre intérieure garnie de trois dents & à robe lisse chargée de quelques plis ou rides. 17.

182. Un semblable, à cela près que les rides en sont nuées de verd-clair, & que les zig-

zags n'y paroissent point. 8". 6.

183. Deux Buccins blancs tachetés par zônes, l'un de rouge sanguin & de l'espéce nom4 Arg. pl. 9. mée Thiare ou Couronne Papale 1; l'autre d'ofart. E. Séba, rangé, & connu sous le nom de Mitre², tous Algoritations de la grandeur de ceux que nous citons ibid. nº. 13 & dans Séba. 30.

184. Une Thiare un peu moins grande que 3 Séba, ibid. la précédente 3, & une Mitre de même grandeur. ?4."

185. Cinq Buccins moins grands que les précédens ; sçavoir , un l'sse ventre de biche 4 List. tab. nué de blanc, nommé l'Ivoire ou Mitre jaune 4; 974. f. 29. trois autres Micres, dont une semblable à celle de l'article précédent; une à stries circulaires s séba, pl. 50. flambée de taches rougeâtres, nommée en no. 49. List. Hollande Thiare bâtarde 5; une légerement 120.822.5.40. Ariée & mouchetée par zônes circulaires, de taches rouge-brun, nommée la Cardinale *, & VI. FAM. une Thiare semblable à celle de l'article précé-Buccins.

* Séba, pl. * Séba,

186. Sept Buccins, dont deux petites Thia-51. List. tab.
res par pendant, marbrées de jonquille, de 838. n°. 65.
blanc & de roux, à stries circulaires piquetées * 56ba, pl.
de petits trous, espéce rare *; une autre va-50. nº. 29.
riété de Thiare, appellée la Thiare à trous, & les
quatre variétés de Mitre de l'article précédent.

187. Sept autres, dont cinq Mitres des espéces de l'article 185, & deux Thiares de cel-

les de l'article précédent. 10.2!

voir, deux marron à zônes jonquilles, à stries longitudinales vers le sommet, & transversales vers le bas *; deux blanches, à lignes & ban- * Gualt. tabs; des vertes, noires & jaunes, à côtes longitu-53-litt. E. dinales & stries transversales *; deux blanches * Ibid. 54- pointillées l'une d'orangé, l'attie d'orangé & litt. B. de brun, à stries qui se crossent en treillis*; deux * Ibid. litt. blanches nuées de verdâtre, fasciées & poin-H. tillées par zônes de rouge, à côtes longitudinales croisées par des stries circulaires *, & * Arg. pl. 94 deux de l'espèce de telle de l'article 183, dont lett. V. les taches sont d'un beau rouge de corail. 37.1.

189. Vingt-huit petits Buccins par pendans; sçavoir, deux blancs fasciés de verd & de zônes noires interrompues, à côtes élevées,

& nommés Minarets 1; deux Minarets à zônes VI. FAM. noires & vertes de diverses nuances non inter-BUCCINS. rompues 2; deux Buccins lisses à bandes longi-Arg. pl. 9. tudinales alternatives & onduleuses, blanches pl. 54. litt. F. & rouges dans l'un, fauves & rouges dans l'autre 3; deux petits lisses marron, pointillés Jibid litt. L. de gris 4; deux blancs nués de gris, légéref. 35. 4 Lift. tab. ment striés, à pas des orbes granuleux 5; deux 4. f. 44. fauve-clair, à côtes longitudinales chargées de 977. f. 34. 6 Arg. pl. 9. stries circulaires saillantes en vive arrête 6; deux lett. O. Gualt. marron très-foncé, à zônes étroites blanches, & tab. 51. lit. G. 7 Séba, pl. à côtes longitudinales striées transversalement 7; deux blancs à côtes moins faillantes, pointillés List tab. de rouge-sanguin 8; deux légérement striés à 322. f. 38.

bandes longitudinales alternatives blanches & crouge-foncé, avec une zône blanche transver-fale; deux à robe marron-foncé avec une zône blanche; quatre comme les huitième & treizième de l'article 179, & quatre comme les feptième & dix-neuvième de l'article 180.13.

190. Vingt - quatre autres petits de forme effilée; sçavoir, un verdâtre imitant la corne, à robe réticulée & granuleuse, & extrémités des orbes bordés d'un petit rang de tubercules oblongs; un blanc réticulé, à taches marron de distance en distance sur une bande circu-

20. 19 % longitudinales granuleuses, mouchetées par zônes de rouge; un à robe blanche très-fine.

ment réticulée, & à stries circulaires rouges plus faillantes, écartées les unes des autres; VI. FAM. deux blancs marbrés, l'un de jaune-obscur, l'autre de gris-de-lin, à robe réticulée & granuleuse; un lisse blanc, marbré de lignes onduleuses marron-foncé; un Minaret fascié de blanc, de brun, de verd & de bleu-pâle; deux autres de l'espéce des troisséme & quatriéme de l'article précédent; huit Mitres des variétés détaillées dans l'article 188, & cinq autres Buccins des variétés déja décrites. 18.4

GENRE TROISIEME.

BUCCINS A BOUCHE GARNIE D'UNÉ QUEUE PEU LONGUE.

101. UN Buccin très - rare, fauve-clair, à fascies élevées & tuberculeuses marron, à stries des intervalles peu élevées, à six orbes, à trèspetite queue, & à levre extérieure en bourrelet, nommé en Hollande l'Argus fascié *; il porte un pouce dix lignes de long. 9. tab. 49. litt. B.

192. Deux Buccins très-rares & en pendant, blanc-sale, à grosses stries applaties, & néanmoins très - saillantes, à larges & profondes canelures, à quatre orbes, le premier desquels est chargé de trois stries & de deux cannelures,

BUCGINS.

tandis que les autres n'ont que deux stries & une cannelure, non compris les pas creusés en-dedans & plats qui les séparent : ces Buccins sont grands dans leur espéce, nommée le Cabestan. 121. 1.

193. Quatre petits Buccins; sçavoir deux Lisses à pas des orbes applatis & saillants endehors presque en vive arrête, nommés en * List. tab. Hollande Perrons *, & deux petits Cabef-924. f. 16.

tans. 30.2:

194. Un rare & très-beau Buccin Magella. nique, blanc nué de gris-de-lin, à sept orbes renflés, chargé de côtes longitudinales en vive arrête & papyracées, représentant de longues feuilles inclinées toutes vers la levre extérieure. à bouche presque ovale, à petite queue recourbée, creusée en goutiere, & umbiliqué. On le nomme Buccin feuilleté. Celui - ci porte trois pouces cinq lignes de long sur deux pouces deux lignes de large. ?4.2.

195. Deux Buccins de même espéce, mais moins grands. 18"

196. Deux autres moins grands encore que les précédens. 7.16.

197. Deux Buccins Magellaniques rares. fauve-clair, à grosses stries longitudinales & transversales formant un rézeau qui imite les étoffes gaufrées, à cinq orbes bombés, à clavicule rentrant en-dedans, à queue courte un peu recourbée & à coque mince; espéce nom-

VI. FAM.
BUCCINS.

198. Cinq petits Buccins rafes; sçavoir, un des Indes blanc & feuilleté, mais différent de ceux de l'article 194 par sa forme effilée, & ses seuilles plus éparses & moins inclinées; un blanc ventru, seuilleté aussi, mais à seuilles moins saillantes, moins sines & plus serrées; deux Magellaniques blancs nués de sauve, de la forme du précédent, à côtes longitudinales arrondies, & à stries transversales; & un blanc de la Méditerranée, granuleux par compartimens, à queue & partie des levres recouvertes de Corail rouge. 18.1.

199. Quatorze Buccins, dont dix par pendans; sçavoir, deux rayés par fines zônes de blanc & de brun, à sept orbes un peu bombés & à bouche blanche, nommés Bouches de lait *; * Gualt. tab. deux blancs, à trois zônes marron clair; dont 43. litt. X. deux sur le premier orbe & une sur les autres, à f. 55. côtes longitudinales & à stries fines transversales, s'élevant sur les côtes; un à-peu-près de même forme, blanc nué de fauve, à côtes longitudinales moins nombreuses & moins prononcées *; un ventru à stries circulaires marron, * Bohan. el. & cannelures fauves, à levre extérieure dentée 3. s. 343. & en bourrelet, & à clavicule rentrante *; un à * tist. tab. tubercules blancs & cannelures marron *; deux * 4.56. f. 36. * 1.56. *

Tome I.

VI. FAM. Buccins. & de forme bomée; deux blancs nués de fauve à groffes côtes longitudinales, à stries transversales, & à bouche violette dentelée; deux souci & de même forme, mais à côtes moins élevées & stries circulaires plus grofses, & un très-finement strié, marbré de blanc, de noir & de couleur de rose. 20.

200. Quatorze Buccins; sçavoir, huit à stries circulaires granuleuses, interrompues par quelques gros tubercules longitudinaux, à bouche dentelée, & à levre extérieure garnie d'un large bourrelet, mais différens entr'eux par leurs coutett. Rouelt. Rouches de lait polies; deux comme les troises de lait polies.

fiéme & quatriéme, & deux comme les douzième & treizième de l'article précédent. 16

201. Deux Buccins peu communs, blancs, marbrés de quelques taches brunes, à robe réticulée granuleuse, à tubercules disposés comme dans les huit premieres de l'article précé*

*Rumph.tab. dent, & à petite queue retroussée *.

* Rumph.tab. 49. litt. G. Lift. tab.1022. f. 86.

202. Un très-rare Buccin du Golfe du Mexique, à robe brune, fasciée dans le premier or be, de deux zônes jaunes, dont la plus haute blanchissant peu-à-peu, suit la spirale jusqu'à la clavicule, à six pas larges & plats garnis de petites lames onduleuses, presque perpendiculaires à leur plan, & bordés chacun d'une suite d'ongles ou de serres en forme de crénelures,

dont les premieres sont creusées en bec de perroquet; espéce qu'on peut nommer le Buccin VI. FAM. crénelé. So. 1!

203. Deux grands & beaux Buccins de l'Isle de France, fauves marbrés de marron-clair & de blanc, à stries circulaires, inégales, granuleuses, & quelquesois tuberculeuses, à bourrelets, disposés comme dans les deux de l'article 201, & à petite queue recourbée, creusée en gouttiere *. 18.

* Gualt. tab. 204. Six Buccins; fçavoir, un rare fauve 49. litt. G.

taché de brun & de blanc, à grosses stries cir-lett. M séba, culaires, rangées par paires affez distantes les & 24. unes des autres, à stries longitudinales obliques, peu apparentes, & assez distantes aussi les unes des autres, formant par leurs rencontres mutuelles de petits tubercules, à huit orbes renslés, & autant de pas obliques, à bouche dentelée, & à deux bourrelets longitudinaux *; un fauve teint de jaune, à quatre orbes applatis, ceints de groffes stries doubles 17. no. 30. peu prononcées sur le corps, à bourrelet situé en arriere de la levre extérieure, qui est en tranchant & non dentelée, & quatre de l'efpéce de ceux de l'article précédent, mais plus

petits, dont deux blancs nués de jaune. 5.19? 205. Vingt-deux petits Buccins par pendans; sçavoir, deux peu communs, dont un blanc & un fauve dans le corps, & marron à la cla-

vicule, tous deux à côtes longitudinales un peu VI. FAM. finueuses, formant au haut des orbes des couronnes de tubercules, à stries fines transversa-BUCCINS. les, & à huit orbes; quatre blancs, dont deux fasciés de fauve-roux & deux de brun, à stries longitudinales & transversales, formant un ré-*Gualt. tab. feau granuleux *; deux lisses, dont un grisatre tacheté par zônes de pourpre, à zône blan-49, litt. E. * List. tab. che tachetée des mêmes couleurs *, & un qui ne differe du précédent que par son fond & ses taches canelle; deux liffes à robe blanche tachetée par zônes de marron; deux bleu-pâle, marbrés de roux *; deux blancs à côtes longi-* Gualt. tab. tudinales & stries fines transversales, de forme 46. litt. F. bombée, à huit orbes, & à petite queue retrouffée; deux blancs marbrés par zônes de taches jonquilles dans l'un, rousses dans l'autre, granuleux par compartimens, à bourrelet uni couvrant la levre extérieure, & se prolongeant dans une direction oblique sur tous les autres orbes, de forme oblongue, & un peu arquée; deux à-peu-près semblables, mais dont la spirale des bourrelets est composée de plus de révolutions, & quatre de l'espéce des douziéme & treiziéme de l'article 199. 8.1.

206. Deux grands Buccins des Indes, ventrus, imitant le plumage de la perdrix, à trois rangs de bourrelets, & à levre extérieure * Séba, pl. dentelée, de l'espèce nommée Trompe Marine *,

SI.

ces de long, & sont un pied cinq pouces de long, & sont posés sur des pieds de bois VI. FAM. en pendant. yeudaavecl'asticle suivant. Buccins.

207. Quatre Trompes Marines moins grandes que les précédentes, dont deux de l'Amérique *, & deux de la Méditerranée. 6:10.


208. Six Trompes Marines par pendans, & 81.

de grandeur propre à entrer dans des tiroirs *; * Rumphfçavoir, deux des Indes, & deux d'Amérique, tab. 28. lites des plus vives couleurs, les deux autres sont de nos Mers. 3.1.

209. Deux Buccins; fçavoir, un des Indes peu commun, fauve-roux & recouvert d'un fucus, ventru, à grosses stries noueuses, à lévre intérieure ridée, & extérieure garnie de grosses dents qui laissent de profondes cannelures *, * Bonan. cl. & une petite Trompe Marine de la Méditerra-3. n°. 289. List. tab. 936. née, conservant l'animal desséché sortant de la n°. 31. 86ba, coquille avec son opercule. 15.

210. Un très-grand Buccin de l'espèce des Trompes Marines, mais différent des précédens en ce qu'il est d'un blanc-grisatre, à côtes longitudinales & grosses stries transversales, avec un rang de tubercules sur chaque orbe *; il a * List. tale. plus d'un pied, sept pouces de long.

211. Deux Buccins de la Méditerranée, blancs nués de fauve, à stries longitudinales & transversales, dont les plus grosses forment un treillis chargé de petits tubercules dans tous les



points où elles se croisent, à deux rangs de VI. FAM. bourrelets sur chaque orbe, & à lévre exté-*Gualt. tab. rieure frangée & dentelée. *. 7.5. BUCCINS.

50. litt. A. f. 30.

212. Trois Buccins, dont deux blancs mar-List. tab. 935. brés de roux & rayés de brun, à orbes ceints. d'un petit cordon granuleux, nommés en France Tulipes, & en Hollande Agathines, tous deux grands dans leur espéce, l'un desquels conserve

* Arg. pl. son opercule * : le troisseme est de l'espèce de

Séba, pl. 71. ceux de l'article précédent. 3. n°. 23-32.

213. Quatre Tulipes à fonds & rayes semblables aux précédentes, mais dont deux sont marbrées de jaune, & deux d'olivâtre. 5.10.

214. Quatre autres Tulipes par pendans, dont deux marbrées d'orangé & de souci clair, & deux de brun obscur. 7.

215. Quatre Buccins; sçavoir, deux blancs nués de fauve clair, à stries circulaires fines & un peu ondées, de forme approchante de celle * séba, pl. de la Tulipe, & à clavicule en mammelon * .

52. nº. 7. & deux Tulipes de moyenne grandeur, blanc nué de bleu, marbré de verdâtre, & rayé de même, 6.

216. Cinq Buccins; sçavoir, deux à stries circulaires ferrées, & à orbes bordés d'une couronne de petits tubercules, à robe brune, bordée au-dessous de chaque pas de deux zônes * síba, pl. blanches, ce qui détermine l'espéce nommée

8. Lift. tab. en Hollande l'Ethiopienne *, & en France la 928. f. 22.

Minime ou la Cordeliere, l'un desquels a la tête entiérement recouverte de l'espéce de duvet VI. FAM. qu'on nomme Drap marin; un de même espéce, mais rare, en ce que la couleur en est fauve-pâle, & qu'il est destitué de zônes; & deux Buccins flambés de blanc & de roux, à stries circulaires inégales, & à tubercules plus petits encore que les précédens *. 8.2.

217. Deux Buccins rares de l'espéce de la 10. lett. H. Cordeliere, mais fauve-gris & à plus gros tuber-

cules. 48.1?

218. Trois Buctins, dont un très-rare qui ne differe de la Cordeliere qu'en ce que le fond en est cassé au lait, que les tubercules s'y remarquent à peine, & que la forme en est plus allongée, & deux Cordelieres de l'espèce des deux premieres de l'article 216, mais plus grandes. 22.

219. Trois Buccins rares, dont deux marron, à stries circulaires, & à sept pas applatis, couronnés de tubercules *; l'autre est blanc, veiné en longueur de rouge-brun, strié circu-lett. A. Séba, lairement, à sept par applatis bordés de petits & 28. tubercules, & à tête peu élevée: on le nomme l'Unique, parce que la bouche en est posée à contre-'ens des autres *. 18."

220. Trois Buccins rares; sçavoir, deux 907. f. 274 blancs nués de fauve clair, à stries circulaires très fines, à six pas applatis, dont les bords gra-

* Arg. pl.

* Lift. tabe

Kiv



VI FAM. melle, où ils forment un affez large fillon *; & Buccins.

* Guait. tab.

* Guait. tab.

* Transport de l'article des deux premiers de l'article précédent.

221. Quatre petits Buccins, dont deux Uniques, & deux de l'espèce des deux premiers de

l'article précédent. 9.

ftriés circulairement, à fept pas, dont les bords

* List. tab. sont chargés de petits tubercules *; & un de

47. fig. 12. Tespéce des deux premiers de l'article 220,
mais blanc de lait. 10.

blancs, l'un à stries sines circulaires, l'autre lisse,

* 1bid. tab. de forme élevée, à sept orbes bombés *; un à p13. f. 5. stries circulaires très-fines, de forme encore

* Ibid. tab. plus ventrue & moins élevée *; deux blancs nués de fauve, granuleux en treillis, à lévre extérieure dente ée, & deux rangs de bourrelets

*Gualt, tab. qui se prolongent sur tous les orbes *; deux qui 49. litt. M.
Litt. tab. 959. différent des précédens par une forme plus alfigure.

*Gualt, ibid, longée, & un troisseme rang de bourrelets *;
litt. L. deux de l'espèce de ceux de l'article 203; deux marron-soncé, à une petite zône blanche dans

més Plombs; un revêtu d'une incrustation épineuse brune, & où loge un Bernard l'Hermite; deux Bouches de lait; deux Cordelieres; trois Tulipes, dont une découpée en spirale, pour

le bas, ventrus, pefants, à fix orbes, & nom-

en faire voir l'intérieur; & cinq opercules de nature cornée, qui ont appartenu à différens VI. FAM. Buccins, dont un très-grand no amé vulgaire-Buccins. ment Feuille de laurier *; & cinq autres moins *Rump. tab. grands, plus ou moins épais, nommés Ongle Gualt tab.70.

odorant ou Blatta Bizantia des Apothicaires *. * Kumph.

ibid nº. 3.

224. Quatre Buccins blancs, épais & pelants, Gualt ibid. nommés Marbres (ou Raves,) dont deux à tête litt. C. D. élevée, à lévre intérieure armée de trois grosses dents, & à cinq orbes légérement tuberculeux, fe recouvrant l'un l'autre *; & deux à tête * List tab. moins élevée & orbes applatis, à queue moins 815. f. 26.
Gualt, tab. 46. longue, & de forme plus ventrue que les pré-litt. C. cédens. Plus, deux petits Buccins peu communs, de forme approchante des précédens, à stries fines circulaires peu prononcées, à clavicule fort faillante, en forme de spirale cylindrique ou de tire-bourre, l'un à robe blanche piquetée par zônes de point jonquilles, & couronné de petits tubercules *, & l'autre piqueté * Rumph.tab. moins régulièrement de points bruns & oran- 36 n°. 7. gés *. 12.7!

225. Trois grands Buccins, dont un blanc- 816. f. 26. sale, à tête peu élevée, à six orbes, dont les pas sont un peu applatis & couronnés de tubercules *; & deux beaux Marbres, blanc de lait, évidés en dedans, & gravés en dessus d'une 47. litt. B. espéce de mosaïque : cet ouvrage est des Indiens, à qui ces Buccins servent de tasse. 3. 9.

* Lift. tab.

BUCCINS.

226. Deux grands Buccins des Indes, rares; VI. FAM. de forme un peu renflée, & à coque épaisse blanc de lait, à grosses côtes longitudinales formant dans leur rencontre, avec les plus grands cercles de chaque orbe, de gros tubercules oblongs, à neuf orbes, dont les pas sont légérement réticulés, à lévre intérieure garnie de trois plis ou dents, & à clavicule rentrante & creusée en maniere de tire-bourre. 24"12

> 227. Cinq Buccins, dont un fauve revêtu de son épiderme marron, à lignes circulaires rousses, distribuées deux à deux, & à huit orbes chargés dans leur milieu de tubercules.

* Gualt. tab. nommé le Tapis ou la Robe de Perfe * ; deux 46. litt. B. 46. litt. B. List. B. blancs nués de fauve, légérement striés à tept * List tab. orbes bordés de tubercules *; & deux Marbres

tyn. univ. n°. €7 & 58.

884. Valen- des deux espéces de l'article 2.24. 6.1. 228. Quatre Buccins, dont deux dépouillés de l'espéce du premier de l'article précédent. & deux gris qui n'en différent que par leurs tubercules moins prononcés. 5."



GENRE QUATRIEME.

Buccins A BOUCHE GARNIE D'UNE LONGUE QUEUE.

des premiers orbes s'éclaircit peu à peu dans les autres, jusqu'à devenir blanche dans les derniers, à stries transversales dans le bas, & longitudinales finement réticulées dans le haut, à bouche garnie d'une queue très menue, creusée en gouttiere, & de l'espèce nommée Fuseau*.

230. Un Fuseau très - rare blanc, nué de Arg. pl. 104 fauve vers la queue, qu'il a plus longue que le lett. A. précédent, à lévre extérieure garnie de quatre dents, & nommé le grand Fuseau à dents: il porte cinq pouces huit lignes de long, & est de la plus belle conservation *. 190.

231. Un fuseau blanc à stries sines circulai- 56. n°. 2.

Arg. pl. 20.

res, de forme moins essilée que les précédens, lett. D.

à neuf orbes chargés dans leur milieu de tubercules, à levre intérieure saillante en-dehors
en vive arrête, à très-longue queue, & nommé Quenouille; il a neuf pouces de long *. 18.

* Séba, la

232. Une autre Quenouille, qui peut faire Coquille inférieure du mile pendant de la précédente. 27."

lieu de la pl. 729

233. Une semblable, mais plus effilée, & VI. FAM, de huit pouces & demi de long. 31."

BUCCINS.

coquille supé-

79. * Rumph.

234. Deux jolis Buccins en pendant, dont une Quenouille blanche de cinq pouces neuf lignes de long, nuée de fauve-roux vers la columelle, sur les lêvres, & le long de la queue, qui est re-

* Arg. pl. 9. courbée à l'extrémité *; & un Fuseau de même fonds & de même longueur, mais différent en ce que les quatre derniers orbes sont destitués de tubercules, & que la queue est un

* List. tab. peu contournée. ??" ₽18.

235. Deux Fuseaux, l'un blanc, différent de la Quenouille, en ce que les stries en sont moins prononcées, & les tubercules plus gros * Séba, la & plus arrondis *; l'autre blanc, à stries transrieure du mi- versales, & à grosses côtes longitudinales, dont lieu de la pl. les cannelures sont nuées de fauve roux *.12....

236. Deux Fuseaux, l'un comme le pretab. 29. litt.G. mier de l'article précédent; l'autre en differe en ce qu'il est fauve-roux; nué de blanc, que les tubercules en sont plus petits, plus minces & plus nombreux, & les stries circulaires plus renflées. 13."

· 237. Quatre Fuseaux par pendans; sçavoir, deux blancs tachetés par zônes de brun presque noir, à levre extérieure échancrée dans le * List tab. haut, & nommés Tours de Babel *; deux qui 917. f. 11. ne différent des précédens qu'en ce qu'ils sont entierement blancs, & à stries plus saillantes. On peut nommer cette variété Tour de Babel VI. FAM. blanche *. 16"

238. Douze petits Fuseaux, dont dix par morp. pl. 44 pendans; sçavoir, un blanc lisse, à pas des orbes, rentrans en-dedans, & à queue peu longue*; * List. tab; deux semblables au grand de l'article 229; 915. f. 8, deux petites Quenouilles; deux Tours de Babel blanches à taches rouges *; deux mar- *Arg. pl. 34 ron noirâtre; deux entierement blanches, & lett. M. une comme les deux premieres de l'article précédent. 14"

239. Quatorze Buccins par pendans; sçavoir, deux à stries circulaires & à grosses côtes longitudinales, dont les rencontres avec le haut des orbes forment autant de couronnes de tubercules, fauves sur les côtes, blancs dans les cannelures; deux nués d'aurore & de jaunepâle, qui ne différent des précédens que par 922. f. 15. leurs stries saillantes sur les tubercules en vive arrête *; deux bruns-marbrés de blanc à stries * Arg. pl. 100 circulaires & à côtes longitudinales, un peu con-lett. I. tournées *; deux blancs, qui ne différent de ceux- * Lift. tab. ci que par leur forme moins allongée, & par 921. f. 14. leurs stries circulaires jaune-pâle dans l'un. orangé dans l'autre; deux petits fauves de même forme, mais à côtes longitudinales plus nombreuses; deux blancs à huit côtes longitudinales aurore, un peu contournées, & du

reste semblables aux précédents 1, & deux VI. FAM. jaune-pâle à tubercules blanchâtres, fasciés de BUCCINS. Lift. tab. rouge-brun 2. 19.

920. f. 13. 2 Bonan, cl. 2. f. 145.

SEPTIEME FAMILLE

MUREX OU ROCHERS.

ROCHERS.

E sont des Coquilles en volute qui VII. FAM. approchent beaucoup des Buccins, mais qui en différent à plusieurs égards. Leur caractere le plus invariable est d'être presque toujours renslées du milieu. plus ou moins allongées vers les deux extrémités, & garnies ou de pointes, ou de tubercules, ou de clouds; ce qui leur a fait donner le nom assez impropre de Rochers. Leur bouche oblongue est ou dentée ou non, & sans queue, ou dentée avec une petite queue, ou aîlée sans pattes, ou aîlée avec des pattes; & c'est ce qui nous fournit la division de cette famille en quatre genres; sçavoir,

16. Les Rochers à bouche dentée ou non dentée sans queue. VII. FAM.

- 2°. Les Rochers à bouche dentée & à petite queue.
- 3°. Les Rochers à bouche aîlée sans pattes.
- 4°. Les Rochers à bouche aîlée & à pattes.

GENRE PREMIER.

ROCHERS A BOUCHE DENTÉE OU NON DENTÉE SANS QUEUE.

240. Un grand Rocher de la Jamaïque rare, marbré de blanc & de souci très-vif dans le corps, à tôte & clavicule couleur de chair, à bouche non dentée, à neuf orbes se recouvrant l'un l'autre, & entourés de tubercules peu faillans, nommé en Hollande Pyramide *. 37.5.

241. Trois grands & beaux Rochers des Indes, 83. 12. 14. dont un blanc-sale, & l'autre couleur de chair, marbrés par grandes taches & par traits en zig-zag de fauve-roux & de marron, à bouche dentée & échancrée, à sept orbes couronnés de tubercules pointus, & de l'espèce nommée en

VII FAM. ROCHERS.

* Séba, le dernier rang de la pl. 67.

Hollande Chauves-Souris, & en France Foud dres *; & le tro sième à fond orangé, veiné & taché par zônes de marron-foncé, à levre intérieure dentée, & à couronnes de tubercules, dont les gros se prolongent en forme de côtes fur le dernier orbe, nommé en Hollande l'Hébraique ou Musique bâtarde, & en France Boisveiné *. 40.1.

* Seba, pl. €7 n°. 1 & 2. Arg. pl. 14. lett. D.

242. Trois autres un peu moins grands; sçavoir, deux Foudres de forme p'us raccourcie, à tubercules recourbés en - dedans, & creusés en forme de bec de perroquet *, & un Bois-veiné, comme le précédent, mais à fond * Séba, pl. blanc *. 18".

* Séba, avantdernier rang de la pl. 67.

\$7. n°. 3.

243. Trois Rochers; sçavoir, un Bois-ve ne & deux Foudres, à-peu-près semblables à ceux de l'article 241. 17".1.

244. Trois Rochers, dont deux en pendant, & grands dans leur espèce, marbrés de verd, de blanc, de marron & de brun, à deux zônes formées de six lignes paralle es dans l'un, & de cinq dans l'autre, à intervalle des zônes pointillé de rouge, & connus sous le nom de *ib. n°.7&8. Musique * , & un Bois-veiné *. 21.

Arg. pl. 14. * Séba, pl.

57. nº. 6.

245. Trois autres de même grandeur, dont deux en pendant marbrés de blanc, de bleu & de brun, qui ne différent des deux premiers de l'article précédent que par leur forme moins allongée, & par des taches oblongues, noires,

& plus marquées, qui leur ont fait donner le nom de Plein-chant, & un Bois-veiné, à taches VII. FAM. moins foncées que le précédent. 17.

246. Deux Musiques rares verd - céladon, pointillées régulierement de brun, à cinq petites zônes blanches, pointillées de même, espéce qu'on distingue par le nom de Musique verte. So. 1.

247. Deux Musiques rares, couleur de rose, & nommées Musiques couleur de rose. 55.

248. Trois variétés de Foudre; sçavoir, deux rares en ce que l'une a deux rangs de tubercules de plus sur le premier orbe *, & que l'autre *seba, coq. a les orbes couronnés d'un simple cordon gra- du mitien de nuleux *; la troisiéme est de l'espéce des deux * séba, ibid. premiers de l'article 241. 75#1!

litt. a & b.

249. Six Rochers; sçavoir, trois Foudres, dont un à tubercules en bec de perroquet; & deux de l'espèce ordinaire; deux Plein-chants en pendant, & une Musique à robe réticulée, différente de toutes celles ci-dessus décites. 10.

250. Sept Rochers; fçavoir, quatre Foxdres & trois Musiques, dont une de l'espéce de celle de l'article précédent. 9."

251. Un Rocher de la Chine très rare, de forme fort renflée, rayé par petites zônes de sauve, & de quelques points bruns, à trois rangs circulaires de tubercules tuilés, à fix pas applattis, recouverts d'une fuite de feuilles

Tome I.

ROCHERS.

couchées, retroussées vers le bord, & comme VII. FAM. frisées, à levre extérieure dentelée, & umbiliqué. 36.

252. Un de même espece, mais un peu moins

grand. 24".

253. Deux gros Rochers fort renflés, fasciés de bleu sur un fond jaune, à spirale de fix pas se recouvrant l'un l'autre, & séparés par un sillon : le premier a deux rangs de pointes seulement, dont un vers le bas, & l'autre * séba, pl. vers la tête *; le second, qui est très-rare, outre le rang de pointes du bas, en a encore trois autres vers la tête, dont le plus haut paroît s'être replié en forme de feuilles fur les fillons que laissent entr'elles les deux premieres spires; ils sont de l'espéce connue en France fous le nom de Lard, & en Hollande sous ce-

lui de Toile à Matelas. 16. 254. Quatre variétés de Lards fasciés & rayés de fauve & de bleu; sçavoir, deux à un rang de clouds vers le bas, & trois vers le haut; un à un simple rang de clouds dans le haut, de même que dans le bas, & un totalement dépourvu de clouds. 12"

255. Trois Rochers, dont un très-rare, blanc de lait, & imitant à cet égard la porcelaine, à stries longitudinales très-fines, & à côtes peu prononcées en même sens, finissant vers le haut en une couronne de tubercules,

qui se prolongent dans les six orbes dont est composée la spirale, & deux Lards bleuâtres VII. FAM. rayés de blanc, l'un à deux rangs *, l'autre Roehers. à trois de pointes dans le haut, & tous deux à 72. n°. 5.

Arg. pl. 15.

256. Trois Rochers; sçavoir, deux d'Amérique blancs, à stries circulaires inégales, à huit orbes tous couronnés de tubercules, à quatre grosses stries tuberculeuses ou tuilées dans le bas & umbiliqués, nommés Aigrettes *, & un Lard à un rang seulement de tubercules dans 810. f. 19. le haut. 8"1.

257. Cinq Rochers; sçavoir, un rare blancgrisatre, à stries fines circulaires, à six orbes & à deux rangs de tubercules mousses dans le corps, dont les plus élevés se prolongent d'orbe en orbe jusqu'à la clavicule; deux Aigrettes différentes des précédentes, en ce qu'elles sont toutes les deux recouvertes en partie d'un Astroite, & deux Lards de moyenne grandeur, l'un à deux rangs de pointes dans le haut, & un dans le bas, & l'autre à un seul rang de

pointes, tant en haut qu'en bas. 4.4.1.

258. Quatre Rochers; sçavoir, deux noifette-foncé, à stries fines circulaires, dont les canelures font nuées de blanc, à trois rangs en même sens d'épines tuilées sur le corps, dont le plus haut fe prolonge dans tous les orbes *, & deux Aigrettes des deux variétés ci - dessus 60. nº. 10.

Lij

164 COQUILLES UNIVALVES décrites, dont une chargée en partie d'un Af-VII. FAM. troite. 9. 19. 259. Deux très-belles Aigrettes en pendant, ROCHERS. de l'espèce de celles de l'article 256.7.1. 260. Deux Rochers des Indes en pendant, noirs marbrés de blanc, à plusseurs rangs de

grands dans leur espéce, & nommés Chausse-15. lett. E. Lift. tab. 829. Gualt tab. 55. litt. D.

* Arg. pl. trapes *, ou Murex à dents de Chien. 60. 1. 261. Trois Chausse - trapes de moyenne grandeur, dont une blanche marbrée sur les côtes & les pointes de rouge-brun, nué d'orangé, & deux autres en pendant, dont la couleur est plus semblable à celle des précé-

pointes régnans dans toute leur longueur,

dentes. 4"

262. Trois Rochers des Indes peu communs, dont un marron-clair marbré de blanc, à stries fines circulaires, & deux rangs de clouds, à tête peu élevée & presque entiérement enveloppée dans un retour blanc de la levre intérieure, qui est aussi évalée vers l'extrémité * séba, pl. inférieure de la clavicule *, & deux Chaussetrapes des mêmes couleurs que celles de l'art. 260, mais qui en différent en ce que la tête n'en est pas élevée, & qu'elles font destituées de

*Ibid. no. 8. stries transversales *. 9.1. Arg. pl. 14. litt. P.

263. Huit petits Rochers par pendans ; sçavoir, deux blancs à groffes côtes longitudinales bien prononcées & fort écartées, formant

sur les côtes des tubercules plus ou moins gros, à huit orbes applatis, & umbiliqués; deux gris VII. FAMA de forme approchante de celle du premier de ROCHERS. l'article précédent, mais à quatre rangs de tubercules moins saillans; deux Chausse - trapes de l'espéce de celles du même article, & deux Lards, dont un marron, l'autre souci, tous deux à zônes blanches, & à deux rangs de clouds situés l'un en haut, l'autre en bas. 7.

264. Dix-huit petits Rochers, dont douze par pendans; scavoir, un très-rare blanc, ventru, umbiliqué, à stries transversales, & cinq rangs de tubercules marqués principalement vers le haut, à tête faillante couleur de noisette, & à bouche couleur de chair; un blancfale, à gros boutons noirs, rangés dans sept bandes obliques & cinq cercles, à bouche du plus beau lilas, étroite & dentelée des deux côtés, & de l'espèce nommée Mure *; une Mure peu différente, à tubercules marron, & à bou- 804. f. 13. che blanche; deux petites à boutons & grains plus nombreux & plus serrés, de forme moins renflée, à tête plus élevée, & à bouche violette*; une blanche ventrue, à bouche fort ouverte, & 254. f. 5. à deux petites taches noires sur la levre intérieure *; un petit Rocher à stries fines circu- * Bonan. cle laires, granulcuses, à robe grise hérissée de tu-3.f. 174. bercules pointus, à houche couleur de sasran, litt. BB. & umbiliqué, nommé en Hollande Hérif- f. 50.

Liii

son ; un autre Hérisson, à-peu-près de même VII. FAM. forme, mais fauve en-dessus, pour pre en-dedans Rochers. & sans umbilic 2; deux autres blancs, hérissés de 1 Gualt. tab. pointes fines, marron, fort faillantes, à levres 44. litt. S. ² Ibib. tab. dentelées & bordées de jonquille³; deux blancs-28. litt. R. Hold.litt.N. marbrés de brun-noirâtre, à pointes plus grof-Arg. pl. 10. ses, moins nombreuses, & à tête plus élevée lett. A. 4 Gualt. tab. que les précédens 4; deux noirs marbrés de 43. litt. V. blanc, à trois rangs de clouds & à tête éles. Séba, pl. vée 5; un jaune-pâle en-dehors, jonquille en-60. n°. 38. dedans, de forme applatie, ceint de cinq rangs peu marqués de cordons un peu tuberculeux, qui finissent à la levre extérieure en un double rang de pointes, dont les deux plus hauts s'é-6 Ibid. n°. 48. tendent en forme de pattes 6; un petit Rocher marron à trois stries fines circulaires, à pas des deux premiers orbes applatis, & couronnés de 7 Ibid. n°.32. tubercules 7, & deux ventrus blancs fasciés 8 Lift. tab. de brun, à un seul rang de gros tubercules 8.18.1 992-f. \$2. 265. Vingt-deux petits Rochers, dont deux de l'espéce des deux premiers de l'article 258, mais différens en ce qu'ils sont dépourvus des trois rangs d'épines sur le corps, & ne conservent qu'un rang de petits tubercules, qui se pro-

> presque tous des variétés déja décrites. 4.2. 266. Deux Rochers rares, citron, lisses, à tête fort élevée, à dix orbes tuberculeux, bordés chacun vers le haut d'une raye blanche

, séba, pl. longe sur tous les orbes 9, & vingt autres

60.n°.9.

ponctuée de canelle, & à clavicule blanche. 25.

VII. FAM. ROCHERS.

267. Dix Rochers de moyenne grandeur, dont huit marbrés & bariolés de diverses couleurs, de forme approchante de celle des deux de l'article précédent *, & deux de même ef- * Dist. tab. péce, mais remarquables par divers accidens 888. f. 9. qui les rendent monstrueux. 3".1.

Arg. pl. 14.

268. Quatre grands Rochers; sçavoir, un lett. I. revétu de son épiderme, marbré de blanc & de fauve-roux, & trois dépouillés, dont un couleur de chair, & deux ventre de biche, tous à fascies transversales onduleuses, & peu prononcées, à tête élevée, & à onze orbes couronnés de clouds fort saillans *: plus, trois * Gualt. tab. petits à firies fines circulaires, à clavicule éle-54. litt. M. vée, & à une couronne de clouds dans le premier orbe, qui se changent en petits tubercules dans les fuivans *. 3.4.

* Arg. pl. 14.

269. Quatre autres qui ne différent des pré-lett. K. cédens qu'en ce qu'ils sont couleur de chair, teints de fauve & nués de brun, & que les clouds qui couronnent le corps y sont beaucoup plus faillans, & trois petits comme les derniers du même article. 3."

270. Trois Rochers, dont un ventre-de-biche, de forme effilée vers le bas, renflée dans le corps, à fix pas un peu concaves séparés par un petit fillon, & couronnés de tubercules un

Liv

ROCHERS.

peu applatis *; un fauve-roux, qui en differe VII. FAM. en ce que les pas n'en sont point séparés par des chers. vuides, & que la tête est un peu plus élevée, & un plus petit, rare, blanc nué de verdâtre, imitant le jade, de forme effilée vers le bas, mais du reste à-peu-près semblable au précédent.

GENRE SECOND.

ROCHERS A BOUCHE DENTÉE ET A PETITE QUEUE.

271. A EUX grands Rochers triangulaires fauve-roux, à fascies transversa es nombreuses. élevées & tuberculeuses, à stries fines en même sens dans les intervales des fascies, à trois rangs de bourrelets un peu applatis, mais trèssaillans, surtout celui de la levre extérieure,

* séba, pl. à queue retroussee, & nommes Dragons * 7. 272. Deux autres ventre-de-biche, nué d'or rangé, à grosses côtes tuberculeuses transversales, & à plusieurs rangs de bossages fasciés de blanc & de marron, de forme très-irréguliere, à queue un peu contournée & retroussée; efpéce que quelques Amateurs nomment Rhino-


* Arg pl. 10. ceros *. 7.13!

273. Quatre Rochers; sçavoir, deux jaune-

pâle nué de blanc dans l'un, & d'aurore dans l'autre, à plusieurs rangs circulaires de tubercules granuleux, à quelques portions de côtes longitudinales tuberculeuses, à levre extérieure dentelée, & à très-petite queue, connus
fous le nom de Culotte de Suisse *, & deux *Arg. pl. 9.
fauves, nués d'aurore, à côtes & fascies peu lett. D.
Rumph. tab.
différentes de celles du Rhinoceros, mais moins 28. litt. C.
faillantes & plus arrondies, à orbes bombés &
à queue un peu longue, contournée & retrousfée *. 6.1!

274. Dix petits Rochers; sçavoir, deux 37. litt. F. fauves nués de blanc, de forme bombée, à stries longitudinales & transversales, granuleuses aux points où elles se croisent, à trois côtes tuberculeuses, & à queue un peu longue recourbée; un plus petit des mêmes forme & couleur, mais à deux bourrelets seulement; deux blancs nués de fauve, à côtes & stries plus prononcées, & à longue queue recourbée *; deux en treill's granuleux, à queue *Arz pl. 100 courte retroussée; une Culotte de Suisse, & lett. O. deux petits Dragons, dans l'un desquels la côte formant la levre extérieure est moins large & creusée en dedans, ce qui, suivant quelques Naturalistes, désigne le premier âge de la Coquille *, 3#1!

* Séba, pt. 275. Deux Rochers des Indes fauves nués 63. n°. 9 & 10. de blanc, de forme applatie, à deux rangs la-



VII. FAM. longitudinaux de petites pointes, à levre extérieure dentelée, & à petite queue, nommés * Séba, pl. en Hollande Crapauds * . 8

* Séba, pl.
60. n°. 19.
List. tab. 949.
2°. 44.

276. Sept Rochers des Indes; sçavoir, deux blancs nués de fauve & de marron, à stries transversales granuleuses, dont trois plus fortes chargées dépines sur le corps, la plus élevée desquelles se prolonge dans tous les orbes, à deux côtes longitudinales & latérales tuberculeuses, & à très-petite queue, connus

* Gualt. tab. sous le nom de Raccrocheuses *; quatre de mê49. litt. s.
Séba, pl. 60. me espéce, dont deux fauves-gris, & deux
fauves nués de blanc, à pointes moins saillantes, & répandues dans moins de zônes, l'un

* 1bid. n°. desquels n'a que deux petites bosses seulement*, s, 16, 17. & une petite Culotte de Suisse, à bouche du

plus beau lilas. 9.1.

277. Deux Rochers des Indes rares, marbrés de blanc & de marron, chargés de gros tubercules granuleux, à deux grosses côtes latérales, d'où sortent en dehors des pointes creusées en gouttiere, à bouche à-peu-près semblable à celle de la Culotte de Suisse, & à *Arg. pl. 9. petite queue retroussée *. 48.

lett. R. Séba, pl. 60.


278. Quatre Ro chers par pendans, dont deux blancs marbrés de fauve, à stries longitudinales & transversales granuleuses dans leurs rencontres mutuelles, de forme bombée, & comme bossuée en-dessus, mais applatie en-dessous, à levres se rabattant en-dehors en une fraise platte, mince VII. FAME & dentelée des deux côtés, espéce que la forme de sa bouche a fait nommer Grimace *, & *Arg. pl. 9. deux blanches, qui ne différent des précédentes, qu'en ce que la robe en est formée d'un réseau plus régulier & à plus petits grains, & que la seule levre extérieure y est bordée d'une fraise; on nomme cette variété Grimace blanche. 90.

279. Cinq Rochers, dont un blanc nué de fauve, à tête élevée, à zônes granuleuses, à deux rangs de tubercules dans le corps, qui se prolongent en diminuant de groffeur sur les autres orbes, & à deux rangs latéraux de côtes longitudinales; deux Culottes de Suisses, & deux Grimaces des variétés de l'article précédent. 12.1.

280. Deux Rochers des Indes, rares, couleur de chair, flambés par zônes de rougeobscur, à tête applatie, à clavicule aigue, à petite queue fort retroussée du côté de la levre intérieure & sinueuse à son extrémité, à levre extérieure coupée en vive arrête, ce qui les distingue de tous les autres Casques, dont le caractere spécifique est d'avoir cette levre rerouffée en bourrelet: ceux-ci nommés Casques-28#12.

Plumes, sont très-grands dans leur espèce *. 28#12.

281. Deux Casques - Plumes de couleurs tab. 22. lit. B.



l'espèce des deux premiers de l'arti le précédent; & deux verd de payot qui n'en différent

qu'en ce qu'ils sont moins grands, très-finement réticulés, à taches plus petites, & de for- VII. FAM. me un peu moins bombée *. 18.1.

286. Quatre Casques; sçavoir, deux Pavés 40. litt. B. du Golfe de Venise, blancs nués de fauve, à taches quarré-long, striés circulairement dans les premiers orbes finement réticulés dans les derniers, à tête un peu élevée, à coque mince & lévre intérieure granuleuse *; & deux des * Bonan cl. Indes, gris teint de verd d'eau, lisses dans le premier orbe, finement réticulés dans les autres, à pas applatis bordés de petits tubercules, à lévre extérieure finissant par trois dents faillantes en dehors, & à côte longitudinale située derriere le repli de la lévre intérieure, espèce qu'on nomme Casque Bézoard, ou simplement Bézoard * . 6 . 1:


287. Trois Casques; sçavoir, deux de la 71. n°. 12. Gualt. tab.40. Méditerranée, qui ne différent des premiers de litt. A.

'article précédent, qu'en ce que les taches s'y oignent en sorme de bandes longitudinales, que les canneluses transversales y sont beau-

coup plus grandes, & la coque plus épaisse *; * Gualt. tab. & un gros B zoard dépouillé, devenu par-là Séba, pl. 68, noisette, bordé de bleu pâle. 6.1!

288. Treize petits Casques; sçavoir, deux planes à robe pliffée en longueur, à pas des leux premiers orbes un peu tuberculeux, & * Gual tabi l'évre extérieure fort épaisse, tachetée de 39. litt. D. Arg. pl. 140 prun *; deux rares qui différent des précédens lett. G.


* Séba, pl.



dinales, & à lévres tachetées de rouge-brun, dont un à pas des orbes un peu applatis & **Gualt. tab. couronnés de petits tubercules *, & l'autre à 40 litt. C. pas des orbes sans tubercules, mais arrondis en forme de gros bourrelets, & séparés les uns des autres par un prosond sillon; ce qui le rend aussi très-rare. **

290. Seize Casques de différentes grandeurs; sçavoir, deux blanc - jaunâtre de la Méditerranée, de forme très-bombée, & à stries circulaires peu prononcées *: deux des Indes blancs, striés aussi circulairement, mais à pas des orbes 999. fig. 64. creusés en dedans en forme de fillon assez profond; deux fauves nués de blanc, à cinq fascies suberculeuses sur le premier orbe, dont la plus élevée se prolonge sur le haut du second & du troisieme orbe *; deux blancs, lisses, tachetés * Rumph.tab. de marron autour de la spirale, & de brun sur 27, n°. 1. le bourrelet de la lévre extérieure *; un Casque fig. 68. pavé lisse à petites taches *; un Casque rayé de 53. n°. 9.
*Rumph.taba l'espéce de ceux de l'article 288; deux comme 25. litt. B. les deux premiers, & un comme les septieme & huitieme du même article; un qui différe du précédent, en ce que les pas des orbes en sont moins applatis & fimplement granuleux; & deux Bonnets de Pologne. 10". 1.

291. Dix Casques de moyenne grandeur; scavoir, deux blancs de la Méditerranée, à grosses stries granuleuses dans le haut, à lévres



extérieure repliée en gros bourrelet, & inté-VII. FAM. rieure granuleuse *; un de Saint-Domingue, ROCHERS. *Bonan. cl. de forme à peu près semblable, mais à stries 3. fig. 21. circulaires moins prononcées & de couleur fauve; un des Indes, rose-séche, lisse, couronné dans le haut du corps de petits tubercules, & umbiliqué; deux Casques Bézoards, dont un dépouillé; deux Bonnets de Pologne, & deux de l'espèce des cinquieme & sixieme de l'article précédent. 8.

292. Deux Casques peu communs, blancs nués de fauve, à stries circulaires nombreuses, à lévre extérieure relevée & saillante en dehors en vive arrête, & intérieure tapissant une portion de la base, & saillante aussi vers le bas, à petite queue peu retroussée, l'autre pon * 1000 de deux cârés. L'autre pon * 1000 de deux cârés.

* Gualt, tab. telée des deux côtes, l'autre non * 12.10.

43. n°. 2.

50 ann el.

293. Un grand Casque de la mer du Sud, rare, blanc nué de fauve, à stries longitudinales peu élevées en forme de rides, à quatre zônes chargées de taches rousses, & dont la plus haute est un peu tuberculeuse, à huit orbes rensses, ornés chacun d'une couronne de petits tubercules, & au-dessus de cercles granuleux, à lé-

vres extérieure & intérieure faillantes en dehors *** sba, pl. & applaties, & à côte mince longitudinale *.

73. n°. 12 & 394. Deux grands casques des Indes, nués

394. Deux grands casques des Indes, nués & marbrés de blanc, d'aurore & de brun de différentes nuances, à stries sines longitudinales,

ceints

Gual. taba

tuberculeux, à bouche dentée des deux côtés, VII. FAMA & à lévres retroussées, l'extérieure fort épaisse, ROCHERS. l'intérieure ridée, noire en dedans, tapissant une partie de la base, & nommés Turbans *. 16.

295. Deux Turbans de couleurs très-vives, 73. n°. 3, 48 moins grands que les précèdens, & par-là pro-

pres à être placés dans des tiroirs. 12".

296. Deux semblables, mais moins grands; & à lévre extérieure fort mince, ce qui est rare

dans cette espéce de Casques. 17"


297. Deux gros Casques d'Amérique, grisblanc, flambés par bandes longitudinales en zig-zag de sauve, de brun & de violet, de forme un peu triangulaire, à trois fascies transversales tuberculeuses, dont les deux premieres ont peu prononcées, à tête applatie, à lévres eintes par grandes taches de brun-soncé, & nommés Casques triangulaires *. 6."

298. Deux Casques triangulaires de moyenne 41. litt. A, grandeur, dont un à un seul rang de tubercues, & imitant par son dessein le point de Hongrie*; l'autre en différé en ce qu'il n'a point de * séba, pla tries dans le corps, & que son milieu est 73. n° 10 80 hargé de gros tubercules *. 5 4-1

299. Trois Casques; sçavoir, deux blancs 14 & 15.
narbrés de fauve & de brun, à stries circulai-

es & cannelures piquées réguliérement de peits traits longitudinaux, par où ils imitent le

Tome I.



desfous d'un ouvrage tricotté, à trois fascies VII. FAM. tuberculeuses, & une couronne de clouds qui ROCHERS. s'étend dans tous les orbes, dont les pas sont applatis & se recouvrent l'un l'autre, nommés Casques tricottés, petits dans leur espéce, &

* séba, pl. par-là propres à entrer dans des tiroirs *; & un 73. n° 7 & 8. de la variété du premier de l'article précédent, Gualt. tab. 40. mais dont le rang de tubercules est à peine senlitt. D.

* Séba, ibid, fible *. 19."

nº. 19 & 20.

300. Trois Casques plus grands que les précédens, dont un Tricotté, & deux Turbanso. 301. Deux grands Casques, dont un Tricotté, & un Turban. 11".1.

302. Deux gros Casques triangulaires, à trois rangs de tubercules fort saillants, de la base de l'un desquels on a enlevé des portions pour mettre à découvert la structure intérieure. 10.

303. Trois très-grands Casques, dont deux gris-jaunâtre, à deux rangs de tubercules sur le milieu du corps, & un de clouds très-saillans à l'extrémité, à lévres applaties & extrêmement faillantes, sur-tout du côté de la tête qui est peu élevée, à coque très-épaisse & bouche dentée

* Lift, tab, des deux côtés *; & le troisseme gris, à stries circulaires encore plus distantes que dans le précédent, à trois fascies chargées de mammelons peu élevés, à tête platte, & à lévres applaties, plus faillantes vers les côtés que vers la tête, à côte platte longitudinale, couchée

1008.

ous la lévre intérieure, & se prolongeant sur es orbes suivans, & à bouche tachée de rouge-VII. FAM. ROCHERS.

GENRE TROISIEME.


ROCHERS A BOUCHE AILÉE SANS PATTES.

o4. In grand Rocher blanc un peu taché le jaune, à grande aîle cannelée transversalement, se repliant en dedans, s'étendant sur la ête, la dépassant, & échancrée vers le bas, à ix orbes couronnés de petits tubercules, & ommé l'Aîle large *. 9/6.

305. Trois Rochers aîlés, dont deux blancs, tab. 36. lit. L. 2 un fauve nué de blanc en dessus, & blanc ng. 18. 2. n dessous, à aîles moins grandes que celles du récédent, ne s'étendant que jusqu'au second rbe, & sinissant par deux échancrures, à dix rbes couronnés de petits tubercules, & de espéce nommée Tourterelle *. 6. 4.

*Séba, pl. 22. n°. 21 & 22. uatre petites zônes blanches, tachetées du Rumph. tab. 22. n°. 21 & 22. n°. 21 &

M ij



& finissant par deux petites sinuosités *; & deux Tourterelles sauves. 4"

VII. FAM. 4 2/ 307. Idem, à quelque petite différence près.

* séba, pl. 308. Deux Aîlées blanches nuées de jaune,

62. nº. 28 & à stries transversales dans le bas, & cannelures

29. à longitudinales dans le haut, traversées de stries

fines circulaires, à tête fort élevée, composée

de neuf orbes réunis les uns aux autres par une

moulure, à aîle recourbée, commençant & fi
nissant par une échancrure, & à lévre intérieure

retroussée en dehors:on les nomme en Hollande

* List. tab. l'Artimon entortillé * . 15."

309. Deux Artimons entortillés peu communs, dont un blanc qui ne différe de ceux de l'article précédent, qu'en ce qu'il est de forme plus effilée, & à onze orbes, dont les cannelures sont plus marquées & se prolongent même

* séba, ple sur le corps *; & un blanc nué de jaune, abso-62. n°. 19. List. tab. 855. lument de même forme, mais sans aîle, & par fig. inserior. conséquent du premier âge de cette espéce. 6.

310. Cinq Artimons entortillés; sçavoir, deux de l'espèce de ceux de l'article 308, à petites mailles orangé sur un fond blanc, & à trois zônes blanches, chargées de chevrons aussi

* Séba, pl. orangés *; & trois papyracés du premier âge, 61. n°. 18 & dont deux marbrés de blanc & d'orangé, & Rumph. tab. un blanc avec une légere teinte de jaune. 4. 11. 36. lit. O.

311. Quatre Aîlées peu communes, dont deux blanches à rayes circulaires & onduleuses anves très-serrées, un peu bossues dans leurs contours, à une échancrure dans le haut de VIL FAM. 'aîle, & deux dans le bas, & à bouche lilas *; ROCHERS. * Bonan. cl, & deux petites de même forme, marbrées de 3. f. 150. run-jaunâtre, & à cinq zônes blanches ondueus *.

312. Deux Aîlées très-rares, blanches, à 847. fig. 1.
Arg. pl. 143.
ayes circulaires pourpre, formées de traits in-lett N.
errompus & onduleux, à huit orbes, dont le 37. lett. V.
remier est couronné d'un rang de tubercules, à
riple échancrure dans l'aîle comme les précélentes, & à bouche citron; on les nomme en
Hollande Buccins de la mer rouge. 24.

313. Deux Aîlées rares, marbrées par granes taches de marron clair & de blanc, à tête levée, composée de neuf orbes traversés de annelures longitudinales peu prononcées, à île bordée dans le haut d'un petit bourrelet, c de trois dents saillantes dans le bas, & à lévre itérieure repliée en dehors*. 30.

314. Neuf Aîlées; fçavoir, trois rares, dont 61. 10. 41. 47.4. 47.47. eux blanches tirant sur le couleur de chair, à ônes formées de hachures jaunes qui repréntent, sur tout vers l'aîle, des caracteres Chiois, à tête applatie, & composée de sept orbes recouvrant l'un l'autre, & un peu tubercuux, à aîle échancrée en haut & en bas: la oisseme différe des deux premieres, en ce que tête est un peu plus élevée, & que l'aîle n'en

Miij

COQUILLES UNIVALVES 182

61. nº. 13.

est pas bien formée, ce que la plûpart des Na-VII. FAM. turalistes jugent désigner le premier âge de la ROCHERS. Coquille *; deux blanches à larges zônes formées de chevrons souci, à tête un peu élevée, à aîle échancrée comme celle des précédentes, & à bouche safran, à la levre intérieure près, qui est * List. tab. d'un beau noir *; quatre de même espèce, mais

Rumph. tab. du premier âge, dont deux dépouillées, & de-M°. 11 & 12.

7. litt. 8. Séba, pl. 61. venues par-là blanc de lait. 6. 315. Treize Aîlées; sçavoir, une rare blanc

de lait, à stries circulaires inégales, peu prononcées, à huit orbes, dont les pas des premiers sont un peu applatis & bordés d'une efpéce de petit bourrelet, à clavicule aiguë, & aîle un peu recourbée, s'élevant jusqu'au troisieme orbe; deux non moins rares, dont une blanche, & l'autre grise bariolée de jaune, toutes deux à stries fines transversales, à cinq rangs de petits tubercules d'inégale grosseur sur le corps, à huit orbes couronnés aussi de tubercules très-gros dans le premier, à bouche brune tirant sur le noir, & à aîle épaisse, échancrée * séba, pt. en haut & en bas *; deux blanches nuées de

52. no. 17. & gris & de verd de pavot, à l'exception du bord

che, à tôte élevée, composée de huit orbes tu-* List tab. berculeux, & à petite queue, espéce qu'on 807 fg. 13. nomme Gueule noire *; une autre Gueule noire Saba, pl. 61. nº. 30 & 31. sasciée de marron clair & de blanc; & sept au-

de l'aile, qui est brun-noirâtre, ainsi que la bou-

eres Aîlées de diverses couleurs & marbrures, & d'espéce approchante de celle des Gueules VII. FAR. noires *. 6"


3 16. Dix-huit Aîlées par pendans; sçavoir, 61. n° . 35-404 quatre marbrées & fasciées de blanc & de rougebrun *; quatre petites Tourterelles, dont deux cannelle, à petites zônes blanches, & deux blan- 50.8654 ches nuées de fauve *; deux Gueules noires; * Rumph. deux comme les troisseme & quatrieme de l'ar-tab. 36, lit. P. ticle 306; deux comme les quatrieme & cinquieme de l'article 314; & quatre comme celles de l'article 311, à la couleur près des deux

premieres, qui est blanche. 6."

317. Deux grandes Aîlées de la Jamaique rares, blanches, marbrées par traits longitudinaux de roux, à trois grosses côtes longitudinales dans le corps, qui forment, dans la couronne du premier orbe, autant de gros tubercules oblongs, à dix orbes un peu creusés en doucine, & à aîle mince, sinueuse vers le bas, & très-saillante. 36.4.

318. Trois Aîlées de la Jamaique, peu communes; sçavoir, une grande blanche, nuée de roux, à deux rangs de petits tubercules inégaux dans le milieu du corps, & un troisieme de gros, couronnant le premier orbe, & se prolongeant sur les suivans, à aîle épaisse vers le haut, & sinueuse vers le bas *; une de moyenne grandeur, blanche nuée de couleur de rose, 62-nº, 6-

Miv



de l'espèce de la précédente, mais où les deux fas-VII. FAM. cies ne sont marquées que du côté de la lévre Rochers. intérieure, & à tubercules des orbes moins sail-

* séba, pl. lants *; & une de l'espéce de celles de l'article £2. nº. 8. précédent, mais moins grande. 6.10

> 319. Deux Aîlées en pendant, de l'espéce de la premiere de l'article précédent, un peu moins grandes, mais riches en couleur : leur robe est canelle, nuée de verd de terrasse, & marbrée

de blanc & de ponceau. 9."

320. Quatre Aîlées en pendant; sçavoir deux blanches tachetées de brun de diverses nuances, à huit zônes chargées de petits tubercules inégaux, à un cercle de bossages qui couronnent le premier orbe, & se prolongent en forme de tubercules sur les suivans, à aîle terminée en bourrelet épais, s'étendant vers le haut sur les quatre premiers orbes, à deux échancrures vers le haut, & autant vers le bas,

* Ibid. no de l'espéce nommée Tête de serpent *, & grandes dans cette espéce; & deux aurore très-vif dans Guale, tab.32. le corps, à tête blanche, à douze orbes, dont les premiers sont couronnés de clouds, & les autres de tubercules, à aîle échancrée dans le bas, & sinueuse dans le haut: on les nomme

* Arg. pl. 15. Oreilles de cochon *. 12"

litt. A.

Gualt tab. 32. 321. Cinq Aîlées; sçavoir, trois Oreilles de lit. B. cochon, dont deux semblables aux précédentes, mais de couleur plus foncée, & ornées chacune. d'une large zone plus claire que le fond; la troisieme a une zône semblable, mais le premier VII. FAM. orbe est dépourvu de clouds, & les autres n'ont ROCHERS. que de petits tubercules peu prononcés; & deux Têtes de serpent. 4". 1?

3.22. Sept autres Aîlées; fçavoir, quatre Oreilles de cochon, dont une rare & singuliere, en ce que les clouds, au lieu d'être pointus, font coupés quarrément comme les dents de certaines roues, une peu commune, en ce qu'elle est blanche en dessus, & pourpre en dedans; deux comme les premieres de l'article précédent, & trois Tête de serpent, dont une à aîle épaisse, une à aîle papyracée*, & l'autre sans aîle ou du premier âge *. 6."

3 23. Quatre très-grandes Aîlées d'Amérique, 62. nº 40. revêtues de leur épiderme fauve-roux, à grosses stries transversales, à orbes couronnés de tubercules très-faillants, & à bouche couleur de rose, nommées Lambis, dont une à aîle fort épaisse, deux à aîles plus minces, & la derniere du premier âge, c'est-à-dire, sans aîle *. 3". 5!

324. Trois gros Lambis du premier âge, 34. litt. A. dépouillés de leur épiderme, dont deux couleurde chair, & un couleur de rose. 3".1.

325. Quatre Aîlées à peu près des couleurs & nuances des Lambis, mais moins grandes; elles en différent d'ailleurs en ce que la bouche n'en est point couleur de rose, que les tuber-

Séba, ph

* Gualt. tab.

136 COQUILLES UNIVALVES.

cules du premier orbe en sont plus gros à pro-VII. FAM. portion, & que ceux des autres orbes sont presque entiérement cachés sous les extrémités des orbes précédens: l'aîle est fort épaisse dans l'une, & papyracée dans l'autre : les deux dernieres sont du premier âge ou sans aîle, à robe rosepâle dans l'une, ce qui l'a fait nommer Pomme d'Acajou, & violette dans l'autre, que l'on nomme l'Episcopale. 3.1.

3 26. Deux Pommes d'Acajou en pendant, & de couleurs très-vives. 4.5. avec le suivant 327. Deux Episcopales aussi en pendant.

328. Six Aîlées de moyenne grandeur, par pendans; sçavoir, deux marron foncé, marbrées & tachetées par zônes de blanc & de brun, à grosses stries circulaires un peu onduleuses, à un rang de tubercules au haut du corps, dont les plus près de l'aîle sont les plus gros, à tête assez élevée, & à grande aîle épaisse dans son bord, échancrée dans le bas, & s'éle-

* séba, pl. vant un peu vers le haut *; deux couleur de 62. n°. 5 & 9. tuile, semblables de forme aux précédentes, & qui en conservent la marbrure dans un petit cordon qui régne autour des spires; & deux du premier âge de cette espéce, des mêmes couleurs & dessein des deux premieres, mais sans

* Ibid. nº. aîles *. 5.4!

329. Six autres Aîlées par pendans, de fond & marbrure semblables aux premieres de l'article précédent; sçavoir, deux du dernier âge, à aîle bien formée, & du reste plus épaisse dans VII. Fam. l'une, & papyracée dans l'autre; deux qui ne dissérent de celles-ci qu'en ce que la lévre extérieure, qui y est aussi papyracée, s'y éleve à peine en forme d'aîle, ce qui les fait regarder comme l'âge moyen de la Coquille *; & deux * Séba, pla comme les dernieres de l'article précédent, à 62. 10°. 37°. lévre extérieure papyracée aussi, & ne tenant point du tout de la forme d'aîle; ce qui constitue le premier âge de cette Coquille. Ces trois variétés sont fort intéressantes. 4".

330. Sept Aîlées; sçavoir, deux du dernier âge de l'espèce des deux premieres de l'article 328, mais un peu différentes pour le sond; une de l'âge moyen, & quatre du premier âge, dont deux de la premiere variété du même article, & deux de la seconde. Veu du avec l'ast suivant.

331. Neuf Aîlées; sçavoir, deux bariolées de marron, de sauve & de blanc, à stries circulaires un peu onduleus & granuleus, à granuleus, à grande aîle épaisse dans son bord, échancrée en haut & en bas, & armée, au-dessus de l'échancrure d'en haut, d'une avance en sorme de doigt, à petite queue échancrée & retroussée, nommées Oreilles d'âne *; deux Oreilles d'âne, * Arg. pl. dissérentes des précédentes, en ce que l'aîle en séba, pl. 61. est papyracée, & n'a ni échancrure, ni avance; n°.1 & 2. List. tab. 872. deux comme les première & troisieme de l'ar fig. 28.

COQUILLES UNIVALVES X 88

ticle 328, & trois variétés du premier âge de VII. FAM. cette espéce *. 7.2!

ROCHERS. 332. Les mêmes Coquilles que dans l'article * Séba, pl.

61. nº. 8-10. précédent, à cette différence près que l'une des Oreilles d'âne de la premiere espèce est blanche. nuée de couleur de rose. 4. 10.

333. Quatre grandes Aîlées marbrées de blanc, de fauve & de roux, dont deux ne différent des précédentes qu'en ce qu'elles sont 4 Ibid. pl. couronnées de plus gros tubercules *; les aîles 52. nº. 4. des deux autres s'élevent au niveau de la columelle, & jettent en avant une espèce de doigt qui se prolonge encore beaucoup plus loin, ce * Ibid. pl. qui les fait nommer Aile d'Ange *. 7."

81. nº, 1 & 2. Lift. tab. 8740 6g. 30.

GENRE QUATRIEME.

ROCHERS A BOUCHE AILÉE ET A PATTES.

334. & ROIS grands Rochers des Indes, marbrés de blanc & de marron clair, à quatre fascies tuberculeuses, & de différens âges; sçavoir, un du dernier âge, à aîle armée de six grandes pattes crochues, creusées par dessous en canal presque sermé, à lévres chargées de petites stries *séba, pl. 81. aurore, nommé en France Araignée mâle, & Gualt, rab. 35 en Hollande Griffe du Diable * 5 un de l'âge litt. B.

moyen, à pattes courtes fort larges & fort ouvertes, nommé l'Araignée femelle ; & un du VII. FAM. premier âge, à lévre papyracée, dépourvue Rochers, d'aîle & de pattes 2 37 8!

Rumph. tab.

335. Idem, à quelques petites différences 35. litt. B. près dans les pattes de l'Araignée mâle, qui sont 3; nº. 1. plus ouvertes que dans celle de l'article précé-Rumph. tab. dent. 18"

336. Deux Araignées mâles d'une autre variété, & peu communes: elles sont à six pattes comme les précédentes, mais à fascies plus élevées, & ont non-seulement les lévres, mais encore tout l'intérieur de l'aîle chargés de stries 20. onduleuses blanches & de cannelures brunes 3. , Lift. tabe

337. Quatre Araignées marbrées sur le corps 870. f. 24. des mêmes couleurs que les précédentes, & blanches seulement en dedans, à sept pattes, y compris la queue, nommées en Hollande Crabes communs, dont deux mâles ou du second âge, à pattes longues, étroites & fermées 4, & deux 4 Arg. pl. femelles ou du premier âge, à pattes courtes, 14 lett. E. larges & ouvertes 5. 17.

338. Deux Araignées mâles à sept pattes, 866. f. 21. plus grandes que les précédentes, l'une blan-Rumph. tab. che marbrée de marron, remarquable par une grande queue recourbée, & l'autre blanche nuée de fauve, à petite queue. Plus une du premier âge de cette espéce. 15.1.

339. Deux Araignées mâles de cette espèce.

190 COQUILLES UNIVALVES

Rochers.

marbrées de fauve au lieu de marron, dont VII. FAM. une monstrueuse, en ce que trois de ses pattes partant d'un même pli, saillent fort en avant, & se replient même sur les autres; & une troisieme sans aîle, comme la derniere de l'article précédent. 18.3.

340. Deux grandes Araignées mâles à sept pattes, d'une espéce rare : elles différent de toutes les précédentes, en ce que la clavicule comprenant les quatre derniers orbes, en est applatie, & que les tubercules en sont moins gros; l'une revêtue de son épiderme, & à grandes pattes fermées en dessous, l'autre dépouillée, à pattes un peu moins grandes & ouvertes, toutes deux du dernier âge de cette espéce. g"

341. Deux autres de même espéce, mais moins avancées en âge; sçavoir, une du moyen âge ou femelle, à aîle très-saillante, peu épaisse, bordée de grandes dentelures formées par le prolongement des fascies circulaires, & s'élevant jusqu'à la clavicule sur laquelle elle se replie; l'autre du premier âge, parfaitement semblable à la précédente, à l'aîle près dont elle est dépourvue, & nommée dans cet état, par * Lift, tab. Klein , Racine de Brione *. 12"

\$82. f. 4.

342. Deux petites en pendant, de même espéce, à lévre extérieure papyracée, & qui paroissent être d'un âge encore antérieur à la derniere de l'article précédent. Ces trois articles

réunissent sous un seul point de vue tous les changemens d'état de cette Coquille. 3/1.

343. Trois Rochers des Indes; sçavoir, deux ROCHERS. blancs marbrés de fauve - roux, différens des Araignées de l'article 337, en ce que les sept pattes en sont noueuses, la forme moins bombée, & la bouche striée, blanche & brune : on les nomme en Hollande Crabes à nœuds ou goutteux, & en France Scorpions *; l'un mâle

à longues pattes fermées, l'autre femelle à pattes 14. lett. B. Rumph. tab. courtes & ouvertes, & un différent des précé- 36. litt. K. dens, en ce que les pattes en sont à peine noueuses, que le dedans de la bouche en est orangé,

& sans stries, nommé le Scorpion orangé. 9 8.

344. Six Rochers; sçavoir, quatre petits fauves nués de gris, à orbes tuberculeux & à tête élevée, deux desquels ont l'aîle partagée en quatre longs doigts, & se nomment en Hollande Aile de chauve-fouris mâle *; les deux * Gualt, tab. autres à aîle armée d'un seul doigt peu long, & 53. litt B. C. nommées Aile de chauve-souris femelle *: ces no. 17. * Gualt. tab. Coquilles sont encore connues sous les noms de 53. litt. A. Hallebarde ou de Patte d'oie; & deux Scorpions fig. 20. mâles des variétés de l'article précédent. 20.19!

345. Trois Rochers marbrés de blanc & de roux, à dix pattes, y compris la queue, à bouche couleur de chair, striée des deux côtés, nommés Mille-pieds, dont deux mâles à pattes

192 COQUILLES UNIVALVES

VII. FAM. racée, garnie de pattes courtes & ouvertes 2.15.

ROCHERS.

1 List. tab. 346. Trois Rochers; sçavoir, deux Griffes
868 & 869. st. du Diable, dont une très-grande, & l'autre dé23.

Rumph. tab. coupée en spirale, pour faire voir l'intérieur de
36. litt, I.

2 Arg. pl.15. la Coquille, & une Araignée semelle de la lett. B.

même espèce. 5.1.



HUITIEME

HUITIEME FAMILLE.

POURPRES.

dinairement moins grosses & moins pourres. Tensées du milicu que les Murex. Elles sont encore caractérisées par une petite bouche à peu près ronde & unie, par des côtes longitudinales plus ou moins nombreuses, placées à égale distance les unes des autres, & chargées ou de tubercules, ou de petits clouds aigus, ou de feuillages à bords découpés & frisés, ou ensin d'épines longues & sinnes. Elles ont toutes une queue creusée en gouttiere plus ou moins longue, d'où nous tirerons leur division en deux genres; sçavoir,

- 1°. Les Pourpres à queue un peu large, courte & recourbée.
- 2°. Les Pourpres à queue plus étroite, longue & droite.

Tome I.

N

194 COQUILLES UNIVALVES

PREMIER. GENRE

POURPRES A QUEUE UN PEU LARGE COURTE ET RECOURBÉE.

347. EUX très-grandes Pourpres rameu-VIII. FAM. ses des Indes, blanches veinées de fauve, ren-Pourpres. flées, à stries fines circulaires, à trois côtes longitudinales, d'où naissent de grosses seuilles frisées, plus grandes dans l'une, & moins dans l'autre, sur le milieu des intervalles desquelles on voit un rang longitudinal d'assez gros tu bercules, & à lévre intérieure teinte de couleur de rose, variété qu'on peut nommer Rameuse * Arg. pl. triangulaire *. C'est la Chausse-trape ou le Che-16. lett. C. val de frise de M. d'Argenville. 11." Séba, pl. 77.

nº . 4 ·

348. Deux semblables, mais moins grandes of

349. Idem, à cela près que le fond des deux Coquilles est rayé ici de brun & de marron. 12.

350. Idem, à quelque différence près dans la grandeur & les nuances. 6."

351. Deux Pourpres rameuses triangulaires des Indes, blanches, fasciées dans les cannelures de brun, à stries fines circulaires, & autres plus grosses, dont le prolongement se termine, le long des groffes côtes longitudinales,

en seuilles frisées très-saillantes dans l'une *, & fort peu dans l'autre. 4.10!

352. Deux Pourpres rameuses triangulaires Pourpres. *Séba, pl. des Indes, fauve nué de noisette & de marron, 77. n°. 2 & 3 à tête plus élevée que les précédentes, & à feuilles frisées très-longues, recourbées en arriere dans leur extrémité *. /4 ?!

*Ibid. no. 14

353. Quatre Pourpres rameuses triangulaires en pendans; sçavoir, deux d'Amérique, couleur de suye, à feuilles très-serrées les unes contre les autres dans chaque rang longitudinal, & qu'on pourroit nommer Enfumées; & deux de l'espéce de celles de l'article précédent, mais plus petites, & à feuilles plus minces, plus allongées à proportion, & plus recourbées *. 5."

* Arg. pl;

3 54. Quatre Pourpres rameuses triangulaires d'Amérique: sçavoir, deux blanches à clavicule marron clair, à stries circulaires très-fines; & deux Enfumées. Yeudu avec l'ast. 818.

355. Deux Pourpres rameuses triangulaires des Indes, noires, à quelques endroits près, qui sont marqués de blanc dans le corps, à grandes feuilles frisées & recourbées, à trois groffes bosses situées entre les trois rangs longitudinaux de ces feuilles, & à lévre intérieure couleur de rose, espéce qu'on nomme Brulée *. q. * Ibid. lett.

356. Trois Pourpres rameuses triangulaires; Séba, pl. 77. sçavoir, une de l'espéce de celles de l'article

COQUILLES UNIVALVES

352; & deux Brulées, où il paroît plus de VIII. FAM, blanc que dans celles de l'article précédent. 7-13'. 3 57. Quatre Pourpres rameuses en pendant, POURPRES.

des deux espéces de l'article précédent. 12.

358. Six Pourpres rameuses en pendant; sçavoir, deux blanches, femblables à celles de même couleur de l'article 354; deux Brulées, & deux comme les dernieres de l'article 353.65.

359. Deux Pourpres rameuses triangulaires des Indes, rares & en pendant, ventre de biche, à stries circulaires brunes, à feuillages peu faillans, mais bien dessinés, & d'un beau couleur de rose, à lévres bordées de même, de forme oblongue, & à tête fort élevée. 18.

360. Deux autres, dont une de la variété des précédentes, mais plus grande, plus foncée en couleurs, & dont les feuilles montrent moins de couleur de rose; & une qui ne différe de la précédente qu'en ce que le fond & les cannelures en sont de couleur blanche, & que les * séba, pl. feuilles & les stries sont marron soncé *. 12 2!

361. Trois Pourpres rameuses triangulaires; List. tab. 946. sçavoir, une semblable à la premiere de l'article précédent, mais plus foncée en couleurs, & à feuilles dont l'intérieur est lilas vif ; & deux blanches à stries circulaires brunes, de la forme des précédentes, à cela près qu'on y remarque trois range de bosses longitudinales entre chaque paire de côtes feuillues. 12.

362. Trois autres de la variété des articles précédens; sçavoir, une blanche nuée de fauve VIII. FAM. à feuillages couleur de rose; une fauve à stres POURPRES. brunes, & à dessous des feuillages couleur de chair, & la derniere marron à stries noires & à feuillages lilas vif. 28."

363. Quatre Pourpres triangulaires d'Amérique, à stries circulaires granuleuses, alternativement groffes & menues, à trois groffes côtes longitudinales, & à deux petites intermédiaires, sur lesquelles s'élevent les grosses stries du corps, formant sur celles-ci de petits tubercules, & sur les autres des feuillages très-courts & peu nombreux, toutes de couleur grise, mais dont deux à côtes blanches & bouche jonquille, & deux à côtes blanches & brunes, & à bouche couleur de rose. 4". 1!

364. Six Pourpres triangulaires en pendant; sçavoir, deux des Indes, rares, à stries fines circulaires, à trois grosses longitudinales, & à tubercules qui se continuent trois par trois dans chaque orbe, à petite queue armée de deux épines, à lévres teintes en dedans de cérise, à coque très-épaisse & de forme renssée ; deux de la Méditerranée, blanches, nuées de fauve, à grosses stries circulaires en forme de cordons granuleux, à profondes cannelures, à trois côtes longitudinales, chargées de plis affez faillans *, l'une desquellee conserve son opercule; morph pl. 4.

198 COQUILLES UNIVALVES

& deux de l'espéce des dernieres de l'article

VIII. FAM. 353. 11.19.

365. Huit Pourpres triangulaires rares; sçavoir, quatre des Indes, dont une blanche, & trois blanches à taches peu nombreuses rousses plus ou moins foncées, à stries circulaires, & à trois groffes côtes longitudinales qui s'étendent sur tous les orbes, & dans l'intervalle desquelles on en remarque trois plus petites, de même extension, de forme oblongue, à tête très-élevée, à lévre extérieure en bourrelet applati & dentelé, avec une petite avance platte en forme de commencement d'aîle; & quatre petites du Sénégal, dont deux blanches, & deux blanches marbrées de brun brûlé dans les intervalles des côtes, qui sont aîlées & tranchantes dans le premier orbe, arrondies dans les autres, & à queue fermée comme un tuyau, * Adans Hist, nommées par M. Adanson le Jatou *. 12.

* Adanf. Hist. du Sénég. pl. 9. fig. 21.

366. Une Pourpre triangulaire aîlée des Indes, très-rare, blanche, à stries circulaires très-fines, & à trois côtes longitudinales, de chacune desquelles, & principalement de celle qui borde la lévre, s'élevent de longues avances papyracées en forme d'aîle, à tête très-élevée, composée de sept orbes un peu renssés, & à lévres en vive arrête; elle porte trois pouces trois lignes de long. 140.1.

367. Une Pourpre aîlée différente de la pré-

cédente, en ce que les stries en sont plus prononcées, que les aîles s'y prolongent jusqu'à VIII. FAME le clavicule, que la tête en est moins élevée, quoique composée de neuf orbes, que les intervalles des côtes aîlées y sont chacun chargés d'une bosse, que la queue en est recourbée en dessus, & divisée en une espéce de fourche, & qu'elle n'a que deux pouces de long. 120.1.

368. Une Pourpre aîlée semblable à la précédente, à cela près que les aîles en sont fort contournées, que celle du côté extérieur de la bouche en est fort large, & que la queue en

est à peine fourchue. 18.1.

369. Une Pourpre rameuse des Indes, à coque mince, blanche, chargée de six rangs de feuilles noires très-déchiquetées, & connue sous le nom de Rôtie *; elle est grande dans son es- * Arg. pt. pêce. 24". 3.

370. Deux Rôties en pendant, moins gran-

des que la précédente. 17."

371. Deux Pourpres rameuses des Indes, à zônes alternatives blanches & jaune-foncé, à fix rangs longitudinaux de petites feuilles brunes très-frisées, ce qui leur a fait donner le nom de Chicorée *. 5 2 !

372. Cinq Pourpres, dont trois rameuses, K. & deux épineuses; sçavoir, une rameuse brune, à fix côtes longitudinales, dont cinq chargées de très-petites seuilles, & la derniere, qui borde

Niv

* Thid lett

200 COQUILLES UNIVALVES

💻 la lévre extérieure, d'autres très-grandes, lar-VIII. FAM. ges & applaties à l'extrémité; ce qui a fait

nº. 13-16. Valent. uni-♥al. f. 37.

Pourpres. donner en France, à cette espéce, le nom de * Arg. pl. Patte de crapaud *, & en Hollande celui de séba, pl. 77. Bois de cerf; deux petites Pattes de crapaud, dont une canelle à côtes peu prononcées, & à deux rangs de longues feuilles, l'autre blan-* Valent. ib. che *, semblable du reste à la premiere; & deux

petites épineuses blanches nuées de fauve, à stries circulaires, & à fix côtes longitudinales un peu obliques, chargées d'épines peu longues, mais très-aigues, & à tête très-êlevée,

composée de neuf orbes. 38". 13.

373. Onze Pourpres de diverses grandeurs; sçavoir, la plus grande, rameuse d'Amérique, à coque mince fauve, à stries circulaires inégales, à fix côtes longitudinales chargées de feuilles grandes & petites marron, à sept orbes bombés, & à lévre intérieure teinte de couleur de rose; fix de la Méditerranée par pendans, fasciées de blanc & de marron, à stries fines circulaires, à côtes longitudinales tuberculeuses, garnies d'un appendice couché dans le même sens en forme d'écorce, & à couronne de tubercules, se prolongeant dans les second * Bonan. cl. & troisieme orbes *; une qui ne différe des troisieme & quatrieme de l'article 364, qu'en ce qu'elle a fix côtes longitudinales; elle loge

Bernard-l'Hermite: deux Chicorées, & une Rôtie.

3. f. 272. Gual, tab. 31 litt. C.

374. Une petite Pourpre épineuse des Indes, tres-rare, fond blanc, à stries circulaires de VIII. FAM. même, à huit côtes songitudinales obliques, POURPRES. noires, hérissées de longues pointes aigues de même couleur, qui régnent de la tête à la queue, à tête bombée, composée de cinq orbes, à clavicule blanche, espéce qu'on doit regarder comme une variété de celle que M. d'Argenville appelle Radix à feuillages noirs *, & qu'on *Arg.append. peut nommer le Radix à pointes noires. 150. pl. 2. lett. K.

375. Une grande Pourpre rameuse des Indes, rare, blanche, veinée & fasciée de couleur de rose, à bouche & grand umbilic aussi couleur de rose, de forme ventrue, à tête assez élevée, & à neuf rangs longitudinaux de feuilles plus ou moins grandes, repliées en pointe dans les deux premiers orbes. 28.



GENRE SECOND.

POURPRES A QUEUE PLUS ÉTROITE LONGUE ET DROITE.

VIII. FAM. chair, marbrée de noirâtre, de brun & de blanc, Pourpres. à strois grosses côtes longitudinales, & à trois rangs intermédiaires de petits tubercules, à bouche couleur de rose, & à très-longue queue, nommée Tête de bé-

* Arg. pl. casse *, très-grande dans son espèce, & de la 16. lett. B. plus belle conservation. 13."

377. Une grande Tête de bécasse, à queue moins longue que la précédente, & deux petites en pendant, blanches, nuées & tachées de sauve, à stries sines circulaires, à tête applatie, bordée d'une strie plus saillante, à clavicule en mammelon couleur de chair, & qui n'ont ni côtes, ni tubercules, comme l'espèce précédente. 7."

378. Idem. 9. 13.

379. Une Pourpre des Indes, blanche, veinée de fauve, à trois côtes longitudinales chargées, dans toute leur longueur, d'épines fines ou arrêtes, longues, pointues & recourbées, à queue longue, creusée intérieurement en canal,

espéce nommée en France la grande Bécasse épineuse *, & en Hollande l'Araignee; elle est VIII. FAM. grande & très-bien conservée. 72.2.

380. Une Bécasse épineuse, de même espèce, 16. lett A. séba, pl. 78. fauve-clair, moins grande que la précédente.

381. Une autre, gris-cendré, un peu moins


grande encore. 150#

382. Cinq Pourpres; sçavoir, quatre Bécasses épineuses, d'espèce moins rare que les précédentes, dont deux des Indes, grises, nuées de fauve, à épines moins nombreuses & moins longues, mais du reste semblables à celles de l'article 379 *; & deux d'Amérique, blanches, * List. tab. veinées de fauve, à épines plus courtes & plus 902. f. 21. groffes, à queue fourchue & recourbée dans nº.4. son milieu. La cinquieme est une grosse Tête de Bécasse de l'espéce déja décrite. 19.

383. Six Pourpres; scavoir, deux Têtes de Bécasse d'Amérique, l'une de moyenne grandeur, & fauve nué de verdâtre, l'autre petite & marron clair, toutes deux à robe réticulée, & à côtes un peu épineuses *; & quatre Bécasses épineuses comme celles de l'article pré- tab. cédent, à cela près que celles des Indes sont

blanches. 5.5.

384. Une grande Pourpre des Indes, rare, blanche, à stries circulaires légérement granuleuses, à fix côtes longitudinales un peu applaties ; chargées de deux rangs circulaires de



grandes épines, celles d'en-haut plus fortes, d'VIII. FAM. les autres moins, à deux rangs obliques de pe Pourreres. tites épines sur la queue, à tête applatie, & lévre intérieure saillante en dehors, espèce qu'o

* Séba, pl. nomme la grande Massue d'Hercule *. 160.15

385. Une Massue d'Hercule un peu plu grande que la précédente, mais à queue & épi

* Ibid.nº. 8. nes moins longues à proportion *. 48.1.

386. Sept Massues d'Hercule, dont six pa pendans; sçavoir, quatre de la Méditerranée fauves de diverses nuances, dissérentes des pré cédentes, en ce que la tête en est plus élevée qu'elles n'ont chacune qu'un rang d'épines su la queue, & qu'outre les deux rangs du premie orbe, elles en ont un troisseme sur les deux or

*Gualt. tab. bes suivans *; l'une d'elles conserve son oper-30. litt. F. Rumph. tab. cule; deux d'Amérique, peu communes, sau 26. n°.) ves, nuées de gris & de blanc, qui différen

de celles-ci, en ce qu'au lieu d'épines, else *Ibid. n°.4. n'ont que des tubercules terminés en pointes * & une petite de la Méditerranée, fauve & rare,

en ce qu'elle a sur le corps trois rangs d'épines, mais semblable du reste aux premieres de cet article.



NEUVIEME FAMILLE.

ON'NES OU CONQUES SPHÉRIQUES.

E sont des Coquilles à peu de volues, rarement tuberculeuses, de forme IX. FAM.
rès-renssée, à bouche large & évasée,
rdinairement dépourvue de dents, à
ête petite ou peu élevée, dont elles
ont même quelquesois entiérement
privées. Leur bouche est entière ou
schancrée, ou garnie d'une petite queue,
re qui nous fournit leur division en
trois genres, qui sont,

- 1º. Les Tonnes à bouche entiere.
- 2°. Les Tonnes à bouche échancrée.
- 3°. Les Tonnes à bouche garnie



GENRE PREMIER.

TONNES A BOUCHE ENTIERE.

387. ILUIT Tonnes par pendans; sçavoir, ix. Fam. fix différentes par leurs marbrures, mouchetures & nuances, à coque mince, de forme ovale, à bouche évasée vers le bas, & à tête creusée en dedans en spirale en forme d'umbilic, espéce en dedans en spirale en source en de forme encore plus séba, pl. 38. blanches nuées de fauve, de forme encore plus oblongue, à stries sines circulaires. & à bouche

oblongue, à stries fines circulaires, & à bouche fort évasée vers le bas, nommées Oublies ou Papier roulé, toutes deux grandes dans leur

* Bonan. cl. espèce *. 11.1.

3.f. 3...

1.if. tab. 714. 388. Dix Noix de mer de moyenne grandeur; sçavoir, deux blanches, de forme approchante de la sphérique, à stries circulaires
très-fines, à coque papyracée, & à bouche débordant les deux extrémités du corps, variété

* Arg. pl. nommée la Bulle d'eau *; deux Muscades mou-17. lett. Q. chetées l'une fauve & gris, l'autre fauve & séba, pl. 38. rouge - brun, & à deux petites zônes bleu-* Ibid. nº. foncé *; deux autres Muscades nuées & mou-

* 1bid. n°. de chair *; deux autres nuées d'olive, mar-

rées par bandes longitudinales de bleuâtre, e forme plus oblongue, & à bouche plus IX. FAM. troite que les précédentes *; & deux Oublies Tonnes. ouleur de paille. Plus, deux petites Tonnes 12. litt. F. papyracées, à larges zônes gris de lin, séparées fig. 3. altere, es unes des autres par de petits cercles noirs. 8."

389. Vingt-deux petites Tonnes, sçavoir, ine rare, blanche, fasciée par zônes de taches ouges quarré-long, à stries circulaires bien prononcées, à tête un peu élevée, à petite bouthe, & à lévre intérieure armée d'une dent; ine peu différente de la précédente, non moins rare, à cordons circulaires fort serrés, semés de petites taches quarrées alternativement blanches & noires, & à deux petites zônes blanches, espéce qui vient de l'Isle de France, où on la nomme Pistache *; Quatre Pistaches un peu plus petites, à taches blanches & grises 992. f. 54. moins marquées; deux Muscades rares, papyracées, à robe blanche, rayée de petits cercles ondés-bruns *; deux rares encore, aussi papyracées, à larges zônes alternatives blan- 38. R°. 49. ches & couleur de rose, séparées les unes des autres par de petits cercles bruns; quatre Bulles d'eau blanches papyracées *; fix Oublies blan- * Gualt. tab. ches papyracées *, & deux Muscades de la va- 13. litt. D. * Ibid. lit. E. riété des cinquieme & sixieme de l'article précédent. 23.19.

GENRE SECOND.

TONNES A BOUCHE ÉCHANCRÉE.

TONNES.

390. LUX très-grandes Tonnes couleur de noisette, umbiliquées, à tête peu élevée, à lévre extérieure unie & mince, & à pas des orbes creusés en forme de fillon, dont une à grosses & petites fascies circulaires, celles-ci placées dans les cannelures de celles-là; & l'autre à grandes cannelures sans petites fascies in-* Gualt. tab. termédiaires *. 9.

42. litt. A.

391. Deux autres moins grandes, dont une rare, fauve, à petites cannelures, & à larges fascies, tachées par chevrons quelquesois en zig-zag de blanc, de gris & de marron de diverses nuances *; & une comme la premiere

* Séba, les deux grandes de l'article précédent, à la lévre extérieure Coq. de l'anprès, qui est bordée d'une espéce d'excrescence gle gauche du haut de la tuilée. 15. pl. 69.

392. Trois autres un peu moins grandes; sçavoir, deux en pendant de l'espéce de celles de l'article 390; & une blanche *, à larges can-

* Ibid. les nelures, & à fascies ornées de taches fauves deux grandes Coq. au def- quarrées, également distantes les unes des aufous de celles tres. 9.2?


citées dans la 393. Quatre autres par pendans; sçavoir, pl. 69. .. deux

deux à fascies peu larges, fauves, & à larges cannelures blanches; & deux fauves à sascies IX. FAM. larges & applaties, à cannelures étroites, um-Tonnes. biliquées, & de l'espèce nommée Perdrix *, * Arg. pl. dont une à taches blanches uniformes sur toutes les sascies, & une autre plus rare à cinq lett. F. zônes intermédiaires, où ces taches sont disposées par intervalles beaucoup plus larges. 13.

394, Quatre Tonnes; sçavoir, une blanche tachée de sauve de l'espéce de la premiere de l'article 391; une comme la derniere de l'article 392, mais à cannelures plus larges, chargées chacune de trois stries; & deux Perdrix de la variété de la premiere de l'article précédent.

395. Trois jolies Tonnes; sçavoir, une toute blanche, à fascies disposées comme dans la premiere de l'article 390, mais dissérente en ce qu'elle est à tête plus élevée, à clavicule marron, à lévre extérieure retroussée en bourrelet, & chargée en-dessous de plusieurs paires de dents; une qui ne dissére de la précédente que par ses cannelures simples & par cinq larges zônes sauves qui se perdent à quelque dissance de la lévre extérieure; & une qui dissére de la dernière de l'article 392, en ce que sa lévre extérieure est un peu retroussée & dentelée. 24"...

396. Huit petires Tonnes par pendans ; sçavoir, deux blanches marbrées de jaune-pâle & Tome I.



IX. FAM. dies, à cannelures peu profondes, à lévre ex-Tonnes. térieure faillante & convexe en dehors, & ar-

* Arg. pl. mée, ainsi que l'intérieure, de grosses dents *;
47. lets L.
Gual. tab. 51. deux Perdrix, dont une fauve soncé, à petites
litt. C.
* Séba, la taches grises *, & l'autre entiérement blanche;
Coquille du deux comme les premieres de l'article 393,
milieu du bas

milieu du bas de la pl. 69. mais de couleurs moins vives, & deux comme * Arg. pl. la derniere de l'article précédent * 3. 8.

397. Deux très-grandes Tonnes en pendant, à robe lisse, canelle, à tête applatie, dont les trois premiers orbes, à pas concaves, sont couronnés de clouds tuilés, & les trois derniers saillent de la couronne intérieure en sorme de mammelon, à bouche sort évasée, espèce nommée en Hollande Gondole mammillaire, & en

* Séba, pl. France Couronne d' Ethiopie *. 38." 1.

Gualt. tab.29 grandes & de couleur un peu plus foncée que les précédentes, & à deux rangs seulement de

* seba, pl. spires couronnées *. 34.

17. lett. C.

dant, & peu communes; elles différent de l'espéce précédente, en ce qu'elles font marbrées par grandes taches blanc de lait & canelle foncé, flottautes dans deux larges zônes; elles ont deux rangs de spires couronnées comme

* séba, pl. celles de l'article précédent *. 160.6.

fauves, à taches brunes disposées en deux zônes, & à une seule spire couronnée *. 12.

401. Cinq petites Tonnes; sçavoir, trois Tonnes. Couronnes d'Ethiopie, dont une canelle à large 65. 10. 10. zône du milieu moins foncée, & à une seule f. 4. spire couronnée *; une à zône blanche nuée de fauve, & la troisieme marbrée de blanc & de 17. lett. F. marron; ces deux dernieres ont un gros mammelon & un commencement de couronne; une rare, paille nué de jonquille, qui ne différe des Couronnes d'Ethiopie, qu'en ce qu'elle est plus oblongue, plus mince, sans couronne, & que le mammelon, qui en est plus gros, y est formé d'un seul orbe, variété qu'on nomme Prépuce, & un Prépuce qui ne différe du précédent qu'en ce que le pas de sa spirale en est un peu concave *. 14."

402. Deux Gondoles mammillaires très-ra-66. nº. 13 80 res, en pendant, à robe marron-clair, marbrée dans trois zônes, & par chevrons, de taches blanches, à fix révolutions de spire, se recouvrant l'une l'autre, & dont les cinq dernieres composent un mammelon fort élevé, peu

différent de la clavicule du Prépuce *. 200. 403. Une grande Gondole mammillaire peu 3. f. 10:

commune, couleur de tuile, à trois rangs de larges taches brunes, disposées par zônes, de forme très renflée, & à mammelon peu sail-

lant * 24"

* Séba; pl.

* Lift. tab:

799. nº. 6. Séba, pl. 64 10. 5 86 6a

Oij

IX. FAM. millaire fauve-roux foncé, à quatre orbes, dont Tonnes. les premiers font féparés par un fillon très* Séba, pl. profond *; une fans mammelon, veinée de blanc, de fauve & de gris de lin, à extrémité de la lévre un peu finueuse vers le haut, nom* Ibid. pl. 65, mée Tasse de Neptune *; une blanche à pas du premier orbe faillant en dehors en vive arrête, concave en-dessus, & à très-petit mammelon, espèce qu'on nomme à Paris Chiller de Nep* Ibid. no. tune *, & une Couronne d'Ethiopie de la variété de celles de l'article 398. 24. 8.

de biche, fans mammelon & même fans tête, mais dans le sommet desquelles un prolongement de la lévre extérieure se replie sur l'intérieure, & y forme une espéce de petit umbi
* List. tab. lic *. On a enlevé une portion du dessous d'une de ces Gondoles, pour en faire voir le dedans.

406. Une Harpe très rare, marbrée par zônes inégales, de rouge pâle tirant fur l'aurore, de brun & de blanc, à un grand nombre de côtes longitudinales laissant entr'elles des cannelures très-profondes; ces côtes se prolongent vers le haut dans tous les orbes, formant au bord du premier, qui est un peu concave, une espèce de couronne de petits tubercules, & se terminant vers le bas à un bourrelet qui

naît de la levre intérieure : on nomme cette espèce Harpe noble *, 71.19!

407. Deux grandes Harpes peu communes Arg. Apo en pendant, à quinze côtes étroites, rayées de pend. pl. 24 traits en zig-zag blancs & bruns, placées à diftances égales, & laissant entr'elles de larges cannelures petit gris: c'est la belle Harpe, ou le Harpa nobilis de M. d'Argenville *. 22. 4. Arg. p. 17, lett. D.

408. Deux autres Harpes en pendant, à quatorze côtes plus larges & plus inclinées que celles des précédentes, marbrées, ainsi que les cannelures, de traits ou chevrons couleur de rose, fauves, blancs & marron, à large zône intermédiaire un peu plus soncée, & à deux grandes taches brunes en-dessous *.10.5.

409. Deux autres, l'une à douze, l'autre à 70.
Bonan. cl. 3.
treize côtes inégales; elles différent d'ailleurs f. 185.
des précédentes, l'une par ses couleurs moins
foncées, l'autre par des chevrons plus nombreux, placés les uns près des autres en zigzag, & par des stries longitudinales mieux prononcées. 6.

410. Neuf Harpes, dont fix très-variées par leurs marbrures & leurs couleurs; une de l'espéce de celles de l'article 407, & deux dont on a enlevé les cannelures & conservé les côtes, ce qui met leur columelle à découvert, g.*

411. Six Tonnes par pendans; sçavoir, deux grises à stries circulaires, à grand nombre de

Q iij

fascies étroites, sormées de petits quarrés longs alternativement blancs & violet foncé, à large IX. FAM, TONNES. bouche & à lévre intérieure tirant sur l'aurore, espèce qu'on nomme en Hollande le Rodolphe, & en France Conque Perfique ou Pourpre de *Arg. pl. 17. Panama *; deux grifes à stries fines circulaires, Gualt. tab. 51. & groffes fascies chargées vers le haut de tuberséba, pl. 72. cules, ressemblantes d'ailleurs à la Conque Per-*Gualt. tab. fique, & à bouche aurore-vif *; & deux autres 51. litt. A. de même espéce, couronnées de plus gros tubercules, & dont la tête est recouverte de F. 48, glands de mer. 21." 412. Deux très-grandes Conques Perfiques, polies, de la variété des deux premieres de l'article précédent, & d'un très-grand éclat.35.11. 413. Treize Tonnes, dont douze par pendans; scavoir, deux orangées, marbrées par zônes inégales de blanc, à stries circulaires un peu rabotteuses, de forme oblongue, & à tête * seha, pl. presque conique * ; quatre Conques Persiques d'Amérique, dont deux grandes & deux petites 13. lett. T. à fascies tuberculeuses violettes plus nombreuses, à robe un peu marbrée de blanc, & à bouche de même couleur que le fond : c'est la Mûre

che de même couleur que le fond: c'est la Mure

*Arg, pl. 17. de M. d'Argenville *; deux à fascies légére
lett H.

List tab. 989.

f. 49.

nativement blanches & marron, & à bouche

* séba, pl. orangé *; deux de la variété des premieres de

rieme du même article, mais à fascies tuberculeuses plus prononcées *; & une petite fort IX. FAM. jolie, dont les marbrures blanches, noires & TONNES. jaunes imitent le point d'Hongrie. 30. 1. 52. nº. 13 85

414. Onze Tonnes, dont dix par pendans & des espéces ci-dessus décrites; sçavoir, deux grandes Oublies, deux Prépuces de la variété du dernier de l'article 401; deux d'une autre variété plus renssée*, desquelles on a enlevé une * List table portion de la base, pour en faire voir la colu-736. f. 3. melle; une Cuiller de Neptune, deux grandes Harpes, & deux Conques Persiques qui ne différent des premieres de l'article 411, que par de petites fascies blanches moins interrompues de taches violettes *. 2"3!

* Séba, pl. #2. 11 . II.



GENRE TROISIEME.

TONNES A BOUCHE GARNIE D'UNE PETITE QUEUE.

IX. FAM. ches nuées de couleur de chair, à robe réticu-Tonnes. lée, à tête applatie & de forme un peu allongée,

*Gualt tab. nommées Figues blanches *; & une blanche 26. litt. M. Séba, pl. 68. nuée de jaune, à stries circulaires qui ne sont 20. 1-4. bien prononcées que vers la queue, qui est étroite & un peu contournée, à coque mince, renssée de corps, umbiliquée, & à tête platte,

* Arg. pl.17. espèce nommée le Radix * . 24. 5!

deux fauve-clair nué de gris, à stries circulaires, dont trois plus grosses & tuberculeuses, à tête un peu élevée, à pas applatis couronnés de tubercules, & séparés par un petit sillon, à co-

List tab. que épaisse umbiliquée *, & qu'on peut regarder comme une autre espéce de Radix; & deux Figues blanches plus grandes que les précédentes. 12.

417. Trois Tonnes; sçavoir, deux Figues bariolées de gris, de jaune-pâle & de brun, à quatre zônes plus blanches, à rézeau très-sin & très-serré, & à bouche violette, ce qui les a

fait nommer Figues violettes *; & un Radix à coque mince de l'espéce de celui de l'article IX. FAM. 415. 22.

418. Un beau Radix plus grand que les pré- 17. lett. O cédens, à stries fines circulaires s'étendant sur no se toute sa robe, & à queue couleur de rose. 75. 2.

419. Trois Figues; sçavoir, deux peu communes; à coque plus épaisse & à queue plus longue que les précédentes, dont une blanche nuée & flambée de jaune, à stries fines circulaires, à pas applatis, bordés d'un cordon denrelé, & séparés par un sillon; une qui ne différe de la précédente que par ses flammes plus foncées, & par ses pas un peu moins applatis, dépourvus du bord dentelé *; & une qui différe de celles de l'article 417, en ce qu'elle 19 & 20, est à bouche blanche, à rézeau mieux prononcé, à robe grise nuée de jaune, & marbrée par grandes taches de brun-roux. 6. 12.



DIXIEME FAMILLE.

VIS.

X. FAM. grand nombre de spirales, de sorme conique très essilée, à bouche petite, oblongue ou arrondie, & à tête sort élevée. Elles sont ou lisses, ou suberculeuses, & se divisent ainsi naturellement en trois genres, qui sont:

- 1°. Les Vis lisses.
- 2 . Les Vis striées.
- 3°. Les Vis tuberculeuses.



GENRE PREMIER.

VIS LISSES.

420. LEUX grandes & belles Vis, fond blanc, à zônes obliques suivant la spire, à rai- X. FAM. son de deux par chaque révolution, & formées de taches brunes nuées de rougeâtre, inégales entr'elles, qui représentent quelquesois des caracteres, à bouche un peu oblongue & échancrée, espéce qu'on peut nommer Vis à caracteres * : c'est le Cloud de M. d'Argenville. 9 11. * Gualt. tabe

421. Deux très-belles Vis à caracteres de 56. litt. I. grandeur moyenne, & semblables aux précé-n°.6.

Arg. pl. 116 dentes, à cela près que les taches de chaque lett. A. révolution de spire y représentent des caracteres mieux formés. 30". 1.

422. Deux très-belles Vis de forme fort effilée; scavoir, une trés-grande à vingt-deux révolutions de spire, blanche, à deux rangs de taches brunes sur chaque révolution *; & une moins grande & moins effilée qui en différe en- Gualt. rab. 16. core en ce que chaque révolution de spire s'y litt. B. amincit dans le tiers le plus élevé de sa hauteur, & est chargée de trois zônes de taches, toutes deux de l'espèce nom-mée Vis tigrées *. 10.2. * séba, pt

423. Deux très-belles Vis peu communes, 56. no. 27.

X. FAM. VIS.

* Rumph. tab.30. litt.D. Séba, pl. 56. n. 11.

de couleur fauve, à dix-sept révolutions de fpire, dont la moitié supérieure est un peu ren flée & chargée d'une zône de taches blanches h. rondes dans l'une, ovales dans l'autre *.6."

424. Quatre Vis; fçavoir, deux rares cou leur de chair, à dix-fept révolutions de spire flambées de traits longitudinaux blancs, except dans la partie supérieure qui est un peu rentrante, & forme une espéce de ruban de la couleur du fond; & deux Vis tigrées de la variété de la premiere de l'article 422. 8.1.

425. Six Vis par pendans, dont deux de l'est péce des deux premieres de l'article précédent deux à caraîteres, & deux tigrées. 12.5.

426. Quinze Vis de moyenne grandeur & petites; sçavoir, quatre, dont deux blanches. l'une fasciée en zig-zag, & l'autre ponctuée de canelle, & deux bariolées de blanc, de fauve & de brun, toutes de forme un peu cylindrique, à bouche très-oblongue, & s'élargissant vers le bas, espèce nommée la Tarriere ou l'Ai-

*Arg. pl. 11. guille à coudre *; une blanche ponctuée de calett. G.
Lift. tab. 738. nelle dans le bas de chaque révolution, & de f. 30 & 31.

* Arg. pl. forme effilée, nommée le Poinçon *; une enri. lett. Q.

core plus effilée, à lignes longitudinales oran-

*Ibid.let. z. gées, nommée l'Alène *; deux blanches à une large zône bleu-foncé, quelquefois interrompue,

* 5664, pl. régnant vers le haut de chaque révolution de 56. n° . 35 & spire * ; une à révolutions de spire un peu ren-

lées vers le haut, où elles sont pointillées de marron, & à taches longitudinales de même X. FAM. couleur dans la partie rentrante des spires qui, avec les points supérieurs, imitent les caracteres Hébraiques; deux tigrées, deux à caracteres, & deux de l'espéce des premieres de l'art. 424.

GENRE SECOND.

VISSTRIÉES.

127. VINGT-QUATRE Vis strices; sçavoir, deux marbrées de gris & de lilas, à douze orbes bombés diminuant proportionnellement, & chargés chacun de petits bourrelets longitudinaux qui se raccordent & tiennent ensemble d'un orbe à l'autre, comme dans la Scalata, sans cependant laisser de jour entr'eux, comme dans celle-là *, à laquelle ces Vis ressemblent * voy. Parts d'ailleurs, ce qui les a fait nommer fausses Sca- 15 des Coq. de notre Catalolata*; deux fausses Scalata blanches de nos gue. * Bonan cle mers *; deux autres petites d'Amérique, lie de 3. f. 111. vin obscur; une autre aussi d'Amérique, grise 588. f. 51. nuée de blanc, & à stries plus en vive arrête que celles des précédentes; une plus petite, blanche, à moins de révolutions, & fort ventrue; deux fausses Scalata de l'espèce des secondes de cet article, à orbes découpés, &

X. FAM. VIS.

dont il ne reste plus que les stries, ce qui permet d'en voir l'intérieur; & quatorze Vis par pendans, de l'espèce nommée Enfant au maillot, dont deux rares d'Amérique, blancs, de forme cylindrique & bombée, à stries en forme de rides sur le premier orbe seulement, à bouche garnie de deux dents, à lévre extérieure retroussée en dehors, umbiliqués, & grands dans cette espéce; deux rares de forme courte & renslée, & à bouche dépourvue de dents; deux de forme un peu plus allongée, à bouche * Lift. tab. garnie de deux dents 1; deux encore plus 1 bid f. 48. longs 2; deux à stries plus nombreuses & moins

19. nº. 21.

⁵ Ibid. f. 49. prononcées ³; deux de nos mers ⁴; & deux rares des Indes, lisses & blancs, à trois larges bandes bleues, à bouche dépourvue de dents. & qu'on nomme plus particuliérement Vis à tête tronquée. 15:10.

428. Une Vis des Indes, marron - brun, à stries circulaires bien prononcées, à stries longitudinales fines en forme de rides, & à base presque platte, espéce nommée en Hollande la Bouée, en France le Télescope, & grande dans 5 Arg. pl. ir. cette espèce 5. 15.1!

lett. B. Séba, pl. 50. nº. 1-4.

429. Une Vis des Indes, brune nuée de fauve & de verdâtre, à révolutions de spire chargées chacune de trois stries circulaires & de plis longitudinaux qui les rendent onduleuses, à lévre extérieure fort évalée & un peu retroussée en

dehors, espèce nommée à Paris la Cuiller à pot: celle-ci porte cinq pouces de long, & est d'une X. DAM. belle conservation *. 66.2!

430. Une autre Cuiller à pot un peu moins so. nº. 13 & grande que la précédente. 10.1.

431. Un Télescope, & une Cuiller à pot de

moyenne grandeur. 18.

432. Une très-belle Aiguille des Indes de olus d'un demi-pied de long, marron s'éclaircissant de plus en plus depuis le bas jusqu'à la clavicule qui est blanche, à trente-quatre orbes bombés, chargés chacun de six stries séparées par de profondes cannelures, & à bouche presjue ronde, nommée par Séba Aiguille faite en is de tambour * . 38 4.4!

* Ibid. pl. 563 433. Deux Aiguilles en pendant de l'espéce no. 12. Gualt. tab. 58. le la précédente, mais de forme moins allon-litt. A. rée, de couleur fauve, & de vingt-trois orbes lett. D.

eulement, 74"1.

434. Une grande Vis blanche nuée de fauve, orbes chargés de stries circulaires très-fines, x de trois plus marquées, dont une très-sailante en vive arrête, à pas des orbes formant vec leurs voisins des angles rentrans, & à ouche semblable à celle des précédentes, espéce que l'on connoît sous le nom de Vis de restoir*. 6".

435. Deux Vis de pressoir en pendant, moins 18. litt. B.

grandes que la précédente, & qui en différent

COQUILLES UNIVALVES s d'ailleurs, en ce qu'au-dessus de la grande ar X. FAM. rête qui forme la sommité de chaque orbe; of y en remarque une seconde un peu moins forte

Gualt, tab. 58. litt. C.

VIS.

· laiffant entr'elle & l'autre une large canne * Arg. pl. 11. lure * .: 5." 436. Treize Vis, dont douze par pendans sçavoir, deux peu communes, & grandes dans leur espéce, nuées de blanc, de fauve & de bleu, à bouche oblongue, à révolutions de spires séparées chacune en deux par un fillor

vers les deux tiers de leur hauteur, & chargée

de cannelures longitudinales très-ferrées *; deux * Ibid. tab. marbrées de brun, de blanc & de fauve-roux 57. litt. N. Lift. tab. 837. à stries circulaires grosses & fines, à révolution £. 64.

4 Gualt. tab. 58. litt. E. Séba, pl. 56.

de spires applaties & séparées par un léger sil lon, à bouche presque ronde, & grandes dans leur espéce *; deux de sorme à peu près semblable, à dix retours de spire, chargés chacur mo. 33 & 34. de trois cordelettes noires, séparées par des cannelures blanches; deux blanches de la variété de celles de l'article 433; deux petites grises de la même espéce; deux grises nuées de fauve, qui n'en différent que par des stries plus * Lift tab, groffes au haut de chaque orbe *; & une Vis

191. fig. 56. de pressoir de la variété de l'article 434, 6 2

437. Vingt Vis de différentes grandeurs, dont seize par pendans; sçavoir, deux Aiguilles peu communes, à taches quarré-long, alternativement rouges & incarnates, à stries circu-

laires

laires traversées de hachures longitudinales qui les rendent granuleuses, & à révolutions de spire, bordées chacune, tant en haut qu'en bas, d'une espèce de bourrelet *; quatre autres pe- *Rumph.tabi tites fond bleu ou verd de pavot, à révolutions de spire, chargées de stries longitudinales, & bordées dans le haut d'une zône blanche ponctuée de rouge-brun, espèce nommée le Perçoir ou le Foret *; deux couleur de chair, tachées *Arg. pl. 11. par zônes d'aurore; elles différent des précé-lett. R. List. tab. 978 dentes par leurs stries moins prononcées, & f.36. par leur bordure de même fond que le reste; une de même espèce, dont les stries ne sont fensibles que vers la têre; deux à robe réticulée, jurore nuée de blanc ; une couleur de chair de 'espéce des premieres de l'article précédent leux de l'espéce des troisseme & quatrieme du nême article, mais à stries circulaires plus sines; deux de même forme, blanc-fale, marbrées var traits longitudinaux de fauve-roux, à stries irculaires très-fines, & à deux grosses paralleles ntr'elles sur chaque orbe *; une blanche de la ariété de celles de l'article 433; deux petites 592. f. 604 le la même espéce, fauve teint de gris de lin, k une Vis de pressoir. 5 10!

* Ibid. tab.

Tome I.

P

GENRE TROISIÉME.

VIS TUBERCULEUSES.

VIS.

438. UATRE grandes Vis des Indes par pendans; sçavoir, deux blanches bariolées de rouge & de bleu foncé, à stries circulaires, à douze orbes chargés de gros tubercules à lévre extérieure épaisse & dentelée, & à pe-* Gualt. tab. tite queue *; & deux qui ne différent de celles ci qu'en ce que la lévre extérieure en est mince 18. 87. recourbée en dedans & sans dentelures. 9.

57. litt. G. Lift. tab. 1023. fig. 87. nº. 15 & 16.

439. Cinq Vis, dont quatre par pendans sçavoir, deux blanches tachées & pointillée de brun, à orbes garnis d'un rang de tubercules, à lévre extérieure épaisse, & à petite queue retroussée, espéce que l'on nomme Chenille ban *Arg. pl. 11. riolée *; deux gris-de-fer, chargées de deux rangs de tubercules, l'un sur le milieu de chaque orbe, l'autre vers le haut, à lévre extérieure

lett. H. Séba, pl. 50. n°. 37. moins épaisse, & petite queue moins retroussée

que les précédentes, espèce nommée Chenille *Gualt, pl. noire *; & une comme les premieres de l'arti-Bonan. cl. 3. cle précédent. 6.1.

56. lett. L. fig. 82.

440. Quatorze jolies Vis de moyenne grandeur par pendans; sçavoir, deux marron-brun, à révolutions de spire, formées de cordons grauleux d'inégale groffeur, & nommées le Cloher ou l'Obélisque Chinois *; une qui différe X. FAM. les précédentes, en ce que le haut de chaque Vis. rbe est couronné de tubercules blancs, & le lett. F. nilieu ceint de deux stries granuleuses fauves, spéce qu'on nomme l'If*; un If marron-brun *Ibid.let.&c. n entier; deux Vis peu communes, marron, une clair, l'autre plus brun, à côtes longituinales, & à stries circulaires quelquefois grauleuses, à bouche presque ronde, à lévre exérieure renflée, très-saillante en dehors, & se epliant sur l'intérieure en avant de la petite ueue qu'elle ferme en tuyau, ce qui la rend rès-singuliere *; deux autres non moins rares, *Rumph.tab. auve-noirâtre, réticulées, à huit orbes bom- 30. litt. T. és, à bouche ronde échancrée, à lévre extéieure relevée en dehors en bourrelet, & à claicule tronquée; deux blanches réticulées & ranuleuses dans les angles du rézeau, à bouhe ovale finissant par une petite queue retrousée, espéce qu'on peut nommer Chenille blanhe réticulée*; deux fauve-grifatre, à stries cirulaires granuleuses, & nommées Chenilles gra- 1020. f. 84. uleuses*; & deux Chenilles bariolees. 12"1.

441. Neuf Vis de moyenne grandeur, peu 1018. f. 80. ommunes; scavoir, une fauve, à douze orbes ormés chacun de quatre rangs de stries grauleuses, à six côtes longitudinales granuleuses ussi, qui en rendent la forme approchante de


* Ibib. tab,

X. FAM. VIS.

ceile d'une pyramide hexagone, à une couronne de tubercules plats sur le premier orbe, à bouche ronde & à lévre extérieure fort saillante, espéce nommée le Clocher Gothique: on en trouve l'analogue fossile à Courtagnon; un Clocher, verd-clair, à stries circulaires très-fines, à révolutions de spire, chargées chacune de huit gros bossages; à bouche ovale, & à lévre extérieure mince; deux blancs, tachés par zônes inégales de marron clair, à dix orbes bordés dans leur milieu de tubercules aigus, & séparés les uns des autres par de larges pas en doucine, de forme conique vers le bas, à bouche oblongue, & à lévre extérieure mince, échancrée vers le haut ; une Vis marbrée de marron, de blanc & de bleu clair, à côtes longitudinales, & stries fines transversales formant un rézeau, à bouche oblongue, à lévre extérieure échancrée en haut & en bas, & dentelée; trois blanches, dont une marbrée de fauve, à stries circulaires, à dix orbes tuberculeux, & à bouche semblable à celle de la premiere de cet article; & une blanche à stries circulaires granuleuses, à neuf révolutions de spire, concaves vers leur milieu, & bordées vers le haut de cercles tuberculeux plats, à un rang de petites côtes longitudinales sur le premier orbe, à lévre extérieure échancrée vers le haut, & à umbilic. 19.

442. Neuf Vis peu communes, dont huit par pendans; sçavoir, deux blanches à quinze ré- X. FAM. olutions de spire, couronnées de plis longitulinaux peu faillans, à bouche oblongue finissant ar une petite queue retroussée, grandes dans eur espéce, & nommées Chenilles blanches *; * Arg. pl. 12. eux fond blanc, à révolutions de spire, tachées Gualt. tab. ers le bas de couleur de chair, entre deux cer- 17. litt. D. les ponctués de même, & couronnés vers le F. 83. aut de petits tubercules, à bouche oblongue. t échancrée dans le bas *; deux d'Amérique, * séba, pl. lanches, à vingt retours de spire concaves, 56. n° 9 & 104 hargées dans leur milieu de feuilles inclinées. ordées en haut & en bas d'une cordelette, & parées par un sillon, à bouche presque ronde, qu'on peut nommer Vis feuilletées; deux Vis uilletées blanches, tachées & fasciées de fauveux; & une blanc de lait, très-rare, assez semable de forme aux précédentes, dont elle difre en ce qu'on apperçoit, au lieu de feuilles. is enfoncemens irréguliers qu'on croiroit faits coups de marteau, ce qui lui peut faire donr le nom de Martelée * . 7. * Lift, tah. 443. Quatorze Vis, dont dix par pendans; 589. f. 53. avoir, deux Chenilles granuleuses blanches, ées & tachetées de brun-roux, & à stries cirlaires très-fines entre les stries granuleuses *; e marron obscur, de forme effilée, à révolu-51. nº. 26, ns de spire, composées chacune de trois petits

Piij



ONZIEME FAMILLE.

VOLUTES.

Nous rangeons sous ce nom toutes les Coquilles dont les spires compri- XI. FAM. mées & roulées les unes sur les autres, se terminent d'un côté en une tête applatie ou peu élevée, & forment de l'autre tantôt une pyramide plus ou moins conique, ce qui constitue le genre des Cornets, & tantôt une espéce de cylindre, ce qui constitue celui des Rouleaux. Toutes ont une bouche étroite & longue; mais, dans les Rouleaux, la lévre intérieure est ou cachée en dedans comme celle des Cornets, cas où nous les appellerons simplement Rouleaux, ou cette lévre se montre en dehors, & est alors garnie de dents avec une échancrure vers le bas, ce qui caractérise les Rouleaux proprement dits, appellés Olives. Nos trois genres de Volutes font donc,

P iv

XI. FAM. NOLUTES. nets.

- 20. Les Volutes cylindriques, ou Rouleaux.
- 3°. Les Volutes échancrées, ou Olives.

GENRE PREMIER.

VOLUTES CONIQUES, OU CORNETS.

444. UN Cornet des Indes, très-rare, blanc nué de couleur de rose, à deux larges zônes orangées, & à grand nombre de petites du fond, tachetées de rouge-brun, à stries fines, à tête élevée, & à pas un peu concaves, connu sous le nom d'Amiral d'Orange, & grand dans

* Arg. Ap- fon espèce *. 48"1.

Rumph. tab. leurs plus foncées, de forme plus oblongue, & séba, pl. 48. à pas moins concaves que le précédent. 120.

446. Un Cornet matbré de larmes blanches sur un sond rouge-brun, & à trois larges zônes jaunes, dont une sur le haut du corps, l'autre en bas, & la troisseme au milieu; celle-ci est divisée en deux par une bandelette de la mar-

brure du fond : on nomme cette Coquille l'Amiral *. 72".1!

447. Un Amiral de même espéce que le pré- VOLUTES. cédent. 36.

XI. FAM.

448. Un Amiral de même fond & marbrure, no. 5. & à trois larges zônes jaunes comme le précédent; il en différe seulement en ce que celle l'en haut est suivie d'une autre petite zône de même couleur, & que celle du milieu est chargée de deux bandelettes, dont une de la marbrure du fond, & l'autre formée de fimples raits bruns, ce qui met cette Coquille dans 'espéce de celles qu'on nomme Amiraux à deux bandes * . 30. 2

* Ibid. n. 44

449. Un Cornet de même fond & marbrure que les précédens, qui ne différe de l'Amiral de l'article 446, qu'en ce que la zône du milieu n'y est point chargée d'une bandelette : on le nomme Vice-Amiral *. 30.5!


* Arg. pl. 120

450. Un Vice-Amiral de même espéce, mais lett. H.

à taches blanches plus grandes. Soil

451. Un Cornet des Indes, rare, de même fond & marbrure que les précédens, mais différent en ce qu'on n'y remarque que la zône jaune du bas, & un léger vestige de celle du milieu, ce qui pourroi ele faire nommer Amiral masqué. 36.2.

451. bis. Un très-beau Cornet des Indes, rare, peu différent des précédens pour le fond & la marbrure, mais d'un volume beaucoup plus



457. Idem, à cela près que les zônes en sont plus multipliées. 1301!

458. Quatre jolis petits Cornets par pendans; scavoir, deux blancs, à deux zônes formées d'un réseau canelle très-fin, l'une large, située au haut du corps, & l'autre étroite, placée un peu au-dessous du milieu *; & deux Aîles * Arg. pl. 126 de Papillon. 13. 6!

List. tab. 588.

459. Deux Cornets rares, à tête élevée, dont f. 41. un marron clair, ma bré vers le haut par bandes longitudinales peu régulieres de blanc, & à une zône blanche ponctuée dans son milieu de même couleur que le fond, ce qui le peut faire ranger parmi les Amiraux; & un marron marbré par flammes longitudinales étroites de blanc, à petites fascies circulaires, dont les cannelures sont piquetées de très-petits trous. 16.2!

460. Quatre jolis Cornets par pendans; sçavoir, deux peu communs, à tête élevée, à robe marron clair tirant sur le roux, marbrée de taches blanches nuées de bleu, & à deux zônes de même couleur, chargées de traits en zig-zag du fond, espéce nommée par quelques - uns faux Amiral de Guinée; & deux à pas des orbes un peu concaves, à clavicule élevée & aiguë, à robe fasciée de trois zônes blanches, & de deux plus larges, intermédiaires, canelle, chargées les unes & les autres de bandes longitudi-

nales ondées pourpre foncé, & nommées Flam-XI. FAM. boyantes *. 6. 8: VOLUTES.

Arg. pl. 12. lett. T. lin. G.

461. Quatre autres des mêmes espéces; fca-Gualt, tab. 20. Voir, deux faux Amiraux de Guinée, à tête un peu moins élevée, & à taches plus blanches; & deux Flamboyantes à bandes longitudinales plus fines, & à zônes moins larges que les pré-

cédentes. q. 6:

462. Quatre autres des mêmes espéces; sçavoir, deux faux Amiraux de Guinée, dont un comme ceux de l'article 460, & un qui en différe en ce que le bleu domine davantage dans sa robe, qui est fasciée de deux larges zônes marron clair, marbrées du fond, & d'une petite zone blanche intermédiaire, toutes ponctuées de marron dans les parties de la robe, qui ne sont point de cette couleur; & deux grandes. Flamboyantes, à zônes brunes plus larges à proportion que celles des précédentes. 6.1?


463. Six Cornets des Indes par pendans, tous à tête élevée; fçavoir, deux peu communs, blancs marbrés de taches souci en sorme de nuages, à cercles légérement granuleux vers * Séba, pl. le bas, & à spirale de dix orbes tuberculeux *; deux de forme à peu près semblable, fasciés & tachetés de blanc, de verd de terrasse, & de rouge foncé, avec quelques cercles rougeâtres presque imperceptibles; & deux Flamboyantes

à zônes brunes comme les précédentes, mais dont les zônes blanches, sur-tout celle du mi- XI, FAM. lieu, ont un ou deux rangs de points bruns Volutis. plus ou moins distans les uns des autres. 9.13.

464. Quatre Cornets rares des Indes & à tête élevée; sçavoir, un blanc à grosses stries & profondes cannelures circulaires, chargées vers le haut de stries onduleuses très-fines, & à dix orbes, dont les pas sont un peu renssés, formant une seconde variété de l'espèce nommée Bout de Chandelle; deux blancs à deux zônes jaunes interrompues, dont celle d'en haut beaucoup plus large, à un grand nombre de cercles granuleux, & à dix orbes tuberculeux, nommés la Peau de chagrin *; & un à zônes alternatives mégales en largeur, les unes blanches, bariolées de rouge foncé & de bleu pâle, les autres vertes. chargées de quelques cercles légérement granuleux. 6.10!

465. Six Cornets des Indes par pendans; scavoir, deux peu communs, blancs nués de bleu, à trois rangs de petites taches longitudinales vertes ondées, ponctués par zônes de marron clair, & a tête peu haute, mais dont s'éleve une clavicule très-fine *; deux blancs, *Rumph. à deux zônes fauve clair, à stries fines & larges séba, pl. 43. cannelures circulaires, & à bas du corps violet; n°. 32. & deux Flamboyantes. 10. 1.

466. Six autres par pendans; sçavoir, deux



blancs à gros traits longitudinaux en zig-zag XI FAM. orangés, se réunissant quelquesois, & formant Volutes. des espéces de caracteres bizarres, à fillons cir-

* List. tab. culaires peu prononcés, & à coque très-mince *; 783. f. 30.
Rumph. tab. deux de l'espèce des deux premiers de l'article précédent, mais un peu différens pour les couleurs; & deux Flan boyantes, des zônes de l'une desquelles la moitié de dessus est rouge-brun,

& celle de dessous jaune. y. 15!

467. Six autres par pendans; sçavoir, deux orangés, à deux zônes, l'une de taches blanches dans le haut, l'autre toute blanche vers le bas, à quatre stries granuleuses au-dessus de cette derniere zône, & à pas des orbes un peu concaves * : deux de l'espèce des premiers de


* séla, pl. concaves * ; deux de l'espéce des premiers de 12. n° 40-42 l'article précedent ; & deux Flamboyantes comme la dernière du même article. 12. 1.

468. Deux Cornets des Indes, très-rares & en pendant, blancs, à deux zônes de taches rouge-brun, celles d'en haut un peu déchiquetées, & à grand nombre de petits points de même couleur, rangés circulairement sur tout le corps & sur la spirale.

469. Neuf petits Cornets; sçavoir, un blanc à deux larges zônes orangé, & à trois bandes blanches, chatgées chacune de deux rangs de points de la couleur du fond, mais dont celles du haut & du bas sont presque masquées, à pas des orbes un peu concaves, & qu'on peut ran-

ger parmi les Amiraux 1; deux verds de diverses nuances, à stries longitudinales très-fines, XI. FAM. formant avec les transversales, qui sont mieux Volutes. prononcées, une espéce de rézeau, à tête ap- 14. nº. 11 & platie, à clavicule aiguë, & à dix orbes tuberculeux; deux qui peuvent se rapporter aux deux premiers de l'article 458, mais différens, le premier, en ce que les mailles du rézeau des zônes y sont plus grandes, le second, en ce que le rézeau s'y étend presque sur tout le corps; deux de l'espéce de ceux de l'article précédent; une Aîle de Papillon, & un Amiral d'Angleterre. S. 10.

470. Douze petits Cornets par pendans; sçavoir, deux à robe verd-de-terrasse & granuleuse vers le bas, violets en dedans, à spirale de dix cordons tuberculeux, & nommés en Hollande Fromages verds; deux de même efpéce, mais dépouillés, dont la moitié supérieure du corps est devenue violet couronné de blanc, & la moitié inférieure est restée verd de terrasse; deux blancs, marbrés par zônes de taches quarré-long orangé vif, & nommés en Hollande Nattes d'Italie 2; deux blancs à taches 2 Ibid. pl. 556 irrégulieres souci, disposées par zônes, & pone- nº. 4-10. tués de même dans les intervalles; deux blancs à trois zônes de taches larges un peu oblongues, violet foncé, à stries granuleuses dans le bas, & à spirale chargée de taches semblables,



espéce nommée l'Hébraïque 1; & deux blancs XI. FAM. marquetés par zônes de petites taches quarrées VOLUTES. noirâtres 2. 19.

471. Trois Cornets, dont deux d'Amérique lett. G. Gualt. tab. 25. en pendant, blancs, à un grand nombre de cer-List. tab. 779 cles ponctués de fouci, & à deux zônes de bandes

774. f. 20.

² Lift. tab. longitudinales, larges & irrégulieres, de même couleur, à pas des orbes un peu concaves, & tachés de même que le corps ; & un Fromage verd dépouillé, marbré par larges bandes longitudinales de fauve & de gris nué de violet, à une zône partie blanche, partie violette, situće dans le milieu du corps, & très-grand dans l'espèce. 9.7.

472. Douze petits Cornets; sçavoir, cinq variétés d'Hébraique, dont une comme celles de l'article 470; une qui en différe par ses taches rouge-brun; une dont les taches du premier rang sont longues & ondées, & celles du sécond rang ne sont au contraire que de simples points fort distans les uns des autres; une couverte presque en entier de taches longitudinales ondées, violet-noir, & à cannelures circulaires; & une qui différe de cette derniere, en ce que les taches en sont interrompues dans le haut & vers le milieu par deux petites zônes blanches 3; un Cornet couleur de chair, à une

Gualt, tab.25. zône blanche au-dessous du milieu, à stries cirlitt. Q.

culaires,

culaires, à tête élevée & tuberculeule; un blanc bariolé de canelle foncé, à deux zônes de mê- XI. FAM. me, & à pas des orbes un peu concaves; deux Volutis, Nattes d'Italie, une très-jolie Flamboyante à zônes jonquille, & deux comme les derniers de l'article 470. 15.

473. Trois Cornets des Indes, peu communs; sçavoir, deux blancs à trois zônes sauves peu prononcées dans l'un, à flammes longitudinales brunes, étroites & ondées, striés vers le bas & dans toute la spirale*; & un blanc couvert en * Gualt. tab, entier de points orangés, gros & petits, dispo-23. litt. S. sés par zônes nombreuses, à stries circulaires très-fines, à pas des orbes un peu concaves, & à clavicule élevée, espèce qu'en pourroit nommer Cornet ponctué. 3". 16!

474. Un très-grand & beau Cornet des Indes, souci, tacheté par zônes de points rougebrun, à tête applatie, formée d'orbes un peu bombés, & tachetés de lignes ondées de même couleur, à clavicule aiguë, & nommé Pelotte ou Tine de beurre * 95. 9!

475. Deux Tines de beutre, moins grandes 44. R°. 1-4. Rumph. tab, que la précédente, l'une paille à points plus 31. litt. C. distans & moins nombreux, & l'autre jonquille foncé à taches plus grandes. 15.1.

476. Deux Cornets des Indes en pendant l'un fauve clair, rayé transversalement, & fort serré de brun, à tête applatie & clavicule aiguë,

Tome I.

nommé Minime *, & grand dans cette espéce; XI. FAM. & une Tine de beurre de moyenne grandeur, * Arg. pl. jaune pâle, & rare en ce que les cercles de Runph. tab. points y sont fort près les uns des autres. A. 12. lett. A.,

477. Deux grands Cornets des Indes, peu 31. litt. V. communs, l'un aurore, l'autre marron clair, Séba, pl. 54. m°. 3 & 4. tous deux cerclés de raies fines plus foncées, semblables à celles du Minime, ornés vers le bas d'une zône blanc-sale, assez large, & d'une

autre plus étroite dans le haut *. 18.

* Ibid. nº. 1 478. Quatre Cornets par pendans; sçavoir, deux blancs à zônes formées de grandes & pe-Valentyn.unival. 110. 34. tites taches irrégulieres, d'espéces de caracteres, de lignes interrompues & de points rougebrun, nommés Spectres, & grands dans leur

4 Arg. pl. espéce *; & deux Minimes. 25".3. 479. Quatre autres par pendans; sçavoir, 12. lett. C. Séba, pl. 44. deux rares bleuâtres, à grand nombre de zônes nº. 24 & 25. formées de lignes interrompues ou traits rou-Gualt. tab. 21. litt. D. ge-brun qui se répondent mutuellement en longueur, & à une zône blanche dans l'un, qui ne paroît point dans l'autre, à tête applatie, ta

chetée d'amaranthe, & qu'on nomme Minimes * Séba, pl. bleus *; & deux Spectres moins grands que ceux de l'article précédent, & de dessein un peu dif-84. nº. 5. férent. 12".1.

480. Quatre Cornets des Indes par pendans; sçavoir, deux peu communs, dont un blanc nué de couleur de chair & de bleu pâle,

grandes taches verd foncé, étendues sur la robe en forme de nuages, dans deux zônes interrom- XI. FAM. pues; & un verd foncé, à une zône de taches VOLUTES. blanches nuées de bleu, & quelques autres taches semblables vers le haut, tous deux à tête. applatie, couronnée de tubercules, à clavicule élevée, & à quelques stries circulaires granuleuses peu prononcées *; & deux Spectres à * Séba, pli zônes de points plus nombreuses que dans les 44. n°. 16. précédens. 8.1.

481. Quatre Cornets par pendans; scavoir, deux de l'espéce des deux premiers de l'article 471, mais dont un n'est composé presque en entier que de cercles ponctués de rouge-brun; & deux Tines de beurre de moyenne grandeur. 18". 1.

482. Quatre autres par pendans; sçavoir deux blancs nués & veinés d'orangé, en forme de filamens un peu onduleux, & à deux larges zônes brunes, dont la plus basse termine la Coquille, à tête peu élevée, & à révolutions de spire comme collées l'une contre l'autre, espéce nommée le faux Amiral ou Navet *; & deux *Arg. pl. 128 qui ne différent des deux premiers de l'article lett. L. 471, qu'en ce que leurs taches & leurs points n. 24 & 240 sont de couleur brune. 10.1

483. Un Cornet des Indes de cinq pouces quatre lignes de long, blanc, à deux larges zônes jonquilles, interrompues du fond, & cerclé dans les intervalles de traits, de taches &

VOLUTES. * Séba, pl. 45. nº. 9. Gualt tab. 22. lit. B.

de points plus ou moins gros de même couleur, XI. FAM. à tête applatie, & nommé la Spéculation * . ? o." 484. Quatre Cornets par pendans; sçavoir,

deux Navets, différens de ceux de l'article 482, en ce que les deux premieres révolutions de spires, au lieu de se trouver dans le plan des suivantes, s'en retirent en spirale, particularité qu'on remarque rarement dans les Volutes; & deux Spéculations de moyenne grandeur.

485. Trois Cornets des Indes ; sçavoir, deux en pendant, jaune-roux, marqués vers le haut, à la tête, & dans une zône du milieu, de taches blanches, à tête peu élevée, à pas des orbes un peu concaves, striés circulairement, & à pointe brune un peu recourbée, nominés Aumusses *; & une grande Spéculation, remarquable en ce que certains de ses cercles, sur-tout ceux d'en haur, paroissent formés d'une suite de caracteres, parmi lesquels on distingue des A, des X

& des Y très-bien formés. 9. 486. Deux très-beaux Cornets des Indes, blancs, cerclés de plusieurs rangs de points, de traits & de taches rouge-brun, imitant des caracteres, fasciés dans les intervalles de cordons jonquille pâle, dont quelques-uns sont aussi ponctués de rouge-brun, nommés fausses Ailes de Papillon, & des plus grands de cette es-

* Arg. pl. péce * . 30" 3! 487. Cinq Cornets de moyenne grandeur; 12. lett. Q. Séba, pl. 44. ma. s.

* Séba, pl. 44. nº. 8-11. Gualt. tab.21. litt. E.

Içavoir, une fausse Aîle de papillon, deux Spéculations, un Navet, & une Tine de beurre. 24" XI. FAM.

488. Deux grands Cornets des Indes en pendant, blancs, à taches violet foncé, de forme à peu près quarré-long, distribuées par zônes, à tête platte, & nommés Damiers *. 22.1. * séba, plo

489. Quatre grands Cornets; sçavoir, deux Guals. tab.21, Damiers en pendant, une Aumusse, & un Na-

vet. 24".1. 490. Quatre autres par pendans; sçavoir, deux Damiers ornés chacun de trois zônes jaunes, sur lesquelles les taches noires ne s'étendent pas moins que sur le fond, & nommés pour cette raison Damiers à bandes : & deux Aumusses qui différent dans leur marbrure des

précédentes *. 19.10! 491. Quatre Cornets des Indes par pendans; cavoir, deux noirs parsemés de grandes taches planches, à peu près triangulaires, à tête applatie, à pas des orbes concaves & légérement uberculeux, espéce nommée Tigre noir *; & * Gual. tabi leux Damiers à bandes jaunes, nués de cou-22. litr. D. Séba, pl. 46. eur de chair. 18.41

492. Quatre autres comme les précédens, cela près que les bandes de l'un des Damiers ont jonquille tendre. 66.

493. Deux très-grands Tigres noirs en penlant, dont quelques-unes des taches blanches * Séba, pli

XI. FAM. tre ondées & dentelées. 42. 1.

VOLUTES.

Le très been Tigre, dont le fond est

494. Un très-beau Tigre, dont le fond est jaune-orangé, & qu'on nomme par cette rai-

*Arg. pl. 12. son Tigre jaune *. 24".1!

pendans; sçavoir, deux Damiers à bandes jaunes, deux Tigres noirs, rares en ce que les taches y sont moins fréquentes, sur tent vers le

* Ybid. no, haut * , & deux Spéculations. 25".

496. Dix Cornets de moyenne grandeur, par pendans; sçavoir, deux Tigres d'un roux-noir, rares en ce que les taches blanches ne paroisfent que dans deux zônes, ce qui ses a fait

* Ibid. n° nommer Amirales par quelques Hollandois *;

§ & 6.

* Arg. pl. 12, un Tigre à fond roux, appellé Tigre rouge *;

deux O.

12** 6.

down Tigre jaune; deux Damiers à bandes jaunes;

12** 6.

deux Tines de beurre, & deux Nattes d'Italie. 497. Six Cornets par pendans, sçavoir, deux

Damiers à bandes jaunes; un Tigre noir, remarquable par une petite bandelette jaune, située vers le haut, & interrompue par les taches; un Tigre rouge & deux Aumusses. 24.

498. Deux Cornets d'Amboine, rares, même dans le pays, blancs, couverts dans tout le corps d'un dessein de traits recourbés jonquilles, laissant entr'eux des taches du fond en forme d'écailles, & à tête applatie, chargée de taches

* séba, pl.43. quarrées de même couleur que les traits *. 72.1.

499. Deux grands & beaux Cornets blancs
à pointe violette, à tête peu élevée, où les ré- XI. FAM.
volutions des spires ne sont marquées que par Volutis,
des traits, espéce nommée en Hollande la Mennonite, & en France l'Onix, le Cigne ou le
Cierge blanc *. 47*-19!

* Scba, pl.

blancs, cerclés dans toute leur longueur de lignes interrompues, & de points noirs, quelquefois verds ou fauves, chargés de plus de deux larges fascies vertes & sauves, à tête applatie & couronnée de crenelures qui vont en diminuant jusqu'au sommet, ce qui leur a fair donner le nom de Couronnes impériales *. 35. *Arg. pl. 12.

un peu moins grandes que les précédentes, & n°. 18-20. Rumph. tab. un peu différentes en nuances de couleurs. 19-2. 34. litt. H.

503. Deux autres moins grandes. 17:19.

504. Deux Couronnes impériales de moyenne grandeur, rares, & qui ont cela de particulier que leurs zônes, verd de terrasse foncé, sont comme déchiquetées, cerclées de lignes rougeâtres, & que les intervalles des déchiquetures sont ponctués de rouge-brun *. 48.9.

505. Six Cornets, dont quatre par pendans; sçavoir, un Cierge ventre de biche clair, nommé le Cierge jaune; une Couronne impériale; 18.4.

* Ibid. lit. I.

Q iv

248 COQUILLES UNIVALVES

XI. FAM.

deux Damiers à bandes, & deux Tigres noirs.

506. Un très-gros Cornet, rare, blanc, bariolé de petites lignes fauves, se joignant de diverses manieres en forme de fils de toile d'araignée, à deux zônes de taches marron foncé, à tête peu élevée & chargée de petits tubercules, nommé en Hollande la Toile d'Araignée, & en

*Arg. App. France l'Esplandian *. 70".

507: Un semblable qui peut servir de pendant au précédent. 40.

508. Un autre un peu moins grand. 40.

509. Deux autres en pendant. 38"

510. Deux Esplandians différens des précédens, en ce que le rézeau en est moins serré & brun-clair, & qu'ils offrent jusqu'à trois zônes brun-soncé.

511. Huit Cornets de moyenne grandeur, par pendans; sçavoir, deux verd-jaunâtre, à deux zônes blanches, l'une en haut, l'autre un peu au-dessous du milieu, bordées l'une & l'autre de taches noires oblongues & un peu obliques, mais qui, dans celle d'en haut, s'étendent sur tous les orbes de la tête, qui est platte, & dont le fond est blanc aussi, espèce nommée seba, pl. Queue d'hermine*; deux semblables à ceux-ci,

* 56ba, pl. Queue d'hermine*; deux lemblables à ceux-ci, \$2. n°. 31 & à cela près que les taches des zônes y font plus nombreuses & moins régulieres, que le fond en est de plus chargé, dans les intervalles des zônes, de cercles ponctués bruns, & que la forme en est plus rensiée, variété nommée simplement XI. FAM. Hermine *; deux Tigres rouges, & deux Da- VOLUTES. miers à bandes. 9.1.

512. Dix autres par pendans; sçavoir, deux Séba, pl. 42. orangés, à quelques taches blanches dans le List. tab. 780. haut, à une zône de même au-dessous du milieu, plus prononcée dans l'un, & moins dans l'autre, à stries granuleuses dans le bas, & à tête peu élevée, marbrée du fond & de blanc *; * séba, pl. deux Hermines, deux Minimes, deux Damiers 42. 100. 41 80 à bandes & deux Tigres noirs ; plus un Cornet coupé en deux transversalement, pour faire voir les révolutions intérieures des spires. 16.

513. Dix autres Cornets, dont huit par pendans; sçavoir, une Couronne impériale, un Cierge jaune, deux Damiers à bandes, deux Hermines, deux Tigres noirs & deux Flam-

boyantes. 10.11!

514. Treize Cornets des Indes; sçavoir, un paille à stries circulaires très-fines, orangé foible, à une zône blanche peu prononcée, & à clavicule élevée, nommé la Fileuse *; deux * Gualt. tab. blancs marbrés par grandes taches longitudi-20. litt. B. nales irrégulieres marron, à tête peu élevée, & légérement striés vers le bas *; un violet à deux * Rumph. zônes blanches, l'une en haut, l'autre au mi-tab: 32.lit.Q. lieu, à tête applatie & clavicule peu élevée *; * séba, pl. un jaune clair à une zône blanche dans le mi- 42.10°. 35-

COQUILLES UNIVALVES.

VOLUTES.

44. n°. 19.

lieu, & à tête platte; un jaune foncé, à trois XI. FAM. zônes blanches, l'une large en haut, l'autre trèsfine un peu plus bas, & la troisieme au-dessous du milieu, à tête platte & blanche, tachetée de marron; un de l'espéce des deux derniers de l'article 470; un comme les deux premiers de l'article 466; un comme ceux de l'article 468, un faux Amiral de Guinée; une Flamboyante, & deux Hermines. 10".

515. Vingt-six petits Cornets; sçavoir, deux verd de terrasse, marbrés par taches longitudinales interrompues de blanc, à pas des orbes * Séba, pl. tuberculeux, & nommés Papiers marbrés *;

deux blancs à petites cannelures circulaires & à tête peu élevée; deux citron, & deux souci, à tête platte & clavicule peu élevée; un marron teint de bleu, à deux zônes étroites blanches; un gris nué de bleu, à deux zônes blanches & à tête platte; & les seize autres des variétés déja décrites, entr'autres, un Vice-Amiral de Rumphius, un Tigre jaune, une Queue d'hermine, une Hermine, deux Navets & deux Nattes d'Italie: plus un petit Cornet coupé en deux pour en faire voir l'intérieur. 16.1.

516. Quarante petis Cornets fort jolis, des espéces déja décrites, très-variés dans le dessein, la forme & les couleurs. 12".4"



GENRE SECOND.

VOLUTES CYLINDRIQUES, OU
ROULEAUX.

blancs, à raies longitudinales en zig-zag, brunes XI. FAM. VOLUTES. & rouge-sanguin, se joignant fréquemment les unes aux autres, & laissant entr'elles quantité de petits vuides du sond en forme d'écailles ou de cœurs, & chargés de plus de trois larges zônes jonquille, ce qui les a fait nommer Drap d'or fascié*. 14.19.

5 18. Un très-grand & beau *Drap d'or fascié*, lett. 1. Séba, pl. 4. & un de même espéce, dépouillé, devenu par n°. 14 & 15. Rumph. tal là du plus beau blanc. 17. 1.

519. Deux Draps d'or fasciés, moins grands que les précédens, mais qui ne leur cédent en rien pour la beauté. 15.2.

520. Deux Rouleaux qui ne différent des précédens qu'en ce que les taches jonquilles n'y font point jettées tout-à-fait par zônes, & qu'on nomme par cette raison simplement Draps d'or*. 6"2

521. Trois beaux Draps d'or, dont un rare, lett. F. différent des précédens, en ce que le fond en n°. 16 & 17. est bleu, que les zig-zags y sont nombreux,

*Arg. pl. 13:

252 COQUILLES UNIVALVES

XI. FAM. qu'on nomme Drap d'or à fond bleu; & deux, dont un à bandes, de forme plus renslée & plus courre, mais d'ailleurs semblables à ceux des

* séba, pl. articles précédens *. 24.1.

522. Six Draps d'or par pendans, formant trois autres variétés; sçavoir, deux à fondbleu, mais moins chargés de cette couleur que les précédens, & à trois zônes mieux prononcées; deux Draps d'or ordinaires, à rézeau moins serré, & à taches blanches, plus grandes que dans ceux de l'article 520; & deux de forme très-allongée, dont le rézeau fort serré ne laisse paroître en certains endroits que de très-petits

* Ibid. pl. points blancs *. 18"

47. nº. 13. Rumph. tab. 32. litt, Q.

523. Trois grands *Draps d'or*, dont deux à peu près semblables à ceux de l'article 530; & un de la derniere variété décrite dans l'article précédent, mais à rézeau moins serré. &

524. Un grand & rare Rouleau fond blanc, à rézeau jaune foncé, & à grandes taches de même couleur, répandues principalement en deux zônes, de forme un peu renssée par le haut,

* 1btd. tab. & nommé Drap d'or de la Chine *. 16."

525. Un grand Rouleau de la Chine, peu commun, fond jonquille marbré de taches blanches, à stries sines circulaires, de sorme oblon-

* Arg. pl. gue & effilée, à tête un peu élevée, & nomme 23. lett. D. Séba, pl. 43. Drap orangé *. 20.

A° . 4 & 5.

526. Deux Draps orangés en pendant, à = fond moins vif, à taches plus fréquentes, & à XI. FAM. tête moins élevée que le précédent *. 48.

527. Six Rouleaux par pendans, peu com-43. no. 1862. muns; sçavoir, deux blancs à stries circulaires chargées à distances égales de points rouge foncé qui se répondent aussi en longueur, à taches longitudinales orangé brun, & de forme essilée, espèce nommée Drap d'or piqueté de la Chine *; deux Draps orangé à taches blanches, * 1ift. tabe petites & peu nombreuses, & à grand nombre 741. fig. 35. de bandes longitudinales étroites orangées sur un fond jonquille; & deux Draps d'or à fond bleu. 95.1.

528. Deux rares & jolis Rouleaux en pendant, fond blanc nué de bleu, marbrés l'un par taches longitudinales ondées, l'autre par taches disposées en deux zônes de verd foncé nué de marron, & cerclés de plus de fines zônes & de points rouges-bruns, à tête élevée, & nommés Tulipes *. 48.

529. Deux Rouleaux; sçavoir, un rare, fond 13. lett. B. séba, pl. 48. gris de lin, teint de blanc & de bleu, marbré nº, 39 & 40. par trois larges zônes & par bandes longitudinales de fauve roux nué de verd, & cerclé comme les précédens *; & un fond blanc, parsemé d'assemblages de petites taches noires, 36, plus serrées dans deux espéces de zônes, espéce

254 COQUILLES UNIVALVES

nommée Piqure de mouches, ou Drap d'ari

VOLUTES.

* Arg pl. 530. Huit jolis Rouleaux par pendans; sça15. lett E.

Gualt. tab. 25.

Ett. O. & à deux zônes de même couleur, nommés

* Arg. pl. Omelette *; deux blancs un peu tachés de bleu, à grandes taches longitudinales verd foncé, interrompues par une zône blanche peu prononcée dans l'un, tous deux cerclés, fur-tout vers le bas, de traits & de points bruns, à tête affez élevée, terminée par une clavicule couleur de chair, espèce nommée la Nébuleuse ou les Nua

* 56ba, pl. ges *; deux Tulipes & deux Draps d'argent 21. 9 & 531. Six Rouleaux peu communs; scavoir,

de gris de lin, légérement marbrés, l'un principalement dans une zône du bas, l'autre par bandes longitudinales ondées & en zig-zag de

4 Ibid. pl-blanc *; deux blancs nués de bleu & de gris de
43. n°. 34.
* Ibid. n°. diverses nuances *; & deux, dont un brun nué

de gris de lin, & un bariolé des mêmes couleurs, tous de l'espèce nommée Papier de la Chine.

> 532. Un très-grand Rouleau des Indes, marron, à suites ou traînées longitudinales, transversales & obliques, de taches blanches, en

*Arg. pl. 13. forme d'écailles, laissant entr'elles de grands esséba, pl. 47. paces du fond, espéce nommée Brunette *. 51. 2.

Rump. tab. 533. Deux grandes Brunettes en pendant,

Rumph. tab.

dont une peu commune à fond canelle & à taches plus larges, l'autre fond rouge-brun, à XI. FAM.
VOLUTES.

534. Quatre Rouleaux par pendans; sçavoir, deux Brunettes de forme plus estilée *; & deux * séba, pl. Draps d'or. 30". 1

535. Trois Rouleaux; sçavoir, deux en pendant, blancs nués de couleur de chair, à grandes taches en forme de nuages, formées d'un assemblage de raies brunes ou bleu soncé, à tête peu élevée, dont les orbes sont concaves & marbrés comme le corps, nommés l'Ecorchée*, & très-grands dans leur espèce: & une Brunette. So.*

536. Quatre Rouleaux par pendans; sçavoir, 31. litt. F. deux Ecorchées un peu moins grandes que les

précédentes, & deux Brunettes. 30. 3.

537. Six Rouleaux par pendans; sçavoir; deux Ecorchées dissérentes des précédentes, en ce que l'une n'a qu'un petit nombre de taches brunes, en forme de slammes longitudinales distribuées en deux zônes, & que la seconde est bariolée de taches noirâtres, déchiquetées en forme de lambeaux, à deux zônes près, où elles sont plus larges; deux Draps d'or & deux Draps d'argent. 14.

538. Deux grands Rouleaux de l'Isle de France, en pendant, gris de lin nué de couleur de chair, à bandes longitudinales de taches

256 COQUILLES UNIVALVES

rouge - brun, en forme de rézeau, & à deux XI. FAM. zônes de grandes taches de même couleur, à tête applatie, à pas des orbes tuberculeux, & à coque mince, espéce nommée le Brocard de

* Arg. pl. Soie *. 47 19!

13. lett. A. 539. Quatre Rouleaux par pendans, dont no. 1-3. deux Brocards de soie & deux Ecorchées. 22. fg. 41. 540. Quatorze Rouleaux par pendans; sça-

voir deux blancs, pointillés sur tout dans deux zônes, & par bandes longitudinales ondées de points bruns, à côtes longitudinales peu prononcées, à pas des orbes tuberculeux, & nom-

*Arg. pl. 12. més Moires *; quatre autres, dont deux marlett. S. Séba, pl. 55. brés de blanc & de fouci, & deux de marno. 1. Gualt. tab. 25. ron & de violet, tous les quatre ceints du haût litt. P. jusqu'en bas de traits & de points bruns, variété

* séba, pl. nommée le Taffetas *; deux Nuages, deux 42. n°. 16 & Ecorchées, & quatre Draps d'or, dont deux fasciés, & deux de la variété des derniers de

l'article 522. 12".

dans; sçavoir, deux petits verd soncé, ceints de traits alternativement bruns & blancs, & à une petite zône blanche vers le bas, deux petites Brunettes rares, en ce que les traînées de taches blanches y serpentent dans quatre bandes longitudinales régulieres; un Drap d'or jonquille, marbré dans trois bandes longitudinales & trois zônes de blanc teint de gris de lin, & yeiné

257

veiné du fond; trois autres Draps d'or, dont ... un à fond bleu, & deux de la variété de l'arti- XI. FAM. cle 520; deux Taffetas de la premiere des deux Voluces. variétés de l'article 540; deux Draps d'or piquetes de la Chine, deux Nuages & deux Moires. 39:3:


GENRE TROISIEME.

VOLUTES ÉCHANCRÉES, OU OLIVES.

542. EUX Olives des plus rares, en pendant, blanches, ponctuées de gris, semées çà & là de traits transversaux brun-foncé, la plûpart en zig-zag, à plis longitudinaux peu prononcés, à carne circulaire peu saillante vers le tiers de la hauteur, à petite tête, dont les spires sont creusées en gouttiere, à lévre extérieure applatie en dehors, & intérieure couleur de chair. Cette Coquille ne se trouve pas même dans les Cabinets de Hollande. 245. 12!

543. Trois Olives des Indes; sçavoir, une couleur de chair, à bandes longitudinales ondées, & un peu en zig-zag, orangé ombré de bleu pâle, & à tête élevée *; une verd céladon, ornée dans toute sa robe de chevrons couchés 13. lett. Q. violet noir, imitant le point d'Hongrie, à petite tête, dont les premieres révolutions rentrent

Tome I.



VOLUTES. 1 Rumph.

737. f. 29. Séba, pl. 53. lett. a.

litt. P.

lett. A. B.

lier. O.

l'une dans l'autre, & nommée en Hollande Drap XI. FAM. mortuaire 1; & une verd de terrasse, semée de quelques zig-zags violet-noir, & à tête aptab. 39. 10.4. platie 2. 21.13.

544. Deux grandes Olives de la mer du Sud; couleur de chair nué de bleu, couvertes d'un grand nombre de traits orangé-brun, qui, descendant d'abord de la tête en forme de chevelure, se prolongent ensuite dans tout le corps en divers zig-zags plus ou moins grands & serrés, laissant des intervalles triangulaires du fond à peu près comme dans les Draps d'or, à tête peu élevée & à pas des orbes creusés en sillon, espèce nommée Porphyre ou Olive de Pana-

3 Arg. pl. 13. ma3. 23.4! lett K. Gual. tab. 24.

545. Deux Olives de Panama, un peu moins

grandes que les précédentes. 9."

546. Quatre Olives par pendans; sçavoir, deux grandes jaune pâle, marbrées de traits longitudinaux en zig-zag bruns, & à trois fascies de taches de même couleur, à tête élevée, 15.2/ à pas des orbes creusés d'un profond fillon, & Arg. pl. 13. légérement dentelés, & à bouche aurore vif 4; Séba, Pl. 53. deux Olives de Panama de moyenne grandeur.

547. Quatre autres par pendans; sçavoir, Gualt. tab.24. deux comme les premieres de l'article précédent, & deux qui en différent par leur marbrure


's Séba, pl. plus brune, & leur bouche blanche s. 18". 548. Huit Olives par pendans; sçavoir, deux Rumph. tab. 39.119.3.

blanches, teintes par traits longitudinaux & en 🚍 zig-zag de ventre de biche, à une zône blanche XI. FAM. oblique vers le bas, & à une petite fascie au- VOLUTES. dessous, qui se termine à l'échancrure de la bouche, de forme renflée, ainsi que le haut de la lévre intérieure, & à tête blanche peu élevée; deux de même espéce, mais dépouillées, & dont la robe est devenue par-là marron foncé, bariolée de blanc; mais la zône, la fascie & la tête font restées blanches *; deux ventre de biche *Arg. pl. 13: clair, ornées d'un dessein en rézeau violet pâle, lett. M. plus foncé dans deux espéces de zônes, & deux fig. 10. de la variété des dernieres de l'article précédent. 15"1.

549. Huit Olives par pendans; sçavoir, deux très-brunes, appellées Moresques ou Négresses *; * Séba, deux jaune-souci, dont une tirant un peu sur le verdâtre *; deux blanches, & deux dépouillées, de la variété des premieres de l'article précédent. 12". II.

550. Seize Olives par pendans; sçavoir, deux peu communes, teintes de gris & de verd de pavot dans les deux tiers de leur hauteur, & noisette dans le reste, de sorme essilée, & à tête très-élevée *; deux blanches tachetées de fauve * 11st. tab. & de lilas, à tête peu élevée, & à carne cir-722. fig. 9. Séba, pl. culaire peu faillante vers le tiers de leur hau-lett. P. Q. teur *; deux verd d'olive, marbrées l'une par * Gualt. tab. taches en zig-zag peu nombreuses, l'autre par 23. litt. L. séba, pl. 53.

Rij



zônes interrompues de brun obscur, à quelques XI. FAM. côtes longitudinales peu prononcées & à tête Volutes. applatie *; deux blanches marbrées par traits 33. lett. M. obliques & en zig-zag de cannelle & à tête éle-* Ibid. let. y. vée * ; deux nuées de verd céladon & de jon-

ez. litt. PP.

quille, marbrées de violet, & du reste sembla-* Gualt, tab. bles aux précédentes *; deux de l'espéce des premieres de l'article 548, dont une dépouillée, deux Négresses & deux olivâtres. 2 A.

551. Onze Olives peu communes: sçavoir, deux blanches à bandes longitudinales en zigzag cannelle; une de même couleur, mais à simples traits en zig - zag cannelle foncé; une blanche presque entiérement recouverte de grands traits longitudinaux, verdâtres, nués de jaune, à tête élévée, à pas des orbes plats, & à une strie oblique en vive arrête dans le bas; une verd céladon clair, à espéce de flammes transversales lilas & noisette; une gris de lin à trois zônes vertes, dans les intervalles desquelles * séba, pl. est un dessein en treillis de même couleur *; une gris verdâtre, & une verd de terrasse, tachées dans deux zônes de violet noir ; une Negresse, & deux grandes de la variété des der-

63. lett. V.

nieres de l'article 547.18." 552. Dix Olives des Indes, d'une belle grandeur & d'un très-beau choix. 28".

553. Trente-fix petites Olives par pendans; sçavoir, deux jonquilles ponctuées par compar-

timens de brun, & à bouche violette *; deux àpeu-près semblables, mais de couleur plus fon-XI.FAM. cée, de forme plus oblongue, & à points distri- VOLUTES. bués moins régulièrement *; deux de forme 23: litt. T. 2 List. tab. bombée, blanches, semées de petites taches peu 721. f. 7. apparentes gris de lin, à deux zônes brunes dans l'une, cannelle dans l'autre; deux de forme àpeu-près semblable, blanc-verdâtre, à traits en zig-zag, & grandes taches longitudinales brun obscur *; deux blanches ornées de traits en zigzag violet foncé, & à bouche rouge-brun; 735. f. 25. deux blanches bariolées de traits, le plus souvent en zig-zag gris de lin; deux blanches nuées de ventre de biche, terminées par une large zône orangée; deux couleur de chair pâle, bariolées de traits fauves en forme de chevrons: deux, dont une blanche & une verte, fasciées debrun obscur; deux bariolées de gris & de verd foncé, à deux larges zônes brunes, & lévre intérieure orangée *; deux blanches nuées de ci- +séba, pl. 536 tron, marbrées dans trois zônes interrompues lett. O. de verd de pavot ; deux grises nuées de jaune pâle, chamarées de traits en zig-zag verds, imitant le point d'Hongrie; deux Négresses; deux gris de souris; deux blanches; deux blanches ponctuées de bleuâtre, à une large zône de même couleur dans le haut; deux comme les neuvieme & dixieme de l'article 550: & deux blanches marbrées de cannelle clair, & du reste

R iii

COQUILLES UNIVALVES

femblables aux troisseme & quatrieme de l'article 548. 9.

XI. FAM. VOLUTES.

554. Trente-neuf petites Volutes échancrées: scavoir, une blanc de lait, à tête élevée formée de fix orbes en doucine granuleux, teints d'orangé; une blanche de forme bombée, à stries circulaires, & à six orbes reticulés & granuleux; une blanche tachée par zônes & par bandes longitudinales de fauve - roux, de forme moins bombée, mais du reste semblable à la * Gualt. tab. précédente * ; une petite de même espéce , mais de forme très-effilée; une peu commune blanche, ceinte de diverses zônes de très-petits points verds se répondant exactement en lon gueur d'une zône à l'autre, à lévre extérieure en bourrelet, & jaune d'or, ainsi que le haut de l'intérieure, qui est armée de très-grosses dents

\$03. fig. 11.

23. litt. O.

Sualt tab. 28. litt. B.

803. f. 10. litt. D.

791. f. 44. Gualt. tab. 22. huit Olives par pendans d'un joli choix. 17. litt. I.

* Lift. tab. clavicule jaune *; quatre autres de forme à-peu près semblable à la précédente, dont deux blan * Ibid. f. 9. ches fasciées de petites zônes orangé *, & deur

à tête se confondant avec le corps, & à petite

ponctuées par compartimens de même cou-* List. tab. leur *; deux blanches marbrées de brun de di-Gualt. tab. 18. verses nuances, à trois grosses fascies circulaires, & à fix côtes longitudinales, tuberculeuses * Lift. tab. dans les points où elles se croisent *; & vingt-

DOUZIEME FAMILLE.

PORCELAINES.

C e sont des Coquilles de forme ovoide applatie en-dessous, ne montrant que pour pour de spirales. Leur bouche nessoblongue est plus ou moins étroite, & nous servira à les diviser en deux genres; sçavoir,

- 1°, Les Porcelaines à bouche moins étroite, dépourvue de dents, ou n'en ayant qu'à l'une des deux lévres.
- 2°. Les Porcelaines à bouche plus étroite, en forme de fente, dentée des deux côtés.



PREMIER. GENRE

PORCELAINES A BOUCHE MOINS ÉTROI-TE, DÉPOURVUE DE DENTS, OU N'EN AYANT QU'A L'UNE DES DEUX LÉVRES.

555. N E Porcelaine des Indes, très-rare, XII. FAM. blanche, à lévre extérieure en bourrelet, & Porcelai- dont les extrémités se prolongent en deux lon-NES. gues avances creusées en gouttiere, nommée Navette de Tisserand, & grande dans cette es-* Arg. pl. péce *. 40.

18. fert. I. Lift. tab. 711. Séba, pl, 55. nº. 14.

556. Deux Porcelaines en pendant, papyracées, blanches tant en dessus qu'en dedans, & dont les extrémités ne se prolongent que peu en dehors : dans l'une, la lévre extérieure se recourbe un peu en dedans, tandis que celle de l'autre, qui paroît être du premier âge, finit en tranchant: toutes deux rares & grandes dans leur espèce, nommée l'Œuf papyracé.

557. Deux Porcelaines en pendant, plus grosses que les précédentes, dont elles différent d'ailleurs en ce que la coque en est plus épaisse, la lévre extérieure renslée & dentée en forme


*Arg. pl. 18. de rides, & le dedans orangé: variété que l'on List. tab. 711. nomme simplement l' @uf. * 6.1. f. 65. Gnale, tab. 15.

558. Sept Porcelaines peu communes: sçalitt. A.

oir, une petite papyracée blanche nuée d'incarnat, formant une seconde variété de Na- XII. FAM. vette plus effilée que la précédente *; deux blanches, à un pli en forme de bosse vers le milieu * List. tabs du corps, à extrémité des lévres couleur de 711. fig. 66. rose, au-dessus desquelles sont deux boutons ou verrues, & à lévre extérieure garnie de dents, espéce nommée la Bossue*; deux blanches * Arg. pl. nuées d'aurore, à un anneau très-faillant sur le 18. lett. M. milieu du corps, & à bouche dépourvue de f. 67. dents, autre variété de Bossues, nommée Bossus, 17. sue sans dents, & deux Eufs papyraces des * Arg. pl. deux variétés de l'article 556. 25.11 Lift. tab. 711.

559. Trois Porcelaines peu communes : sça-f. 64. Séba, pl. 55. voir, deux marron, marbrées principalement no. 18. dans quatre zônes & vers la tête de taches blanches, à lévre extérieure en bourrelet, & garnie de dents, à petite bosse sur le dos, à coque mince, & à petite clavicule *; & un œuf de la va- * List. tab,

riété de l'article 557. 13. 560. Onze Porcelaines, dont dix par pendans: sçavoir, une grise nuée de bleu, mouchetée par zônes de grandes taches brunes & rousses de diverses nuances, à lévre extérieure tranchante, à coque mince, & à clavicule applatie; deux de forme plus oblongue & moins bombée, tachetées de fauve & de roux, & du reste semblables à la précédente *; deux fauves de forme encore plus al-748. f. 42 &



NES. longée, & fasciées, l'une d'orangé, l'autre de XII. Fam. verdâtre; deux bariolées de gris & de brun, à PORCELAI deux fascies gris de lin, à bouche violette, & à clavicule un peu elevée: c'est le Potan de M.

* List. tab. Adanson *; deux petites brunes de même espé-741. f. 37. Adans. Hist. péce ; deux mouchetées de canelle, de la vadu séa. pl. 5. riété des premieres de cet article *. Plus, un * List. tab. grand nombre de petites Porcelaines blanches, 742. f. 44.

enfilées en façon de collier, toutes de la variété

* Adanson, que M. Adanson a nommée le Falier*, connue
ibid. pl. 5.
aussi fous le nom de Monnoie de Guinée;
& deux petites de même espèce, attachées ensemble, dont une a la bouche à gauche, &
l'autre à droite, & forment ainsi l'Unique & la
Contre-unique de cette espèce. Toutes les Porcelaines de cet article peuvent être rangées dans

10.3.



le genre que M. Adanson a nommé le Mantelet.

SECOND. GENRE

PORCELAINES A BOUCHE PLUS ÉTROITE, EN FORME DE FENTE, DENTÉE DES DEUX CÔTÉS.

561. DEUX Porcelaines fauve pâle, ornées de traits longitudinaux, fins, serrés & hachés, XII. FAM. canelle, interrompus dans le milieu par une PORCELAIbande longitudinale ondée, d'où partent de côté & d'autre de petits rameaux, à taches rondes plus ou moins grandes vers le bas, & nommées Cartes Géographiques ou Mappemondes *; toutes deux grandes dans cette ef- * Arg. pl. 184 péce. 7.4!

562. Quatre Porcelaines par pendans : sça-38. litt. B. voir, deux à coque mince, blanche nuée de gris de lin, à taches nombreuses brunes & rousses, à deux espéces de fascies, & à petite tête applatie *; & deux Géographiques moins

grandes que les précédentes. 6.1. 563. Deux très-grandes Porcelaines couleur de chair pâle nué de bleu, à taches rondes brunes & noires, à une bande longitudinale étroite & ondée tirant sur le jaune, à coque épaisse, & nommées Peaux de Tigre * 8"5.

564. Quatre grandes Peaux de Tigre, dont Rumph. tab.

Rumph. taba

* Lift. tabi 672: f. 18.

682. fig. 29.

COQUILLES UNIVALVES 268

PORCELAI-NES.

deux blanches, à taches plus petites & moins XII. FAM. nombreuses : une à fond blanc teint d'orangé, & la derniere remarquable par une large tache rouge-brun sur le dos. 10.4.

565. Quatre autres par pendans, dont deux à taches petites & nombreuses, & deux de la variété de celles de l'article 563.4" 6

566. Six Porcelaines par pendans: sçavoir, deux Peaux de Tigre, à large bande longitudinale blanche sur le milieu du dos; deux des variétés déja décrites; & deux de l'espéce des deux premieres de l'article 562.3.3.

567. Dix Porcelaines: sçavoir, deux fauvebrun parsemées de taches blanches, à deux fascies peu prononcées, & nommées Neigeu-* Lift. tab. ses *; deux brun foncé parsemées dans le milieu 676. f. 23. du corps de taches rondes à-peu-près égales, grises, & blanc sale, interrompues par une petite bande longitudinale de même couleur, à

coque épaisse, & à base plate, espèce nommée * Ibid. tab. par Rumphius Porcelaine à tête de serpent * ; une 703. f. 52. Rumph. tab. autre variété de cette espéce, recouverte en entier de taches, à coque mince, & à base plate

> du côté de la lévre extérieure, mais arrondie de l'autre; deux fauves, marbrées de marron, à extrémités des lévres fort faillantes & applaties, s'enfonçant vers le bas dans l'intérieur de

* List. tab. la Coquille, nommée le Lapin; un autre Lapin gris-bleuâtre & à coque mince; & deux Peaux


de Tigre. 7.1.

38. litt. E.

\$87. f. 34.

568. Seize Porcelaines par pendans: sçavoir, deux peu communes fauve nué d'orangé, à tête XII. FAM. applatie & enfoncée, à lévre extérieure un peu faillante vers le haut, à dos élevé, & à deux fascies presque imperceptibles *; deux marron * Lift. tab; clair & foncé, à deux zônes blanchâtres bien 670. f. 16. prononcées, à lévre extérieure tranchante dans litt. I. l'une, recourbée & dentée dans l'autre *; deux * List. tab; à large base, bariolées sur les flancs de blanc & de fauve clair, a ant sur le milieu du corps une large bande longitudinale blanche, tachetée dans toute sa longueur de brun-noir, espéce nommée le Léopard*; deux à bouche, base & bords du corps noir, à dos blanc teint de bleu tab. 39. lit. S. pâle, à une bande longitudinale fauve dans le milien, & nommées Agates *; deux blanches, * Arg. plate teintes en quelques endroits de bleu pâle & de fauve-roux, à taches brunes peu nombreuses sur les côtés, & à cannelures des deux lévres aurore, espéce nommée Truitée *; deux fauves nuées de noisette, à trois larges zônes plus clai- 683. f. 30. res que le fond, & à petite tête applatie; deux Neigeuses, & deux Porcelaines à tête de serpent. 3.3.

569. Deux grandes Porcelaines de forme oblongue, marbrées par grandes taches de blanc & de brun, & dont la robe est en plusieurs endroits comme faupoudrée de blanc : on remarque sur le dos de l'une, quelques taches blanches & relevées, semblables à des gouttes de




noins régulieres, moins serrées, & séparées par des hachures de même couleur que les XII. FAM. aches, variété nommée fausse Arlequine, & PORCELAIS jui est très-bien représentée dans l'appendice de M. d'Argenville *; toutes très - grandes dans eur espèce; & une fausse Arlequine différente pend. pl. 2. les précédentes par son dos en forme de bosse. Rumph. tab.

574. Dix Porcelaines par pendans: scavoir, leux gris de lin, à quatre larges zônes grisbrun, interrompues en forme de taches quarées, & nommées la Taupe *; deux Taupes * Arg. pl. l'une autre variété, à robe fauve-roux, fasciée le trois zônes blanchâtres, & à base brun-16. litt. O. ioir*; deux aurore foible, à trois zônes gris- * Gualt. ibid. lanc, & à bouche lilas, nommées Caffé au Rumph. tab. ait, & grandes dans leur espéce *: deux faux tab. 38. litt. I Argus, dont un de la variété de l'article 570, 13. lett. H. 'autre en différe en ce qu'on n'y voit point de aches brunes cerclées de blanc, mais de simbles taches blanches; & deux fausses Arleuines. 10,

575. Idem. 10.1!

576. Dix Porcelaines par pendans: sçavoir leux grises tirant sur le fauve, à deux zônes gris plus clair, & à deux taches rouge - brun en orme d'yeux à chaque extrémité, espéce nomnée la Souris *; deux, dont une gris de lin, & l'autre fauve, chargées de traits longitudi-18. lett. C. naux & hachés violet foncé, à extrémités des 671. f. 17.

* Arg. Ap-



lévres couleur d'or, & nommées l'Isabelle :; XII. FAM. deux jaunes tirant sur le verd parsemées de taches blanches, rondes & à-peu-près égales en-PORCELAI-NES. Arg. pl. 18. tr'elles, nommées le Petit Argus 2; deux mar-Rumph. tab. brées principalement par zônes & par chevrons lett. P. e Arg. pl. 18. couchés imitant le point d'Hongrie, de noisette 39. litt. G. & de blanc bleuâtre, à coque mince, & à lett. X. clavicule un peu élevée 3; une Arlequine, & Lift. tab. 695.f. 42.

Arg. ibid. une fausse Arlequine. 25.1. 577. Les mêmes Coquilles, avec cette diflett. G.

List. tab. férence que l'une des deux Souris est gris-brun 662. f. 6. & sans zones. 18#

578. Trente petites Porcelaines par pendans: sçavoir, deux rares, canelle, parsemées de petites taches rondes blanches, au centre de quelques unes desquelles se trouvent de trèspetits points noirs, & à bande longitudinale

4 List. tab. verd céladon 4; deux blanches, parsemées dans les flancs de points violets, bariolées dans 696. f. 43. le dos de jaune pâle, à bande longitudinale du

s Gualt. tab. fond, & à bouche orangée 5; deux marron nué de bleu pâle, à cinq zônes de chevrons 14. litt. E.

6 Arg. pl. 18. blancs couchés en forme de point d'Hongrie 6; deux souci tachetées principalement sur le dos List. tab. de petits points blancs, & à base jonquille; 661. f. s. 7 Gualt. tab. deux qui ne différent de celles-ci qu'en ce que 15. litt. BB.

le fond de la robe & les côtés en sont rougebrun, & que les points blancs laissent des pe-

Rumph. tites taches du fond en forme d'étoiles 8; deux

petites


petites Porcelaines à tête de serpent, formant la troisieme variété de cette espéce ; deux verd XH. FAM. de pavot bariolées de gris, sur le milieu du dos PORCELAIdesquelles est une large tache irréguliere jaune NES, foncé, représentant, suivant M. d'Argenville, tab. 38. litt. F. List. tab. 702. la figure d'un animal 2; deux blanches, à trois f. 50.
2 Arg. pl. 18. larges zônes brunes, nommées le petit Ane 3; lett. Y. & quatorze Pucelages ou Coliques, formant 39. litt. E. sept variétés : sçavoir, deux blanc de lait parfaitement lisses 4; deux blanches; ceintes dans Rumph. tab. le milieu du corps d'un petit cordon jonquille 5; 4 Ibid. litt. deux semblables, à cela près que le cordon en est Di Gualt, tab. plus large & d'un beau violet; deux, dont le 14. n°. 2. dos est devenu entiérement violet par le dépouillement, & dont le bas de la robe est resté blanc 6; deux blanches, bossues sur les flancs, nommées plus particuliérement Thorax ou 3.f. 241. Kauris des Maldives 7; deux Kauris, l'un jonquille, & l'autre sousse ; & deux dépouillés, 18. lett. K. Gual. tab. 14. à flancs & extrémités blanches, & dos d'un nº. 3 & 4. beau lilas. 15.1!

579. Quinze Porcelaines : sçavoir, une qui différe du Léopard, décrit article 568, par une bande longitudinale plus étroite, presque entiérement brune, & par une large tache de même couleur, placée entre deux petites bosses, variété que quelques-uns nomment le Crapaud; une blanche parsemée d'un grand nombre de taches & de points fauve - roux, à deux zônes

Tome I.


6 Bonan, cle

Lift. tab. 709



grises ponctuées de noir, & à deux zônes plus plaires que le fond *; deux de forme bombée, XII. FAM. dont une roux foncé, à deux zônes blanc fale, NES, & une fauve-roux, à deux taches brunes à chaque extrémité; deux verdâtres ponctuées de gris, l'évre extérieure renflée & tuberculeuse, & à vase blanche tachetée de violet *; deux de for- * Gualte tabi ne à-peu - près semblable, grises ponctuées de 15. litt. X. aune, & à deux fascies plus claires, nommées Peau d'ane ; deux de forme-bombée à extrénités des lévres, un peu saillantes en dehors, lont une blanche *, & une fauve ponctuée de *1bid. tab. ouge *; deux bleues, mouchetées de marron, * 161 d. litt. N. flancs blancs tachetés de brun, à quatre peits yeux placés comme dans la Souris, & de orme semblable à celle du Petit-ane *; deux lanches, mouchetées de canelle, & à coque nince *; deux de l'espéce des treizieme & quaorzieme de l'article 578; deux Truitées; deux 684. f. 31. Petit - ane; deux très-petites grises, à trois rangs e taches brunes, à stries circulaires, & à sillon ongitudinal dans le milieu du dos, nommées le Pou de mer *; deux Poux de mer blancs nués *Arg. pl. 18. e couleur de chair, à stries circulaires comme List. tab. 706. ss précédens, mais fans fillon longitudinal *; f. 56. ne rare, fauve tirant sur le gris, à dos très-707.f. 57. levé, à stries circulaires fort saillantes, noueues le long du fillon longitudinal qui est fort arge, ainsi que les intervalles des stries, & à

* I . litt.



base platte, dont les bords sont renssés en es-XII. FAM. péce de bourrelet, nommée la Tortue *; deux PORCELAI- blanches, à stries circulaires granuleuses obli-NES. * List. tab. ques, & se croisant l'une l'autre, à sillon lon-706. f. 55. Bonan. cl. 3. gitudinal, vers le milieu du dos, & à extrémités f. 250. des lévres saillantes, nommée par M. d'Argen-

Arg. pl. 18. ville, Petite vérole; & deux gris de lin de la forme des précédentes, mais plus petites, gra-nuleuses sans stries, & jaunes dans les deux *Arg. pl. 18. bouts. C'est le Cloporte du même Auteur*. 48

lett. S.
Gualt. tab. 14.
litt. T.





COQUILLES DE MER.

CLASSE SECONDE.

BIVALVES

In range dans cette classe toutes les Coquilles composées de deux piéces à peu près égales, nommées Valves ou BIVALVES Battans, & où l'on ne remarque aucun repli sensible qu'on puisse regarder comne des spires. Nous les diviserons en ix familles, qui sont,

1°. Les Huitres. 4°. Les Cœurs.

2°. Les Peignes. 5°. Les Tellines. 3°. Les Cames. 6°. Les Moules.



PREMIERE FAMILLE.

HUITRES.

I. FAM. Huitres.

l'excès plus ou moins grand de l'une de leurs valves sur l'autre, & par la propriété générale & constante de s'attacher entr'elles ou à d'autres corps. Toutes celles que nous connoissons peuvent se rapporter à l'un des quatre genres suivans; sçavoir,

- 1°. Celles dont les valves sont composées de plusieurs couches ou lames, formant une surface quelquesois lisse & le plus souvent rabotteuse : ce sont les Huitres proprement dites.
- 2°. Celles qui sont couvertes de seuilles relevées, plissées, comme frisées & finissant en sestons, nommées par cette raison Huitres seuilletées.
- 3°. Celles qui sont chargées de stries longitudinales, hérissées d'épines gran-

les & petites, & dont le fommet de la ralve inférieure est applati, prolongé I. FAM. en dehors, & plus ou moins recourbé, hommées Huitres épineuses, Spondiles, ou Huitres à talon.

4°. Celles enfin dont le sommet de a valve inférieure est percé d'un petit rou, & recourbé en forme de bec sur elui de la valve supérieure, nommées énéralement Anomies ou Térébratules.



GENRE PREMIER.

HUITRES PROPREMENT DITES.

HUITRES.

582. NE Huitre des Indes, rare, brune nuée de blanc & de verdâtre, nacrée tant en dedans qu'en dehors, de forme presque ronde; à larges finuosités & plis dans son contour, à stries longitudinales très - fines, à valves se colant presque l'une sur l'autre, & à charniere composée de deux élévations étroites, qui forment un angle aigu dans le haut de la valve supérieure, & se logent dans deux cavités semblables de l'inférieure, espèce nommée Selle Polonoise, & portant plus de cinq pouces de dia-* Séba, la metre *. 250.1.

grande Coq. du milieu de la pl. 90. 104. litt. B.

583. Deux Huitres de moyenne grandeur: Gualt, tab. sçavoir, une Selle Polonoise, presque entiérement platte & papyracée, & une variété de cette espéce, blanche, à angle de la charniere plus aigu, & de forme encore plus ronde que les précédentes, nommée en Hollande Trans-* Seba, la parente, & en France Vitre Chinoise, parce

coquille du qu'effectivement les Chinois & les Indiens s'en milieu du bas de la pl. 90. servent pour cet usage. 24." Lift. tab. 225

584. Trois Huitres : sçavoir, une petite Sette & 226. f. 60. & 61.

Polonoise, & deux Vitres Chinoises, dont une grande. Plus, deux carreaux de ces Vitres, I. FAM. HUITRES.

785. Deux Huitres de la Méditerranée, à 7alves nacrées, transparentes, un peu raboteuses, dont la supérieure est blanche, percée près du sommet d'un grand trou ovale, & l'inférieure blanche sur les bords, mais partie jaune clair, partie rougeâtre vers le sommet, à charniere formée d'une petite patte ovale sinuée au-dessus du trou de la valve supérieure, & correspondant à une cavité de même forme de la valve inférieure, nommées Pelures d'oignon *, & très-grandes dans cette espèce. Plus, * Arg. pl. 19. un très-joli groupe de quatorze Pelures d'oignon, jaunes nuées de lilas, & de moyenne sig. 16. List. tab. 204 grandeur, adhérentes à un Burgau dans lequel s. 38. est logé Bernard l'hermite.

586. Vingt & une Pelures d'oignon de différentes grandeurs, & très-intéressantes: sçavoir, deux verd d'eau, plus rares que les précédentes, en ce qu'on y remarque des côtes & cannelures partant, non de la tête, mais du côté gauche de la circonférence: ces côtes & ces cannelures sont accidentelles, & dues à celles des Peignes, sur lesquels ces Coquilles se trouvent souvent adhérentes; quatre grandes de la variété des premieres de l'article précédent; huit de même espèce, mais de formes très va-

COQUILLES BIVALVES 282

I. FAM. HULTRES.

riées, dont quatre blanches, trois lilas, & une jonquille; un groupe de cinq autres, lilas clair adhérentes à un Burgau dépouillé; une trèsgrande, couverte de vermiculaires, & une qui différe de toutes les précédentes, en ce que la fenêtre en a été bouchée par l'animal. 9.

587. Une très-grande Huitre des Indes, bland sale en dessus, d'une très - belle nacre en dedans, de forme applatie, à bords supérieurs des deux valves dépourvus de charniere, mais seulement un peu caves sur-tout vers le milieu pour recevoir le ligament, dont la partie qui reste, a été coupée transversalement, & chatoie comme la plume de paon. Cette Coquille est de l'espéce qui fournit les plus belles * List, tab. perles, ce qui l'a fait nommer Mere-Perle *.10

2121. f. 56. & tab, 222.

588. Une très-belle Huitre des Indes, un Gualt. tab. 84. peu moins grande que la précédente, à robe écailleuse verd foncé, à bandes longitudinales blanches partant du fommet en forme de rayons, d'une très-belle nacre en dedans, blanche, excepté vers la circonférence où elle est jaunâtre, & sur les bords qui font d'un verd tirant sur le noir. Cette Coquille, qui du reste est semblable à la précédente, est nommée par Klein Mere-Perle stérile, & connue en France sous celui de *Arg. pl. 20. Pintade: celle-ci est très - grande dans son es-

lett. A. Lift. tab. 223 péce * . 12" F. 57. & 224. f. 58.

Gualt. tab. 84. litt. G.

589. Deux Pintades, dont une dépouillée. 590. Idem. 12.1.

591. Trois Pintades: sçavoir, deux d'Améique, différentes des précédentes en ce que les I. Fam. cailles de leur robe sont un peu saillantes, en HUITRES. orme de petites feuilles pointues très-serrées; & une des Indes, de couleurs très-vives, dont e sommet est verd d'éméraude. 37. 19.

592. Six Huitres: sçavoir, une Pintade des indes, différente des précédentes en ce qu'elle Ift de forme plus étroite & en demi - croissant; ine d'Amérique, rougeâtre, teinte de blanc vers la tête; un groupe de trois petites Pintades d'Amérique, sur une espéce d'Alcyonium; & deux valves de petites Meres - Perles, au dedans de chacune desquelles adhére une Perle ronde d'un bel orient, & d'une belle grosseur. 27.

593. Deux belles Huitres des Indes, à valves très-inégales entr'elles, à charniere montrant dans la valve inférieure une petite dent, avec un long fillon, & dans la supérieure une cavité qui reçoit la dent, & un petit filet qui engraine dans la rainure de l'autre valve, nommées l'Hirondelle ou l'Oiseau, à cause de leur forme, qui, lorsque la Coquille est ouverte, imite assez la tête, les aîles & la queue d'un oiseau : l'une est violet-noir en dessus, à aîles assez grandes, & à queue médiocrement longue *; l'autre est * Arg. pl. 19. canelle très-finement rayée de marron foncé, Gualt. tab 54à queue très-longue, à petites aîles & très-pe-lift. A.

I. FAM.
HUITRES.
*Rumph.tab.
44. litt. G.

tite tête*; toutes deux d'une très-belle nacre en dedans. 46.

594. Quatre Hirondelles: sçavoir, deux d'Amérique, semblables à la premiere de l'article précédent, à cela près que la nacre de l'une est d'un éclat un peu moindre, & que celle de l'autre est dorée: cette derniere est chargée de vermiculaires; une de Malthe, grise en dessus, blanche & nacrée en dedans, à queue courte, à tête presque de même grandeur, & à trèsgrandes aîles un peu arquées; & une petite des Indes, qui différe de la derniere de l'article précédent, en ce que la queue en est moins longue, la têre plus large, & le corps plus petit.

595. Une Huitre des Indes, rare, blanche nuée d'incarnat, à stries longitudinales sines & granuleuses, à coque mince, à valve inférieure arquée des deux côtés, & échancrée près de la tête, à charniere formée d'un très-petit silet de la valve inférieure, qui s'enchasse dans une légere rainure de la supérieure, & d'une entaille longitudinale dans la tête applatie des deux valves, laquelle est destinée à recevoir le ligament.

596. Une Huitre des Indes, rare, blanche nuée de fauve, à deux faces, l'une triangulaire, l'autre en demi-cœur allongé, presque planes, & à équerre dans la valve supérieure, convexes dans l'inférieure, contournées l'une sur 'autre, de maniere à se joindre, quoique peu exactement, à stries longitudinales partant du HUITRES. ommet . & à charniere formée d'un grand nombre de petites hachures ou entailles, rérnant dans presque toute l'étendue du sommet le chaque valve * : c'est l'Ostreum tortuosum, * Arg. pl. nommé en Hollande le Devidoir, & en France Rumph, tab. a Bistournée. 15."

Gualt tab.95.

597. Quatre petites Huitres oblongues blan-lit. B. thes teintes de rouge pâle, à stries longitudirales onduleuses peu prononcées, à coque mine un peu arquée, à une échancrure plus ou noins marquée au côté gauche de la tête, & à harniere composée d'une rangée de quatre à cinq dents ou entailles qui régnent dans toute a largeur du sommet applati de chaque valve; rois de forme plus ronde & plus platte, à charniere où l'on compte jusqu'à huit dents; un groupe de vingt autres de cette derniere espéce. liées ensemble par une espéce de Byssus; & deux des Indes, dont une revêtue de son épiderme, l'autre polie, toutes deux violettes, & à charniere comme les précédentes, mais composée de dix dents dans l'une *, & de quatorze dans l'autre: en tout vingt - neuf huitres nacrées, 227. f. 62. dont vingt-sept d'Amérique. 16."

598. Une Huitre des Indes, rare, violetnoir en dessus, nacrée en dedans, & où l'on I. FAM. HUITRE.

voit même des Perles, à deux branches à-peuprès d'équerre l'une sur l'autre, dont une étroite, courte & finissant en pointe, l'autre large, longue & arrondie à son extrémité, arquée dans son milieu, à charniere comme les précédentes, mais comprenant jusqu'à vingtquatre dents, espèce nommée en Hollande l'Equerre, & en France la Cuisse: celle-ci porte

*Rumph.
tab. 47. lit. I. plus de sept pouces de long *. 200" 3'.

Gual. tab. 97.
199. Deux Cuisses, dont une de l'espèce de litt. A.

Séba, pl. 91. la précédente, mais moins grande, & une plus n°. 6 & 7.

Valent. biv. rare en ce qu'elle n'a qu'une seule branche, fig. 3.

blanche vers le haut, violet soncé dans le reste,

& à charniere composée de douze dents. 60. 600. Une grande Huitre des Indes, ra e, & d'une belle conservation, violet-noir en dehors, plombée, brillante & nacrée en dedans, de la forme d'un T un peu plié & contourné, à charniere formée dans le milieu de la valve inférieure, d'une large dent triangulaire applatie, chargée elle-même d'autres très-fines, correspondantes à de petites cavités de même forme dans la valve opposée, & à prosonde échan-

crure dans les deux valves, destinée à recevoir * Arg. pl.19. le ligament, espéce nommée le Marteau * . 24 o Gual tab. 601. Un Marteau moins grand que le précé-96. séba, pl. 93. dent, & d'ailleurs un peu fruste. 76.

602. Un beau groupe de trois Huitres des Indes, rares, à robe marron clair granuleuse

& comme chagrinée, de forme presque ronde, == l larges plis disposés de maniere que les angles Huttres. aillans d'une valve s'enclavent exactement lans les angles rentrans de l'autre, à charniere formée d'un simple pli à peine visible, parallele au sommet de l'une des valves, & 'adapant avec le ligament dans un léger enoncement de l'autre valve, espéce nommée Trête de coq ou Oreille de cochon*. 100.1

603. Un autre groupe de trois Crêtes de coq Rumph. tub. emblables aux précédentes, à la couleur près 47. litt. D. ui en est violette de diverses nuances. 76.1.

604. Deux Huitres des Indes: sçavoir, une narron, de forme oblongue, à valve supéieure chargée dans son milieu d'une forte côte ongitudinale, plus faillante que large, à valve nférieure divifée par un fillon de même larseur que la côte opposée, & par où la Couille adhéroit à quelque branche, à larges plis x cannelures obliques naissant de la côte & du illon, & s'adaptant exactement d'une valve l'autre, à charniere comme dans la Crête de og, espèce nommée la Feuille *; & une Crête * Arg. pl. le coq lilas clair, à plis d'une de ses valves charrés de longues pointes applaties *. 17.

605. Deux Feuilles; dont une rose seche, le forme moins oblongue, à côtes & fillon plus arges que dans la précédente *, & une vio- 19. lett. F. ette de forme très-allongée, adhérente, ainsi Rumph. tab.

* Gualt. rab.

HUITRES.

que plusieurs valves d'Huitres de la même espéce, à une petite branche d'arbre. So.

606. Un groupe de deux Huitres des Indes, très-rares, & adhérentes l'une à l'autre, grises, de forme oblongue, à tête en pointe & ressemblante à un petit bec, à valves supérieure & inférieure, chargées comme celles de la Feuille, d'une côte & d'un fillon, à plis réciproques d'une valve à l'autre, semblables à ceux de la Crête de coq, mais beaucoup plus nombreux, & naissans, non de la tête, mais de la côte & du sillon; variété que M. d'Argenville dans sa

pag. 126.

*Arg. Conch. Conchiliologie * a jugé être non - seulement l'analogue marin du Rastellum (ou Rateau) fossile, mais l'unique qui eût été trouvée jusqu'alors. 120". 1.

607. Une grande & belle Huitre des Indes, rare, marron fale, de forme ronde, à grands plis réciproques d'une valve à l'autre comme ceux de la Crête de coq, dont elle ne différe qu'en ce qu'elle est de forme plus bombée, & que les valves en sont composées de divers feuillets placés l'un fur l'autre, qui dans le tranchant des plis, s'allongent en forme d'épines

* Arg. App. tuilées *. 150.1.

pl. 3. lett F. Rumph. tab.

608. Un groupe de trois Huitres des Indes, Gualt. tab. & rares, grises nuées de verd de diverses nuances, à valve supérieure applatie, rabotteuse par ondes vers la tête, feuilletée vers le bas, &

inférieure

inférieure fort profonde, se terminant en pointe recourbée en dessous vers le sommet, & garnie I. Fam. de grosses côtes longitudinales tuilées, de couleur blanche en dedans, excepté vers les bords qui sont violet - noir, & plissés comme dans la Crête de coq, mais moins fortement, à charniere formée de stries nombreuses très-fines, & d'un ligament s'étendant dans toute la largeur du sommet de l'une & l'autre valve, espèce nommée Corne d'abondance. 38

609. Une grande Corne d'abondance, à prolongement de la tête hors de la valve inférieure, se portant plus loin que dans les précédentes. 6.

610. Un groupe de trois Huitres des Indes, fauve-blanc & rose séche, oblongues, à coque formée de divers rangs de seuilletures papyracées, à valve inférieure en sorme de cuiller trèsprosonde, & supérieure convexe en dedans, à charnière comme dans la Crête de coq, & une Corne d'abondance. 7.3.

611. Neuf Huitres des Indes: sçavoir, deux couleur de rose teint de lilas vis, de sorme demicirculaire, à valve supérieure platte, & insérieure un peu courbée à équerre vers ses bords, toutes deux à côtes qui sinissent en plis réciproques comme dans la Crête de coq, dont elles ont aussi la charnière, & de l'espèce nommée Corbeille*; une grise en dessus, rose sale en dessous, * Gualt, tabs de forme oblongue arquée vers les deux extré-104. litt. D.

Tome I.

I.FAM. HULTRES.

mités; une blanc sale veiné de marron, de forme un peu triangulaire, & à grosses côtes longitudinales finissant en plis réciproques d'une valve * List. tab. à l'autre *; trois petites de forme presque ronde, 197. fig. 32. à côtes & plis réciproques comme les précédentes, mais à charniere formée de trois dents, qui engrainent dans autant de cavités correspondantes : l'une est blanche & adhére à un brin de madrepore, les deux autres sont blanches, marbrées sur les côtes de violet soncé, l'une desquelles adhére à un tuyau vermicu-*Gualt. tab. laire *; une Feuille gris-verdâtre, à côte large,

99. litt. E.

& une Corne d'abondance. 16.10. 612. Deux Huitres des Indes en pendant blanches & fauve-rougeâtre, de forme oblongue, à valve supérieure arquée vers le dedans, & inférieure composée de trois plans, dont les deux latéraux portent presque à plomb sur celui du milieu, à intérieur de la Coquille violet foncé, blanc, & verd-jaunâtre jouant l'opale, & à charniere comme celle de la Corne d'abondance, à cela près que l'un & l'autre bord de la valve supérieure est de plus garni de sept à huit dents, qui engrainent dans autant de cavités de la valve inférieure. 6.12.

613. Une grande Huitre de la Virginie, rare, quoique d'espéce commune, verdâtre en dehors, blanche en dedans, à l'exception de l'endroit où étoit attaché l'animal, qui est violet obscur, à charniere semblable à celle des précédentes, & de forme allongée très-étroite, ce I. Fam. qui lui peut faire donner le nom de Pirogue*: Huitres.

** List. tab.
une de ses valves est chargée d'une petite Huitre 200. fig. 34.
de même espèce. 12**

d'espéce commune, remarquables par leur grandeur, blanc sale en dehors, blanches en dedans à l'exception d'une grande tache violet-noir sur chaque valve, comme dans la précédente: elles ne différent de celle qui est représentée dans Lister*, que par leur forme plus large & moins allongée. 3.718.

* Ibid. tab.

615. Vingt & une Huitres de différentes grandeurs: fçavoir, deux blanches papyracées adhérentes à des moitiés de Moules violettes; trois d'Amérique, grisâtres, à coque mince formée de plusieurs couches seuilletées; une grande de même espéce, qui a adhéré par fa valve inférieure à quelque grosse branche, & dont les deux valves sont en conséquence arquées, conformément au corps que celle du dessous a embrassé; deux petites des mêmes Mers, violet obscur, de forme applatie, à stries longitudinales, & à valves très-minces; une de forme semblable, mais dont la valve supérieure est ornée de deux larges rayons blancs; quatre petites des côtes de Bretagne, blanches, papyracées, transparentes comme le tale, de la for-

I. FAM. Huitres.

me d'un demi - cœur, & à valve sapérieure platte; un groupe de trois des mêmes Mers, violet-noir & lilas, semblables pour la forme à celles de l'article 610; deux groupes, l'un d'une Huitre rabotteuse marbrée de blanc, de grisâtre & de lilas, chargée de trois glands de mer, l'autre de deux rabotteuses gris de lin, & silas nué de blanc; une Corbeille, & une Huitre de l'espèce de deux de l'article 612: toutes, excepté celle-ci, ont la charniere comme la Crête de coq.

616. Une branche de Manglier à trois jets, chargée de petites Huitres oblongues d'Amérique; une grosse masse de terre glasse verdâtre, desséchée & durcie, sur laquelle sont groupées plusieurs grandes Huitres despéce commune, avec des vermiculaires; & treize Huitres, ou groupes d'Huitres de nos Mers, de sorme très-

* Gualt. tab. variée *. 6.1.

* Gualt. tab. 202. lit. A. B.

617. Une grande Trompe marine montée sur un pied, chargée de plusieurs Huitres de l'espéce des premieres de l'article 610; un trèsgros groupe d'Huitres communes, de Pétoncles, de Vermiculaires, d'Éponges, & d'autres Polypiers. 7

618. Deux groupes, dont un très-joli, formé d'un grand nombre de petites Huitres d'Amérique, papyracées, blanches mêlées de fauve, de violet & de jaune, adhérentes à une branche de Manglier, & montées sur un pied; & l'autre d'Huitres communes, adhérentes avec I. FAM. quelques vermiculaires à un petit vase de terre Huitres, cuite. 17.

619. Une Bouteille de verre, sur laquelle sont groupées des Huitres d'espèce commune, un Pétoncle, des Vermiculaires, &c. 17.

GENRE SECOND.

HUITRES FEUILLETÉES.

620. NE Huitre des Indes, nommée Gàteau feuilleté, & très-grande dans son espéce:
el'e est blanche, de forme ronde bombée, à
feuilles circulaires prosondément découpées, &
recouvrant les deux valves, dont la supérieure
est ornée de trois bandes longitudinales un peu
courbes, couleur de rose, à charniere formée
dans chaque valve, d'une double moulure,
dont la plus grande est garnie de petites dents,
qui s'engrainent réciproquement, ainsi que les
moulures, dans les cavités correspondantes des
deux valves *: cette charniere est la même
dans toutes les Huitres de ce genre. 48 5

*Arg. pl. 20.
Séba, pl. 22.

621. Un Gâteau feuilleté un peu moins Rumph tabe grand, mais dont les rangs de feuilles sont Valentyn bie vale f. 40

T iij

COQUILLES BIVALVES , 294. dans l'une & l'autre valve, d'une belle couleur de chair. 57. HUITRES. 622. Deux Huitres d'Amérique, l'une jonquille, l'autre lilas, toutes deux vives en couleur, à plusieurs rangs circulaires de petites feuilles tuilées, plus longues dans les rangs inférieurs, à dédans des valves mêlé de pourpre, & nommées simplement Huitres feuilletées : la violette adhére à une petite branche de Madrépore oculé blanc. 7. . 623. Un beau groupe de cinq Huitres feuilletées, dont trois grandes, l'une jonquille, l'autre lilas, & la troisieme comme panachée de ces deux couleurs, & deux petites, dont une jonquille, & l'autre couleur de chair. 13.3 624. Deux groupes d'Huitres feuilletées: sçavoir, un formé de deux Huitres, lilas, adhérentes à une portion de grosse branche de Manglier, & le second, de deux petites lilas sur une grande jonquille nuée de lilas. 6.,5 625. Quatre Huitres feuilletées : sçavoir, deux grandes & deux petites lilas, & deux valves d'autres de même espéce, la premiere jonquille, la seconde blanche, groupées sur une très-belle Arche de Noé fasciée de canelle & d'incarnat. Plus, un groupe de deux autres,

dont une lilas, & l'autre jonquille nuée de lilas. 626. Deux jolis groupes d'Huitres feuilletées: sçavoir, un de deux grandes lilas, & l'autre de

fix, quatre desquelles sont jonquille, une lilas, & une très-petite blanche. 9".10!

627. Deux autres groupes d'Huitres feuille-Huitres. tées: le premier composé d'une jonquille & d'une lilas clair; & le second de trois, dont une jonquille nuée d'incarnat & de lilas, une fimplement jonquille, & l'autre lilas. 17.3.

628. Cinq Huitres feuilletées : sçavoir, une jonquille nuée de violet, adhérente à une branche de Madrépore oculé; une blanche engagée dans une valve de Vieille ridée; une citron nuée de blanc & de pourpre, à feuilles étroites & pointues en forme d'ergots *; & deux lilas, dont une petite semblable à une fleur de luzerne. 88. nº. 8.

629. Trois groupes d'Huitres feuilletées: scavoir, le premier d'une lilas & d'une petite blanche sur une Arche de Noé reticulée; le fecond d'une Huitre jonquille nuée de ilas, d'une litas, & d'une Feuille de la variété de la feconde de l'article 605, sur une branche de Madrepore; & le troisieme d'une Huitre lilas, & de quelques vermiculaires sur une branche de Manglier. 24.7.

630. Deux jolis groupes d'Huitres, & deux Huitres isolées : scavoir, le premier groupe formé d'une Huitre feuilletée lilas, & de deux lisses, l'une blanche, l'autre marron, de l'espèce des dernieres de l'article 597; le second de deux Huirres feuilletées, dont une jonquille, & l'au-

I. FAM. Huitres. tre lilas, & d'une Huitre lisse, de l'espèce de la derniere du groupe précédent: les deux Huitres isolées sont petites, blanches, mais rares, à valve inférieure très-convexe, sur laquelle on remarque six rangs de seuilles circulaires plissées en forme de manchettes de semme, & à valve supérieure en forme de cœur, platte, chargée de plusieurs rangs de seuilletures couchées. 6 h

63 1. Quatre petits groupes d'Huitres seuilletées: sçavoir, une jonquille sur un Astroite; une jonquille vers la tête, lilas dans le reste, adhérente à une Moule verte striée; deux l'une sur l'autre blanches nuées de couleur de rose & de cérise, toutes deux à stries longitudinales; & trois, dont une lilas, une citron, & une blanche nuée de lilas sur une Arche de Noë réticulée. 7.

632. Trois jolis groupes, dont un de deux Huitres feuilletées lilas; un de trois autres, dont une blanche & deux jonquille nuées de lilas, & le troisieme d'une blanche nuée de lilas, non nettoyée, & telle qu'elle est sortie de la mer, formant une espèce de bouquet sur une branche de Madrepore oculé gris. 12

633. Cinq Huitres feuilletées: sçavoir, une très-grande jonquille, à feuilles circulaires, plissées & couchées l'une sur l'autre, & logeant dans l'épaisseur de sa valve supérieure une Pholade blanche; & les quatre autres groupées, dont

ine jonquille nuée d'incarnat, dans le dessous le laquelle est nichée une petite Pholade maron, nommée Sapotille; trois Huitres lilas, HUITRES, & une petite jonquille. 6.

634. Six Huitres feuilletées : sçavoir, une canelle foncé, marbrée en quelques endroite de blanc, & à trois rangs longitudinaux un peu courbes de feuilles tuilées se couvrant l'une 'autre; une blanche papyracée, à valve supérieure applatie; deux jonquilles nuées de lilas, adhérentes l'une à une valve d'Huitre lisse, l'autre à une branche de Madrepore gris ; & deux lilas. Plus, quatre valves inférieures d' Huitres, cerise vif nué de blanc, à tête contournée comme la Gryphite, & nommées communément Huitres de la Mer Rouge, valves qu'on trouve presque toujours isolées, & qui paroissent avoir perdu leurs feuilles par le frottement. 6.

* Gualt. tab. 101. lit. D. E.



GENRE TROISIEME.

HUITRES ÉPINEUSES.

HUITRES.

635. UNE Huitre épineuse des Indes, rare & de la plus belle conservation, à valve sup rieure blanche ponctuée de lilas vers la tête lilas dans le reste, à stries longitudinales, se rées & hérissées d'épines plus ou moins longue fines & recourbées, à valve inférieure mi-pa tie de grosses épines citron, & de larges feuille couleur de rose, à tête prolongée, sormant u plan triangulaire marqué dans son milieu d'u trait longitudinal noirâtre, & dont le fomme se recourbe en dessous, à deux petites oreille situées aux deux côtés de chaque valve, à char niere composée de quatre dents, dont deu grosses & deux petites, s'engrainant dans le cavités réciproques des deux valves, & à bore * séba, pl. intérieur orangé-brun *, espéce nommée Spon

89. nº. 1-4. dile, ainsi que les suivantes, qui, quoique très variées, lui sone d'ailleurs semblables par la forme de la tête & de la charniere. 150-

636. Une Huitre épineuse différente de la précédente par ses stries moins serrées, & par fes épines citron, grosses & applaties sur un

* Ibid. pl. fond lilas *. /20."

88. nº. 3.


637. Une Huitre épineuse de l'espèce des précédentes, à robe, épines & seuilles lilas I. FAM. clair, & à tête blanche ponctuée de lilas. 1991.

638. Une qui différe des précédentes en ce que la valve inférieure est blanche vers la tête, prangée dans le reste, & la supérieure mêlée de planc & de couleur de rose: les épines de cette valve sont aussi plus courtes & plus étroites *. * Séba, plus Les Hollandois ont donné à ces Coquilles le *8. n°. 2. nom de Castagnettes. 15.

639. Une Huitre épineuse des Indes, dont la valve supérieure est mi-partie blanche & violette, & dont presque toutes les épines sont orangé soncé: la valve inférieure est platte dans plus de la moitié de son étendue, pour voir adhéré à quelque corps étranger.

640. Une autre à valve supérieure blanche, bordée dans les deux tiers de sa circonsérence, & ponctuée vers la tête de brun, à épines très-courtes, à valve insérieure chargée dans sa moitié gauche de petites épines blanches, de grandes épines & de seuilles jaune soncé, & adhérente par l'autre moitié à deux astroites, l'un à grandes, l'autre à petites étoiles, au premier desquels adhére aussi une petite Huitre blanche non épineuse. 22.2.

641. Une Huitre épineuse des Indes, rare, dont la robe est totalement orangée, ainsi que



t de lilas, garnie d'épines peu nombreuses & etitec, à valve inférieure blanche & couleur I. FAM. e chair, recouverte d'un grand nombre de rosses épines plus ou moins larges, & à tête ès-grosse recourbée en dessus en forme de bec e perroquet *. 3."

* Arg. pl. 194

648. Une grande & belle Huitre épineuse lett H. es Indes, de forme très-renflée, à valves lie e vin, à fix rangs longitudinaux, & également istans les uns des autres de grosses stries charées d'épines longues & larges, à stries fines ntermédiaires d'où naissent aussi quelques petes épines, à tête orangée, & recourbée comne la précédente. 30. 2.

649. Un groupe en forme d'arcade de deux Juitres épineuses des Indes, blanches, à stries hargées de grandes épines applaties, à canneures peu profondes marbrées par hachures ransversales fines & en zig - zag d'amaranthe oncé*. 40.3.

650. Une Huitre de l'espèce, & à-peu-près 88.11°. 9. les mêmes couleurs que celles de l'article précédent, adhérente à une pierre verdâtre. 20. 3.

651. Un groupe de deux Huitres épineuses les Indes, blanches & amaranthe, à valves chargées de peu d'épines, d'une moitié de même espéce, & d'une Huitre-feuille blanche & gris de lin, adhérentes à une pierre noirâtre. /2".

652. Deux Huitres épineuses des Indes

I. FAM. HUITRES.

C8. 10. 4.

adhérentes chacune à un caillou ; sçavoir, une blanche, à neuf rangs de groffes stries longitudinales chargées d'épines courtes & larges , à stries fines intermédiaires, amaranthe clair, chargées de très-petites épines de même cou-* Séba, pl. leur *, & une de la variété de celles de l'article

649, à valve inférieure garnie de feuilles, & supérieure épineuse, à laquelle tient une valve de l'Huitre-feuille. 12".

653. Trois Huitres épineuses de moyenne grandeur; sçavoir, deux blanches, marbrées d'amaranthe pâle, adhérentes à une pierre, & une aurore foncé, à pointes peu nombreuses,

mais longues & applaties. 19.1.

654. Un groupe de deux belles Huitres des Indes, blanches, marbrées par traits en zig-zag d'amaranthe clair, d'orangé & de rose vif en quelques endroits, à grandes épines blanches dans l'une, couleur de rose dans l'autre, & inclinées vers le bas, à prolongation du fommet de la valve inférieure blanche, & s'étendant fort au loin, espèce nommée par M. d'Ar-*Arg. pl. 20, genville le Pied d'âne *. 66."

\$8. nº. 7.

655. Deux Huitres épineuses des Indes, dont une blanche tachetée dans ses cannelures de fauve roux, à un grand nombre de longues * séba, pl. épines, larges sur-tout vers le bas *, & une à larges bandes alternatives blanches & violetnoir, des premieres desquelles naissent quelques

ines peu longues, mais larges & de même uleur. 9."

I. FAM. Huitres.

656. Idem, avec cette différence que les ines de la seconde Huitre sont nombreuses, plûpart applaties, couchées sur leur valve, comme repliées. 30.7.

657. Deux Huitres épineuses des Indes, nt une blanche à stries longitudinales grosses sines, celles-ci amaranthe, & celles-là gar- se d'épines, dont une grande partie, sur-tout res le bas de la Coquille, s'élargit en forme feuilles accouplées, & quelquesois triplées ne sur l'autre, frisées & tortillées; & une unche nuée & veinée par traits en zig-zag is de lin, armée de longues épines applaties ne les bords des deux valves, & recouverte ne le haut de la valve inférieure, par une lve d'autre Coquille de la famille des Cœurs. 1843.

658. Trois autres, dont une semblable à la emiere de l'article précédent, à cela près que épines en sont moins longues, plus serrées unes sur les autres, & plus tortillées; une anche à traits en zig-zag nombreux imitant le int d'Hongrie, & d'un bel amaranthe, à épis longues & blanches, excepté quelques-unes rs la tête, qui sont violettes, courtes & ramases; & une blanche tachetée des mêmes couars que les précédentes, à valve inférieure

I. FAM. Huitres. feuilletée, & supérieure garnie de petites épines nombreuses. 22"

659. Trois autres ; sçavoir, une rouge-sanguin, à stries fines & serrées entre les grosses qui donnent naissance à des épines peu nombreuses & peu élevées ; une blanc-sale, veinée dans les cannelures d'amaranthe, à épines peu longues & applaties, dont quelques-unes sont souci; & une blanche veinée & tachetée de rouge soncé, sur-tout vers le bas, où elle n'a que fort peu d'épines.

660. Trois Huitres épineuses des Indes, dont deux en pendant de la variété de la derniere de l'article précédent, mais plus chargées d'épines; & une couleur de cérise, à stries inégales, les plus grosses veinées de blanc, donnant naissance à de grosses épines, dont quelques-unes sont assez longues, & à tête recourbée en-dessus en forme de bec. 25.7.

661. Une Huitre épineuse d'Amérique, très rare & très-belle, couleur de rose marbré de blanc, à grandes épines incarnat s'élargissant à leurs extrémités, où elles forment autant de seuilles déchiquetées, à tête garnie, comme celles des Indes, de deux oreilles, & nommée Huitre à feuilles de persil*. 240.

* Seba, pl. \$3. n°. 10.

662. Une Huitre à feuilles de persil, à tiges de seuilles plus longues, & seuilles moins lar-

ges que celles de la précédente, & à la valve inférieure de laquelle adhére un petit Buccin de l'espèce nommée Mûre; elle est représentée dans HUITRES. Séba avec le même accident *. 72.5?

663. Une autre plus grande & plus bombée, 89. n°. 5. à longues feuilles blanches & incarnates, sur un fond couleur de rose *. 42 .1.

* Arg. pl. 194

664. Une grande & belle Huitre d'Amérique, à robe nuée de couleur de rose, d'incarnat & de blanc, à valve supérieure presque platte, armée dans ses stries de six rangs d'épines longues & plattes, entre lesquels s'en trouvent plusieurs autres d'épines courtes & aigues, à valve inférieure très-bombée, striée aussi suivant sa longueur, & chargée partie d'épines, partie de feuilles minces & très-larges incarnates, entre lesquelles est engagée une petite branche de Madrépore oculé. 30.

665. Une autre semblable à la précédente de couleurs plus vives encore, & armée d'un plus grand nombre de petites pointes. 17. 1.

666. Une de même espéce, mais où le blanc domine davantage, à feuilles de la valve inférieure très-nombreuses, entre lesquelles, outre le Madrépore oculé, est engagée une valve d'Arche de Noë blanche. 9."

667. Une autre différente des précédentes. en ce que la plûpart des épines sont plus grandes & plus larges, & amaranthe vif, que la tête

Tome I.

I. FAM. HUITRES. len est vermillon, que la valve inférieure, au lieu d'être bombée, est au contraire un peu applatie, & que les bords de cette valve se replient en dehors. 18.3.

668. Un groupe de deux Huitres épineuses d'Amérique, blanches nuées de rouge & à tête

aurore. 18.1.

669. Une très grande & très belle Huitre d'Amérique, blanche nuée de couleur de rose, à tête citron, & à très-longues épines couleur de rose. 30.13.

670. Une autre où le couleur de rose domine davantage, même sur la tête, & à grandes épines, moins longues que dans la précédente. 1871.

671. Une très-grande Huitre d'Amérique; blanche, teinte en quelques endroits d'incarnat; à tête aurore, & hérissée, tant en dessus qu'en dessous, d'épines larges & très-longues. 13.

672. Une semblable un peu moins grande.

673. Trois Huitres de l'espèce des précédentes; sçavoir, une à valve supérieure cramoisi nué de blanc, & insérieure blanche teinte de jaune, bordée de rouge, tenant entre ses séuilles une branche de Madrépore oculé gris; & deux petites à peu près semblables, dont la moindre est engagée entre deux Tuyaux vermiculaires. 6.

674. Trois autres, dont une à valve supérieure bombée, blanche & couleur de rose, &

inférieure recourbée en dessous, rose séche & aurore vif sur-tout vers la tête, à très-lon- I. FAM. gues épines, dont quelques-unes se couchent HUITRES. & s'engagent en partie dans les feuilles du bord; une petite à valves blanches vers les bords, & vermillon près de la tête; & une autre petite nuée de rouge & de blanc, adhérente à une branche de Madrépore oculé. 7.16.

675. Une grande Huitre épineuse d'Amérique, nuée de blanc & de cramoifi, à tête aurore, & longues épines couleur de rose. 24.

676. Une autre très-belle, blanche, à tête aurore, & à épines larges, fort longues, un peu recourbées en dedans. 24".

677. Une autre moins grande, blanche, à tête cérise, à piquans nués de couleur de rose; & adhérente à une valve d'une autre Huitre chargée de Vermiculaires & qui lui sert de pied. 7. 6.

678. Une grande & belle Huitre épineuse d'Amérique, blanche vers les bords, nuée d'aurore & de rouge vers la tête, à stries très-serrées, à épines grandes & petites plus nombreues, mais moins longues que celles des précédentes, & à intervalles des feuilles de la valve inférieure remplis de petites branches de Madrépore oculé blanc: 12.2.

679. Une autre blanche, à tête orange vif, à épines de la valve supérieure peu longues

Vii

I. FAM. Huitres. excepté vers les bords, & celles de la valve inférieure couchées & entrelassées avec les seuilles, auxquelles adhérent plusieurs petites branches de Madrépore oculé. 6."

680. Une semblable, à grosses épines plus nombreuses. E. 19.

681. Idem. 6 . 2.

682. Une très-grande Huitre épineuse de la Méditerranée, à valve supérieure pourpre, & inférieure blanche, à stries longitudinales très-ferrées & hérissées d'épines, les unes plus grandes, s'élargissant vers le haut, les autres plus petites & rondes, & à valve inférieure chargée de quelques seuilles qui naissent entre les épines, où adhérent des Vermiculaires, & quelques Escares. 5.

683. Une autre un peu moins grande, à feuilles de la valve inférieure plus nombreuses, & épines teintes de pourpre. 6-13-

684. Un groupe de deux Huitres épineuses de la Méditerranée, à valve supérieure veinée de pourpre clair & de blanc, & inférieure blanche, hérissée d'épines plus grandes & plus nombreuses que la supérieure.

& lilas, chargée de nombreuses épines fines & grosses de même couleur, dont la plûpart de celles ci sont applaties, & à valve insérieure

blanche, presque entiérement seuilletée & un ;

I. FAM.

686. Deux autres en pendant, à valves su-Huitres, périeures veinées d'un pourpre très-vis. 5.


687. Deux autres à valve supérieure totalement pourpre dans l'une, blanche veinée de

pourpre dans l'autre. 4".S.

Méditerranée, dont une à valve supérieure pourpre soncé, & inférieure blanche, seuilletée de souci, remarquable en ce que la plûpart des épines de la valve supérieure y sont couchées et comme colées sur cette valve; & une dont la valve supérieure est blanche, ponctuée le long des stries de pourpre, & à épines peu nombreuses de cette derniere couleur.

689. Trois autres de moyenne grandeur; sçavoir, une dont la valve inférieure se releve, à équerre sur la supérieure, en sorme de corbeille, & dont les bords de celle-ci, recourbés en dehors, s'emboîtent exactement en sorme de couvercle dans la cavité de l'inférieure; une adhérente à un groupe de Vermiculaires & de Tubipores; & une à seuilles de la valve inférieure souci.

690. Une grosse Pierre d'environ un pied de haut, sans le support, revêtue de concrétions marines, & à laquelle adhérent trois Huitres épineuses de Malthe, dont une sort grande, des



GENRE QUATRIEME.

ANOMIES OU TÉRÉBRATULES.

692. UNE Anomie des Indes, très-rare, verd-noirâtre, à stries longitudinales très-fines, à avance de la valve inférieure sur la supérieure, en bec de perroquet, ce qui lui en à fait donner le nom, à trou triangulaire formant le dessous de ce bec, à charniere composée dans la valve inférieure de deux petits crochets, qu'embrassent des sinus correspondans de la valve supérieure, & à deux petits appendices intérieurs fixés vers le haut de celle ci *. Cette *Arg. pl.236

Coquille est des plus grandes que l'on connoisse lett. O, dans cette espèce. 100 2

693. Un autre Bec de perroquet un peu moins grand que le précédent. 86"1.

694. Une Anomie de Mahon, lisse, blanche tirant sur le verd d'eau, papyracée, à avance de la valve inférieure sur la supérieure moins faillante que dans la précédente, à trou rond formant le dessus de cette avance, à large applatissement longitudinal dans le milieu de la même valve, mais peu prononcé sur-tout vers le bas, à charniere & appendice intérieur comme

VIV

I. FAM.

dans la précédente, & nommée Coq & Poule ou Poulette *: elle est grande dans cette espèce. Huitres. & tient par un petit nerf à une valve d'autre pl. 3. lett. E. Anomie de même espéce. 5.1

> 695. Deux Poulettes blanches moins grandes que la précédente, dont une tient par un petit nerf à un brin de Corail rouge. 15.5.

> 696. Une grande Anomie des parages voisins du détroit de Magellan, blanche, à stries longitudinales, à trou du sommet rond & fort grand, à large élévation longitudinale en forme de carêne dans le milieu de la valve inférieure, à charnière peu différente des précédentes, mais montrant deux appendices latéraux longs & étroits partant du sommet de la valve supérieure, s'étendant vers le milieu de la même valve, où ils sont assujettis de nouveau par deux petits ligamens, pour se recourber ensuite vers la tête d'une façon trèssinguliere. Cette Coquille porte un pouce sept lignes de diametre. 20.1.

> 697. Une Anomie Magellanique qui peut servir de pendant à la précédente. 15.4.

> 698. Deux autres en pendant dont une Magellanique, & l'autre de la variété de l'article 694, mais moins grande, 25".

> 699. Treize Anomies : sçavoir, deux petites de Mahon, rares & en pendant, jaune-blond, transparentes, à stries circulaires presqu'im

perceptibles, à valve inférieure fort concave, & supérieure plus platte, débordant l'infé- I. FAM. rieure dans un grand triangle curviligne en for-HUITRES. me de lampe du côté de la tête, à petite queuë forée, & à deux espéces de petites aîles. Ces Coquilles sont du diametre d'un gros pois, & imitent assez la forme d'un Scarabée, ce qui leur en peut faire donner le nom; quatre autres beaucoup plus petites, qui différent des précédentes en ce qu'elles sont sans stries, que la valve inférieure en est moins concave, & qu'au lieu de deux aîles, on y voit deux tuyaux latéraux à-peu-près égaux, & semblables à celui du milieu qui forme la queue; deux petites de la Méditerranée, blanches, de forme ovale, peu convexes, à trou rond, & à stries longitudinales partant du sommet *; deux autres blanc *Gualt. tabi fale, à deux espéces de petites oreilles près du 96. litt. B. trou du sommet, à stries longitudinales & circulaires très-fines, & à appendice intérieur en forme de gouttiere, tenant au sommet & au milieu de la valve supérieure *; une très-petite * Ibid. lit. A. de même espéce, mais à stries moins serrées; une Magellanique & un Bec de perroquet, 50.1. 700. Idem. 50.10!



SECONDE FAMILLE.

PEIGNES.

II. FAM. PEIGNES. ou moins applatie, qui ne différent des Huitres du troisieme genre qu'en ce que leurs côtes ou stries longitudinales font dépourvues d'épines, & que le sommet de leur valve inférieure ne se prolonge, ni ne se recourbe en dehors. Leurs caracteres généraux sont d'avoir le sommet comme coupé en ligne droite, d'aller ensuite en s'élargissant insensiblement pour prendre une sigure arrondie, & d'être ordinairement pourvues d'oreilles. Nous les diviserons en trois genres; sçavoir,

1°. Les Peignes à oreilles égales & à charnière composée 1°. d'un ligament à ressort placé dans une cavité qui occupe le milieu du sommet de chaque valve; 2°. d'un petit silet transversal

de la valve supérieure, se logeant dans une rainure correspondante de la valve PRIGNES, inférieure. On nomme vulgairement les Coquilles de ce genre, Pélerines ou Coquilles de Saint-Jacques.

2º. Les Peignes à oreilles inégales, à charniere comme les précèdens, à valves supérieure & inférieure convexes, & nommés plus particuliérement Pétoncles.

3°. Les Peignes sans oreilles & à charniere formée d'un petit applatissement en forme de triangle obtusangle isoscele, sur lequel est placé le ligament, & de plusieurs petites dents rangées de part & d'autre en forme d'arc dans l'une & l'autre valve.



GENRE PREMIER.

PEIGNES A OREILLES ÉGALES.

PEIGNES.

701. Un grand Peigne rare, quoique de nos mers, à valve supérieure blanche & platte, chargée de feize côtes longitudinales tachées de rouge de diverses nuances, & d'autant de larges & profondes cannelures blanches, à valve inférieure convexe presque entiérement blanche, chargée de côtes plus larges que celles de la supérieure, & dont la plûpart contiennent * Gualt. tab. quatre stries de même direction *. 36.

99. litt. A. B.

702. Dix Peignes par pendans : sçavoir, deux très-grands, à valve supérieure marbrée de blanc & de rouge, & inférieure blanche, à deux zônes nuées d'orangé, d'aurore & de citron dans l'un, blanche nuée de jaune dans l'autre, tous deux à larges côtes & profondes canne ures, chargées de stries longitudinales & transversales, mais dont celles-ci sont plussenfibles dans le fecond, & celles-là dans le pre-* Gualt. tab. mier *; deux blancs, & quatre marbrés de 98. litt, A. B. blanc & de diverses belles nuances de rouge & de jaune, de la variété des deux premiers de cet article, & deux de celle de l'article précédent, mais plus petits, & qui en différent d'ailleurs en ce que le fond en est rose séche. 26.19. II. FAM.

703. Deux Peignes d'Amérique, à valve inférieure très-convexe, & supérieure un peu concave, chargées l'une & l'autre en dehors de stries applaties peu marquées vers la tête, & en dedans de paires de stries peu sensibles aussi vers le haut, espéce nommée Bénitier, l'un desquels est peu commun en ce qu'il est entiérement blanc, l'autre n'a que la valve inférieure qui soit blanche, la supérieure est lilas marbrée de fauve & de brun. 27. 12.

704. Deux Bénitiers, à valve supérieure marbrée de rouge-brun, de violet & de gris, & in-

férieure fauve nuée de blanc. 6"

705. Deux Peignes des Indes en pendant, lisses en dehors, à stries longitudinales intérieures peu serrées, à valve supérieure rose séche en dehors, rayonnée de lignes longitudinales rouge - brun, & en dedans blanche, bordée de lie de vin, à valve inférieure totalement blanche, à coque mince, & de forme très - peu bombée, quoiqu'également dans chaque valve, espèce nommée Sole ou Eventail *. 24.1.

706. Une Sole des Indes de quatre pouces 24. lett. G & demi de diametre, à valve supérieure veinée 45. litt. A. B. Bonan. cl. 3. en dehors par cercles alternatifs de rouge-brun fig. 354. de diverses nuances & de blanc, à rayons blancs peu prononcés, & en dedans blanche

Il. Fam. Peignes.

bordée de citron, à valve inférieure blanche nuée de citron en dehors, & femblable en dedans à la supérieure, variété que l'on nomme Sole de la rare espèce. 115.

707. Une Sole de l'espèce de celles de l'article 705, mais rare en ce que sa valve supérieure est parsemée vers les bords de taches grandes & petites ventre de biche, & que l'inférieure est pareillement tachée d'un blanc plus mat que le sond, variété que l'on nomme Sole marquetée. Su'.

708. Deux autres variétés de Soles rares, l'une à valve supérieure rouge-brun, rayonnée sur-tout vers le haut de faisceaux jaunes, & de lignes brunes en dehors; bordée de pourpre en dedans, à valve inférieure comme les précédentes; & l'autre à stries longitudinales intérieures très-serrées, à valve supérieure rouge-sanguin; & inférieure nuée par zônes de blanc & de couleur de rose de diverses nuances.

709. Deux Peignes d'Amérique en pendant, lisses en dehors, à stries longitudinales intérieures bien prononcées, à valve supérieure platte, rouge-brun en dehors, blanche tachée d'orangé-brun en dedans, & inférieure concave, blanche tant au dedans qu'au dehors dans l'un, fauve nuée de blanc dans l'autre. Cette espèce de Peigne que nous connoissons

depuis peu, est de forme moyenne entre celles de la Sole & du Bénitier. 17

II. FAM.
PERGNES.

710. Un Peigne Magellanique rare & trèsgrand, mais un peu dégradé, à robe nuée de blanc & de couleur de tuile en dessus, blanc nué d'incarnat en dessous, à stries longitudinales fines & serrées, à valve supérieure applatie, & inférieure un peu bombée, toutes les deux nacrées en dedans. 18.

GENRE SECOND.

PEIGNES A OREILLES INÉGALES

N grand Peigne d'Amérique, ponceau vers la tête, rouge-brun dans le corps, à stries longitudinales partie blanches, partie du sond, à grosses côtes comprenant chacune plusieurs de ces stries, & chargées en outre de tubercules disposés par zônes, qui dans la valve supérieure sont quelquesois en sorme de tuiles arrondies, dentelées & relevées, à stries transversales très-sines & très-serrées, espèce que la ressemblance de sa couleur avec celle du corail, a fait nommer Coraline*. 47.

† *Arg. pl. 24. 712. Une Coraline un peu moins grande & lett. F. Séba, pl. 87. d'un rouge plus brun que la précédente.

II. FAM. PEIGNES. \$7. n°. 3 & 4.

17.

na. 8-12.

713. Une autre de moyenne grandeur, a valve supérieure, d'un beau rouge-sanguin, * Séba, pl. & inférieure couleur de rose vif *. 46.

714. Une autre à valve supérieure rougefanguin, teinte en quelques endroits de blanc & de rose séche, & à valve inférieure couleur de rose, blanche & aurore. 48#2

715. Une Coraline de moyenne grandeur, & tres - care en ce qu'elle est entiérement au-

rore. 29.1.

716. Deux Peignes, dont un rare d'Amérique blanc en dehors, jonquille & violet en dedans, à neuf côtes dans la valve supérieure, & dix dans l'inférieure, chargées de tuiles plus ou moins recourbées en dessous, à oreilles trèsinégales chargées elles-mêmes de petites tuiles, * Ibid. n°. espèce nommée Pélerine tuilée * ; & un des

Indes, marbré en dehors par zônes ondées interrompues vers le haut, d'amaranthe & de blanc, bordé en dedans d'aurore & de cramoisi, à côtes longitudinales chargées, ainsi que les cannelures, de stries tuilées, nommé en Holande Manteau Royal, & en France Man-

* Arg. pl.24. teau Ducal *. 38. lett I.

717. Un Manteau Ducal marbré en dehors Séba, pl. 87. de diverses belles nuances de rouge, de jaune & de blanc, presque entiérement jonquille pâle vers les bords, blanc bordé d'orangé en dedans, & grand dans cette espéce. 24.1.

718.

précédent, dans la marbrure duquel n'entrent II. FAM. que le blanc & les plus belles nuances de rouge, Peignes. à bord intérieur couleur d'or, plus large que ce-lui du précédent. 42.

719. Un autre marbré en dehors par zônes ondées alternatives de ro ge-brun & de blanc, eint dans les côtes de cerife pâle, & en dedans blanc teint de cramois, bordé d'orangé, 50.1.

720. Un autre, dont le dessus est blanc taheté de noir à la tête, marbre dans le reste de ouge de diver es nuances, de blanc & de soir, & dont le dedans est bordé d'aurore vis eint de cramoiss. 54.19.

721. Un Peigne des Indes, à valve supéteure blanche, tachée par zônes d'orangé oncé, & inférieure blanche en entier, à grosses ôtes longitudinales, chargées, ainsi que les unnelures, de stries sines en même sens, à reilles peu inégales, & grand dans son espèce, ommé par quelques-uns Manteau Ducal blanc, par d'autres la Gibeciere ou la Bourse *.18.1 * Arg. pl. 722. Une Bourse, dont les taches sont oran-

723. Un grand Peigne des Indes, rare , arbré en dehors de blanc, d'amaranthe & lilas, teint en dedans des mêmes couleurs, 3 rosses stries & cannelures longitudinales, à

Tome I. X

II. FAM. PEIGNES. oreilles fort inégales, & à la valve supérieure duquel adhére une belle Crête de coq. 48.

724. Un Peigne des Indes, rare, ponceau nué d'aurore tant en dehors qu'en dedans, à stries longitudinales égales & un peu rabotteuses. 27.11

725. Idem. 29.1.

726. Trois Peignes des Indes: sçavoir, deux Pétoncles rares, dont un marbré en dessus par larges zônes en zig-zag de brun & de blanc veiné vers la tête de bleu clair, à neuf côtes longitudinales, & à stries sines & serrées en même sens; l'autre à tête blanche veinée de rouge & de bleu clair, rouge-brun dans le reste, à cinq côtes peu saillantes chargées, ainsi que les cannelures, de stries sines en même sens *; & un Manteau Ducal riche en couleurs. 18.72.

* Gualt. tab.

727. Trois autres: sçavoir, deux Pétoncles en pendant, marbrés par grandes taches de brun, de blanc & de rouge, mais du reste semblables au second de l'article pré édent, & un très-beau Manteau Ducal. 33.1.

728. Tros autres: sçavoir, deux Pétoncles de l'espéce des premiers de l'article 726, marbrés en dessus par zônes d'olive, de brun & de jaune de diverses nuances, jaunes en dessous; & un beau Manteau Ducal à tête blanche.

729. Trois Pétoncles peu communs : sça-

voir, un de la mer du Sud, rouge-fanguin nué d'aurore, & taché de blanc, semblable du II. Fam. reste à celui de l'article 724; & deux des côtes Peignes. l'Espagne, à larges côtes peu nombreuses, narbrés en dessus, l'un de souci, de blanc & le brun, l'autre d'olive, de bleu clair & de ris, tous deux blancs en dessous *.24*.1. ** Gualt, taba 730. Six Pétoncles des côtes d'Espagne, à 74. liut. A. B.

ôtes peu saillantes, de couleurs & marbrures

·ès-variées. 17.


73 1. Huit jolis Pétoncles par pendans, dont uatre des côtes d'Espagne; deux des Indes, à randes taches blanches & rouge obs ur; un lanteau Ducal marbré par zônes ondées de juge-brun & de blanc, & un semblable d'un juge plus vis. 20.2?

732. Neuf Pétoncles: sçavoir, huit d'Espagne ur pendans, dont deux nommés Brocatelle, cause de leur belle marbrure blanche & rouge diverses nuances dans l'un, rouge-sanguin, uleur de rose & aurore dans l'autre; & un anteau Ducal. 15.

733. Dix - huit Pétoncles d'Espagne, d'un au choix, & de couleurs très-variées, dont elques-uns papyracés & transparens, d'autres grosses côtes peu nombreuses, & le reste des péces déja décrites. 30.

634. Deux Pétoncles d'Amérique, peu comins, à grosses & petites stries longitudinales

X ij



un peu tuilées, à coque mince, lie de vin nuée

II. FAM. de fauve & de souci *. 10.

Prignes. 735. Dix Pétoncles de moyenne grandeur, *Séba, pl. & petits: sçavoir, quatre d'Amérique, de l'espèce des précédens, dont trois rouges un peu

* Ibid.n°. 13. marbrés de blanc sale *, & un citron vis; quatre autres à stries longitudinales rudes au toucher, à tête blanche tachetée d'amaranthe, & le reste

*Arg. pl. 24. ponceau *; & deux des Indes, à petites côtes longitudinales, tuilées dans l'un, chagrinées dans l'autre; tous deux blancs tachetés d'orangé & de brun. 22*1!

736. Deux Peignes des mers du Nord, papyracés, à stries longitudinales grosses & petites, à robe formée dans l'un de zônes aurore de diverses nuances, & dans l'autre de faisceaux alternatifs blancs & amaranthe clair; tous deux blancs nués de lilas endessous & vers le sommet. 9.

737. Deux grands Peignes de l'espéce des précédens, dont les valves, quoiqu'assez semblables, ne sont point pareilles, & qu'il est très-rare de trouver complets; tous deux nués par zônes de couleurs très - vives, entr'autres d'incarnat, de couleur de rose, d'aurore, de

*séba, pl. cerise, de violet & de ponçeau *. 20.1.

738. Deux autres semblables, à quelques différences près dans les nuances. 12.

739. Idem. 14

740. Vingt-quatre Pétoncles: sçavoir, vingtdeux de nos mers, du plus beau choix, qui par II. FAM. la richesse & la variété de leurs couleurs, ne cédent en rien à ceux des Indes, entr'autres un violet, un couleur de feu, deux blancs, un marbré de blanc & de couleur de rose, quatre de forme bizarre, qui leur vient d'avoir adhéré à d'autres Coquilles; deux tuilés, dont un marbré de jonquille & d'aurore, &c. * & deux pe- * Gualt. tab. its Manteaux Ducaux. 46.1.

741. Vingt-huit Pétoncles de nos mers, de couleurs très-belles & très-variées, dont deux grands chargés de tuyaux vermiculaires, & deux petits adhérans à deux valves d'Huitres l'espéce commune. 21.

742. Quarante-cinq Pétoncles de nos mers, 10n moins variés, & non moins bien choisis que ceux de l'article précédent. 36.1

743. Deux Pétoncles rares : sçavoir, un de a Chine, à tête blanche tachée de brun, cerise vif dans le reste, de forme arrondie & bombée, oreilles peu inégales, à stries & cannelures gales & bien prononcées; l'autre du Pérou, à valve supérieure marbrée de blanc, de couleur le chair, de jonquille & de brun, & inférieure blanche tachée en quelques endroits de brun, oreilles très-petites, & du reste semblable au précédent. 60.

744. Trois autres de même forme : sçavoir, X iii

II. FAM. PÉIGNES.

deux de S. Domingue, marbrés en dessus de blanc & de gris verdâtre, un peu tachés de fauve en dessous, & un de la Chine, semblable au premier de l'article précédent. 25.1.

745. Cinq Peignes blancs de forme oblongue & évalée d'un côté, à très-petites oreilles iné gales, & à valves un peu béantes au - dessous : sçavoir, deux des Indes, hérissés sur les stries de petites tuiles presque droites, qui leur on

24. lett. E. 44. litt. D.

* Arg. pl. fait donner les noms de Rape ou de Ratissoire *. Rumph. tab. & grands dans leur espéce; un de S. Domingue, à stries longitudinales fines & serrées composées d'espéces de bâtons rompus qui se suivent obliquement & régulièrement d'une strie à l'autre, & à une des oreilles retroussée d'un côté dans les deux valves, espéce nommée la Lime; un des mêmes parages, & semblable à cela près que les stries en sont plus fines, & les petits bâtons rompus plus contigus, variété que l'on nomme Lime douce; & un de la Barbade, à stries longitudinales peu serrées, de forme un peu renflée, & béant des deux côtés

* List. tab, à la fois *. 30"1. 177. f. 14.



GENRE TROISIEME.

PEIGNES SANS OREILLES.

746. N Peigne des Indes, blanc marbré par taches de brun, de jaune & de bleu, à côtes II. FAM. nombreuses serrées l'une contre l'autre, arrondies & ficelées, à bords intérieurs applatis, de sorme ronde & bombée, nommé Pétoncle sans preilles, & grand dans son espéce *. 14". 1

747. Cinq Pétoncles fans oreilles: ſçavoir, lett. B. Lift. tab. 239. deux d'Amérique en pendant, jonqui le poin- f. 73.4 illés de brun; un petit des Indes, nué de blanc & de couleur de rose, taché & pointillé de prun; & deux de la variété de celui de l'article précédent. 35.1.



TROISIEME FAMILLE.

CAMES.

III. FAM.

Ces Coquilles différent des Huitres par l'uniformité constante de leurs deux valves, & des Peignes, en ce qu'elles n'ont point d'oreilles. Leurs caracteres généraux sont d'avoir les deux valves égales, convexes & parfaitement semblables. Nous les diviserons ici, d'après le contour commun des bases de leurs valves, en quatre genres; sçavoir,

1°. Les Cames à bases rondes régulieres, qui sont les vrais Cames.

2°. Les Cames à bases rondes irrégulieres par quelque pli ou sinuosité.

3°. Les Cames à bases ovales régulieres, nommées vulgairement Palourdes.

4°. Les Cames à bases ovales irrégulieres, dont un des bords est ondé & comme replié, nommées aussi Lavignons.

GENRE PREMIER.

CAMES A BASES RONDES RÉGULIERES.

748. LUX grandes Cames de S. Domingue, dont une blanche nuée de couleur de III FAM. chair, & réticulée en dehors, citron clair, bordée de couleur de rose en dedans, & à charniere formée dans l'une des valves, de deux groffes dents fort proches l'une de l'autre, & de trois cavités qui reçoivent les trois dents correspondantes de l'autre valve, nommée le Rézeau blanc; & une de même espéce, mais polie, & devenue par-là blanche, rayée dans le bas, & par zônes de couleur de rose *. 6.4.

749. Deux Rézeaux blancs, l'un nué de ci- Adanson, pl. tron en dehors, citron en dedans; l'autre poli, 16. fig. 3. & devenu citron bordé de trois zônes couleur de rose en dehors, & d'une seulement en dedans. 4".

750. Deux Rézeaux blancs, l'un teint de rouge en dehors, bordé de rouge en dedans, l'autre poli & devenu citron, bordé de couleur de rose tant en dedans qu'en dehors. ["10!

751. Trois Rézeaux blancs un peu moins grands, dont un teint vers la tête de citron, &

CAMES.

deux polis, l'un à deux zônes couleur de ros III. FAM. près des bords, l'autre à une seulement. 7.9.

752. Deux grandes Cames de même espéce

polies, & en pendant. 6". 12.

753. Une autre très - belle, polie, blanche teinte de citron, ornée dans toute sa robe de plusieurs zônes rouges de diverses nuances et dehors, citron bordé de cerise vis en dedans.

754. Une Came de même espéce, très-gran de, & du plus bel éclat, citron vif, ornée su les bords près de la tête, de deux flammes ce rise en dehors, & citron clair en dedans. 13.

755. Trois Cames polies, dont une de Indes très - grande & peu commune, mais ur peu fruste, blanche, de forme très-bombée, charniere formée dans l'une des valves de trois grosses dents sous les sommets, & de deux latérales, s'engrainant dans autant de cavités correspondantes de l'autre valve; & deux de l'es-6.16. péce des précédentes, dont une citron en entier.

756. Idem. 6.12.

757. Trois Cames d'Amérique: sçavoir, une de la Jamaique, peu commune, blanche, de forme applatie, à stries circulaires très-fines, & à charniere composée de quatre dents dans

* Lift. tab. l'une & l'autre valve *; & deux de S. Domin-288. fig 124. gue, polies, de l'espèce des précédentes. 8.2. 7.58. Six Cames par pendans: sçavoir, deux Adanf. Hift. du Sénég. pl. de la Méditerranée, blanches, flambées par 16. fig. 5.

zônes de canelle foncé, à charniere comme celle des Peignes sans oreilles, & nommées Fu- III. FAM. ries *; deux blanches, teintes de jaune vers la CAMES. * Bonan. cl. ête, à rayons peu prononcés couleur de rose, 2. n°. 60 & istries circulaires fines & égales en dehors, Gualt. tab.72. plane teint de citron en dedans, & à charniere Adans. Hift. composée de trois dents dont une latérale dans du Sén. pl. 18, ine des valves, & de deux dans l'autre *; & * List. tabi leux de S. Domingue, polies, de l'espèce des 299, f. 136. brécédentes. 24.1.

759. Deux Cames des Indes, très - rares, l'une marron foncé, de forme bombée, à stries fines longitudinales canelle, à bords dentelés en dedans, & à charniere comme les premieres le l'article précédent, espéce nommée en Holande l'Eventail des Mennonites; & une plus petite, qui n'en différe que par sa couleur moins foncée, & deux grandes taches latérales blanhes rayées par traits fins en zig-zag jonquille. Cette derniere a beaucoup de ressemblance avec l'Orpheline dont parle M. d'Argenville dans son appendice *, & qu'il range parmi les Peignes fans oreilles. 48.1.

760. Sept Cames : sçavoir, une de la Méditerranée, gris de lin nué de fauve foncé, à stries circulaires & longitudinales très-fines, à bords dentelés en dedans, & à charniere comme celle des premieres de l'article 758. Cette Coquille est aussi rare à trouver dans la mer,

pl. 3. lett. C.

CAMES.

qu'elle est commune fossile; deux des Indes, d forme applatie, blanches marbrées en zig-za d'orangé - brun, à stries fines circulaires, charnière formée de trois petites dents dan l'une des valves, & de deux dans l'autre, nom * Arg. pl. mées le Point d'Hongrie *; deux de forme

Rumph. 12b. moins applatie, ventre de biche, à un large 42. litt. C.

* Lift. tab. rayon blanc fur le milieu du corps *; une en 292. fig. 128. core plus bombée, blanche, à grandes tache circulaires rougeâtres, interrompues dans cha-

* Ibid. tab. que valve par deux rayons du fond * , & une

311. f. 147.

295. fig. 131. petite blanche & platte, à stries fines longitu-* Ibid. tab. dinales tuilées *. 12. 7. 761. Huit Cames, dont fix par pendans scavoir, une rare des Indes, violette, nuée par zônes & par rayons longitudinaux de bland tant en dedans qu'en dehors, à stries fines circulaires, à charniere formée dans une des valves de deux grosses dents, avec deux cavités

> sur les côtés, & une troisseme entr'elles, qui reçoivent les trois dents de l'autre valve; deux petites d'Amérique, peu communes, blanches,

301. f. 142.

339. £. 176.

* Ibid. tab. à stries fines onduleuses bien prononcées *; quatre petites de la Jamaique, à zônes rouges de diverses nuances tant au dedans qu'au de-* Ibid. tab. hors, & à stries onduleuses fines & serrées *; & une des Indes, de l'espéce de la premiere. de l'article 757. 13.

762. Six Cames de forme très-bombée, & à

oque épaisse : sçavoir, deux d'Amérique, plane sale, à quatre flammes longitudinales fau- III. FAM. ves, à stries transversales nombreuses, minces CAMES. & ridées, laissant entr'elles de profondes canpelures, & à charnière comme celle de la preniere de l'article précédent, espéce nommée Clonisse *; deux Clonisses de la Méditerranée, * List. tale jui différent de celle-ci en ce que les stries en 285. fig. 123. ont plus arrondies, traversées vers les côtés f. 1. l'autres cannelures, qui les rendent en cet endroit comme ficelées, & en ce que la robe en est couverte de petites marbrures très-fines en zigzag fauve-roux *; & deux de même espéce, dépouillées de leurs stries. 5.19!

763. Six groffes Cames par pendans: sça-litt. H. voir, deux du Sénégal, fauves, revêtues d'un épiderme noir, à stries ou rides circulaires trèsines, & à charniere formée dans chaque valve le quatre dents: c'est le Pitar de M. Adanson. mais du double plus grand que celui dont parle 'Auteur *; quatre de la Méditerranée, dont * Hist. du deux couleur de tuile, à coque épaisse, à char- sénég. pl. 16. niere comme celle des Peignes sans oreilles, & List. tab. 272. à rézeau très-fin, revêtu dans l'une & dans l'autre d'un drap marin, qui imite le velours *; * Gualt. tab. & deux lisses fauve foncé, rayonnées de fauve 73. litt. A. Bonan. cl. 2. clair, à charniere composée de trois dents f. 80.

764. Quatre belles Cames des Indes, de 86. litt. A.

dans chaque valve *. 5.419?

* Lift. taba 284. f. 122. Gualt. tab. 75.

* Gualt, tab. ?

CAMES.

forme bombée, dont deux blanches marbrée en quelques endroits de violet pâle, & pa larges traits en zig-zag de brun obscur, à strie circulaires très-fines, & à charniere composée dans l'une des valves, de trois dents, & de * Gualt, tab. quatre dans l'autre *; une de même espéce, peu

82. litt. H. f. 98.

Lift. tab. 262. commune en ce que les traits en zig-zag y son orangé; & une sauve soncé rayonnée de marron de diverses nuances en dessus, citron, bordée de blanc en dedans, & à charnière * Ibid. tab. comme dans la premiere de l'article 757 *.21.

251. f. 85. Gualt. tab.71. Litt. C.

765. Huit autres de mêmes forme & charniere: scavoir, denx blanches, à rayons formés de traits & de taches triangulaires rouge-brun, imitant des caracteres, & à stries circulaires * Lift. tab. très-fines *; detix blanches ornées par zônes

257. f. 92. litt. G.

Gualt. tab.82. fines & serrées de traits en zig-zag canelle foncé, à stries fines transversales, & jaune d'or en de-* Ibid. tab. dans *; deux blanches rayonnées de canelle

75. litt. O.

clair; & deux de la variété des premieres de l'article précédent. 15.4.

766. Six autres: sçavoir, deux blanches, à rayons formés de taches & de traits fauvenoirâtre, & à stries circulaires bien prononcées; une blanche marbrée de taches & de chevrons fauve-roux, à stries circulaires plus fines, à charniere comme les précédentes *; une des Indes, peu commune, polie, blanche teinte vers les bords, en partie de rouge pâle, & en

* Lift. tab. 258. f. 94. Valent. biv. 6g. 16.

partie de bleu tant en dehors qu'en dedans, & l'eharniere comme celle de l'article 148 ; III. FAM. me blanche bariolée de traits pourpres for-CAMES. nant un rézeau à taches triangulaires du fond 2; 86. n°. 18. k une de l'espèce des premieres de l'article f. 107. 2 lbid. tab. 259. f. 95.

GENRE SECOND.

CAMES A BASES RONDES IRRÉGULIERES.

hes, marbrées par grandes taches, & rayontées de fauve brun, de forme bombée, à stries ongitudinales & transversales, celles-ci plus aillantes, les autres plus fines formant un réau celluleux, à charniere composée dans chaque valve de trois grosses dents, & à valves parnies de deux lévres latérales se recouvrant une l'autre, espèce nommée en Hollande le Rayon de miel *. 18.

* Ibid. tab.

768. Deux grands Rayons de miel de Saint-336.f. 173, Domingue, blanc fauve, à stries transversales rès-saillantes, & en vive arrête, & du reste emblables aux précédens * . 5. 7.

4 Rumph. tab. 42, lit. F.

769. Deux Cames de Bengale, blanches, tab. 42. lit. Fe rnées de traits fauves en zig-zag, réticulées, f. 178.

granuleuses, à charniere souci, composée dans III. FAM. l'une des valves de trois dents, & de deux dan CAMES. l'autre, & à lévres latérales se recouvrant plus * List tab. exactement que dans l'espéce précédence *9.1

335. £. 172.

770. Six Cames d'Amérique & par pendans! sçavoir, deux blanches, à coque épaisse, de forme presque sphérique, à stries & fascies circulaires peu prononcées, à double sinuosité vers les bords de chaque valve, & à charniere formée de trois dents dans l'une des valves, & del quatre dans l'autre : c'est la Jamaique de M. *Arg. pl. 21. d'Argenville *; deux semblables, polies, d'un

£. 138.

Lift. tab. 305. bel éclat, & nommées Billes d'yvoire; deux peu différentes des précédentes, quant aux plis latéraux des deux valves, mais de forme applatie, jaune clair en dehors, & souci en dedans, à charnière composée de trois dents dans l'une des valves, s'engrainant dans trois cavités correspondantes, l'une à stries circulaires fines &

lamelleuses, l'autre dépouillée & polie : on les

* Ibid. tab. nomme Abricots *. 9.4

300. f. 137. 771. Six autres; sçavoir, deux blanches en dehors, jonquille en dedans, de forme bombée, à stries circulaires très-fines, & fascies peu marquées, à deux sinuosités de chaque côté des sommets, & à charniere formée d'un très-petit filet transversal se logeant dans une rainure correspondante *; deux de l'espéce des premieres

de l'article précédent, mais dans l'état où elles

ont

ont été tirées de la mer : leurs stries sont fines & lamelleuses; & deux Abricots, dont un peu III. FAM. commun, en ce qu'il est blanc, & l'autre poli CAMES. de la variété des précédens. 11.4.

772. Huit autres; sçavoir, deux peu communes, dont une blanche nuée d'amaranthe clair, & une blanche nuée de jaune, toutes deux papyracées, à stries fines transversales, serrées & peu marquées, & longitudinales fines aussi, mais plus distantes & mieux prononcées, à valves s'avançant & se relevant d'un côté, ce qui rend la Coquille béante en cet endroit où les bords sont dentelés, & à charniere composée dans l'une des valves de trois dents, dont une petite sous le sommet, & deux minces latérales s'engrainant dans les cavités correspondantes de l'autre valve; une de la Jamaique, blanche & lisse, à valves prolongées d'un côté, mais jointes exactement, & à charniere formée de trois dents dans les deux va ves *; une des Indes, blanche, de forme peu renflée, ornée 274. f. 110. d'un compartiment très-serré de petites tuiles de champ, à sinuosité dans un des bords latéraux de chaque valve, à charnière composée de deux dents latérales, & d'une sous les sommets dans chaque valve, nommée Guillochée*, * Gualt. tab. & grande dans cette espéce; deux petites ver- 76. litt. E tes, à bords finueux & à stries circulaires la-fig. 1446.

Tome I.



GENRE TROISIÉME.

CAMES A BASES OVALES RÉGULIERES.

NE grande & belle Came des Indes, beu commune, blanche marbrée dans les deux III. Fam. iers de chaque valve d'un beau violer, polie, Cames. & à charniere formée de trois groffes dents sous es sommets, & d'une quatrieme latérale *. 30.

775. Une Came des Indes, rare, marbrée 86.11°. 150 par grandes zônes de fauve, de couleur de chair & d'aurore, à rayons longitudinaux de nuances plus foncées que le fond de brun & de marron, nterrompus en quelques endroits de blanc, à bries larges & applaties, à charnière comme celle qui a été décrite dans l'article 748, & rès-grande dans fon espèce, nommée Cedo rulli *. 73°.

Y ij

CAMES.

86. litt. I.

f. 106.

777. Deux belles Cames un peu moins gran-III. FAM. des que les précédentes; sçavoir, un Cedo nulli de couleurs très-vives, & une Corbeille teinte sur les côtés de couleur de rose. Ss."

778. Six Cames par pendans; sçavoir, deux du Brésil, lisses, couleur de chair, ornées de taches fauve brun, quarrées dans l'une, & en zig-zag imitant le point d'Hongrie dans l'autre, à charniere composée de trois dents dans cha-* Gualt, tab. que valve, & nommées Cames truitées *; deux des mêmes mers, de forme applatie, à zig-zags List. tab. 270. plus nombreux, diversement entrelacés, de couleur violette sur un fond blanc-jaunâtre, à stries plattes circulaires, à bords très-finement dentelés, & à une grande tache violette au de-

dans de chaque valve, espéce nommée le Zig-

zag *; & deux blanches marbrées vers la tête * Arg. App. & l'un des côtés de fauve brun, à groffes stries pl. 3. lett B. List. tab. 378. longitudinales granuleuses, & comme ficelées, f. 221. devenant obliques vers le côté finueux, à char-

lett. P. List. tab. 312.

lit. A.

fig. 148. Gualt tab.75.

* Arg. pl. 21. péce nommée Came-feuille ou l'Amande * . 95.6 779. Trois autres, sçavoir, une Corbeille teinte en dedans de citron, & deux Cedo nulli en pendant. 25.1.

niere de quatre dents dans chaque valve, ef-

780. Quatre Cames des Indes; sçavoir, une blanche à deux larges faisceaux de taches gris de lin, à cinq fascies circulaires peu prononcées, & peinte en dedans par les Chinois, pour servir

à un de leurs jeux, dans lequel il s'agit d'apparier, avec le plus de promptitude, les deux val- III. FAM. ves d'une même Coquille, mêlées à dessein avec celles d'un grand nombre d'autres; deux Cames - feuilles marbrées presque entiérement de fauve roux, & teintes de bleu aux fommets; & une Came truitée: toutes, à l'exception d'une les Cames-feuilles, sont grandes dans leur efpéce. 12". 11.

781. Cinq Cames des Indes; sçavoir, une eu commune, fauve nué de gris, à un petit iombre de rayons étroits d'une nuance plus oncée, à stries circulaires égales & applaties omme dans le Cedo nulli, mais moins larges à charniere formée de quatre dents dans les eux valves; deux à peu près semblables & de nême fond, mais ornées de petits chevrons ris-verdâtre plus prononcés dans quatre rayons c vers le bas que dans le reste, & à charnière omposée dans l'une des valves de trois petites ents, & de deux dans l'autre; & deux petites ames-feuilles blanches. 3.

782. Vingt-quatre petites Cames des Indes; avoir, dix - sept lisses & du brillant de l'agae, de marbrure & couleurs fort variées, à yons plus ou moins prononcés & de forme ombée, connues sous le nom général de Caes luisantes *; deux Zig-zags de la variété de rticle 778; trois autres qui n'en différent qu'en 379. fig. 222.

C AMES.

ce qu'ils sont lisses & à traits canelle plus fins & III. FAM. plus nombreux 1; & deux Rayonnées 2. 15. CAMES. I List. tab. 380. f. 223. Rumph. tab. 42. litt. M. bid. litt. L. 3 Gualt. tab. \$6. lite. B.

429. f. 273.

783. Neuf Cames d'Amérique, sçavoir deux blanches nuées de citron & de violet 3 deux rayonnées de blanc & de violet 4; une saisceaux alternatifs des mêmes couleurs; deux blanches à tête cerise, nuées plus bas de couleu 4 List. cab. de rose, toutes les sept à stries longitudinale bien prononcées, & à stries fines circulaires for mant, sur-tout vers les bords, un rézeau granuleux, à valves un peu béantes dans l'un de côtés, & à charniere composée dans l'une & l'autre valve de deux dents ; une blanche à troi zônes couleur de rose, à stries longitudinale ondées, plus grosses que celles des précédentes & à charniere formée d'une seule dent dans

> l'une des valves, & de deux dans l'autre; un de l'espéce des deux premieres de cet article mais polie & blanche, bordée de violet; & un des Indes, qui ne différe des troisieme & qua trieme de cet article, qu'en ce qu'elle est plu

784. Douze Cames par pendans; sçavoir dix de la Méditerranée, dont deux à stries lon gitudinales & transversales très-fines, marbrée & rayonnées de brun & de gris de lin, sur un 3 Gual, tab. fond blanc 5; deux peu différentes pour les cou leurs, mais à simples stries circulaires applatie comme dans le Cedo nulli; deux gris de lin

grande & nuée de jaunâtre. 9.6.

Sa. litt. H.

rayonnées de blanc, à stries circulaires trèsfines; deux à stries semblables, ornées d'un des- III FAM. sein canelle en rézeau; deux autres à robe par-CAMES. tie blanche, chargée de traits fauves en z'g-zag très-déliés, & partie marbrée par grandes taches de gris de 'in, toutes à charniere formée de trois dents dans l'une & l'autre valve; & deux Cames violettes polies de l'espéce de celles de l'article précédent. 9.8.

785. Deux grandes Cames des côtes de Bretagne, rayonnées de blanc & de fauve de diverses nuances, à coque mince, & à charnière composée dans l'une des valves d'un chevron sous le sommet, & de deux lames latérales qui se logent sous us chevron semblable, & entre quatre lames correspondantes de l'autre valve. 4."

786. Douze Cames des mêmes parages, grandes & de moyenne grandeur; sçavoir, une blanche à une large zone verte près des bords, & une petite de même couleur sur le bords mêmes; une blanche à trois zônes souci, & à stries circulaires inégales; deux blanc sale à fascies circulaires inég les & peu prononcées; deux nuées de fauve & de gris; une blanche rayonnée de fauve, à tête & inté ieur nué de violet *; une * List. tab. blanche à zônes fauves peu prononcées; deux 387. f. 230. entiérement blanches, & deux de la variété de celles de l'article précédent, dont une blanche

Y iv

en entier, toutes à charniere à peu près sembla-III. FAM. ble à celle qui est décrite dans le même article. CAMES.

GENRE QUATRIEME.

CAMES A BASES OVALES IRRÉGULIERES.

787. NE grande Came des Indes, à stries transversales fines & applaties, ornées d'un desfein de traits en zig-zag violet-noir, qui se croifent diversement l'un l'autre, & forment plusieurs lozanges sur un fond blanc, à charnière composée de trois dents dans l'une des valves, & de deux dans l'autre, espéce que l'on nomme *Arg. pl. 21, en France Ecriture Arabique ou Chinoise *, &

lett. A. List. tab. 402, en Hollande la Natte de jonc. 33."

fig. 13.

788. Une Ecriture Chinoise de même granlitt. F. Valenyn, biv. deur & de même fond, mais peu commune en ce que la marbrure brune y est jettée partie par grandes taches, partie par chevrons, dont

*Ibid. f. 10. quelques-uns se réunissent en zig-zags *. 12"

789. Une autre différente des précédentes, en ce qu'on n'y remarque aucun zig-zag, mais seulement de grandes taches noisette sur un * Ibid. f. 7. fond paille *. 16.

790. Deux Ecritures Chinoises de moyenne

randeur, l'une tenant à la fois des deux variéés décrites aux articles 787 & 788; & l'autre à III. FAM. ig - zags jettés par zônes, & à taches par faif- CAMES. eaux de rayons. 12.1.

791. Trois Cames rares: sçavoir, une maron clair de la forme d'une amande revêtue enore de sa coque, à robe en rézeau granueux, sur laquelle on remarque d'espace en esace des stries ou suites longitudinales de grains, plus élevées que les autres, & d'où naissent vers e bas des franges ou plumaceaux de petites euilles flexibles; Coquille que l'on peut nomner l'Amande à cils, & dont Séba regardoit a pareille qu'il possédoit, comme unique *; une * séba, pla les Indes, marbrée de jaune, de marron & 33.11. 13. de brun-noirâtre, à l'exception d'une avance sin. tab.6. f. r. vers la tête, qui est blanche, à stries longitudinales, à bords dentelés, & à charniere formée lans l'une des valves, de deux dents, dont une atérale & très-longue, lesquelles s'engrainent dans une cavité & une rainure correspondante de l'autre valve *; & une fauve clair à rayons * valent. bid'une nuance plus obscure, mais peu pronon- val. f. 27. cés, & semblable pour les stries, la forme & la charniere à l'Ecriture Chinoise *. 18"

792. Deux autres, dont une comme la seconde de l'article précédent, mais polie, & d'un grand volume pour son espéce; & l'autre comme la derniere du même article. 6.1.

CAMES.

793. Huit Cames: sçavoir, fix petites de III.FAM. parages Magellaniques, rares, & par pendans dont deux jonqu'lle, deux soufre, & deux olive toutes de forme oblongue bombée, ressem blante à celle d'une petite féve, & nommée de là Féverolles, & deux Ecritures Chinoises d moyenne grandeur, l'une de la variété de celle de l'article 787, & l'autre de la variété de l seconde de l'article 790. 9.11

794. Quatre Cames des Indes: sçavoir, une rare, blanche papyracée, à stries transversales très-fines & inégales, à grosse côte en forme de pli à l'un des côtés de chaque valve, mieux marquée dans l'une que dans l'autre, & à un second pli moins sensible dans l'autre côté, ce qui donne à la Coquille une forme un peu tor-

* List. tab. tueuse *; deux blanches à tête couleur de rose vif, & rayons de même couleur peu prononcés, à robe en rezeau fin, granuleux imitant le chagrin, à un large pli dans l'un des côtés de chaque valve, & à charniere formée de trois pe-. tites dents, dont une latérale, espéce nommée la Chagrinée ou le Chagrin, & par Rumphius la

*Rumph.tab. Langue de chat *; & une blanche de même 45. litt. G. Guale, tab 76, forme aussi rayonnée, mais à stries circulaires

406. f. 252.

* Rumph. inégales & très-fines, & nullement granuleules*, tab. 45. litt. I. nommée simplement la Langue. 28.10.

> 795. Quatre Cames par pendans: sçavoir, deux des parages Magellaniques, peu commu

DE MER.

347

nes, blanc mat, à stries circulaires serrées, minces & tranchantes, à coque épaisse, & à III.Fam. charnière formée de trois dents dans une des valves, & de deux dans l'autre; & deux Langues différentes des dernières de l'article précédent, e ce qu'elles sont papyracées & entiérement blanches.



QUATRIEME FAMILLE.

CEURS.

IV. FAM.

Es Coquilles ne différent des Cames qu'en ce que leurs deux faces latérales, ou tout au moins l'une de ces faces, représentent assez exactement la figure d'un Cœur. Nous les diviserons en trois genres; sçavoir,

1°. Celles dont les faces latérales représentent toutes deux à la fois, quand la Coquille est fermée, des cœurs bien formés, & dont les sommets sont fort près l'un de l'autre: on les peut nommer Cœurs proprement dits.

2°. Celles dont les faces latérales représentent toutes deux à la fois, quand la Coquille est fermée, la forme de cœurs, & dont les sommets, fort écartés l'un de l'autre, laissent entr'eux un espace rhombe ou lozange nommé Carenne; genre qui comprend les Arches. 3°. Celles dont une seule des faces vi. Fam. vi. Fam. uc la Coquille est fermée, & que l'on istingue par les noms de Cames tron-uées ou de Conques de Vénus.

GENRE PREMIER.

CŒURS PROPREMENT DITS.

96. N Cœur des Indes, blanc & papyacé, à valves pliées chacune en demi-cœur aplati, renslées vers le milieu, & montrant par eur réunion un cœur de forme très - élégante, arni de petites pointes dans tout son contour, stries longitudinales granuleuses, courbées sur haque face, à sommet se croisant un peu, & charniere composée dans l'une & l'autre valve, e trois petites dents, espèce nommée Cœur de rénus *. 18"3.

*Arg. pl. 234
797. Un très-grand Cœur de Vènus, blanc Rumph. tabe
uné d'incarnat, ayant un côté de ses faces con-43. litt. E.
List. tab. 3184
ave, à une petite élévation près sous les s. 175
commets, qui se croisent encore plus que dans litt. B. C. D.
e précédent, & à contour dépourvu de piquans, variété qu'on désigne par le nom de
Cœur de Vénus en bateau *. 37.

798. Un Cœur de Venus rare en e que l'une IV. Fam. de ses faces est ornée de petites fascies blanches & couleur de rose, suivant la direction des stries; le contour de ses valves est sans pointes comme dans le précédent. 85.

799. Un Cœur de Vénus en bateau, d'un beau couleur de rose, à la sommité près de le

partie convexe qui est blanche. 42"5.

800. Un Cœur de Venus peu commun, ponctué dans sa face convexe de couleur de rose, & bordé dans l'autre de petits traits de même couleur, à deux échancrures vers le bas, & a côtes destituées de piquans. 102.

801. Un Cœur de Venus en bateau, dont le centre de la face concave est beaucoup plus élevé que dans les précédens, moucheté d'un côté & rayé de l'autre de gros traits onduleux sauve-jaune, & légérement dentelé dans son contour. 36

802. Trois Cœurs de Venus: sçavoir, deux de moyenne grandeur, dont un blanc, à côtes chargées de pointes, un couleur de rose, à côtes dépourvues de pointes, mais garnies l'une & l'autre de deux petites échancrures paralleles; & un Cœur en bateau blanc. 23".19

803. Un Cœur du Sénégal, grand, mince, & de forme presque sphérique, blanc tant au dedans qu'au dehors, excepté sept à huit larges cannelures qui sont canelle soncé, à côtes sorées chacune de trois stries, dont celle du miu est mince, élevée en vive arrête, & creu- IV. FAM. intérieur ment en forme de tuyau, à bords Cours. ntelés, laissant entr'eux un jour assez grand and la Coqu'lle est fermée, & à charniere mposée dans l'une & l'autre valve de deux nts sous les sommets, & d'une très-grande érale. Cette Coquille, nommée Conque exoue, est très-rare à trouver complette comme lle-ci, dont les deux valves ont certainement partenu au même Coquillage: c'est le Kaman M. Adanson * 161.


Adanfon ;

804. Une au re Conque exotique plus grande, pl. 18. f. 2. à val es bien afforties quoique dépareillées. 12 lett. A. 805. Un très-grand Cœur de la baie de Cam- 48. n*. 6. che, peu commun, blanc sale, taché de litt, D. Gualt. tab. 72. I ige pâle en dehors, & de pourpre en dedans, tries longitudinales bien prononcées, char-119s en quelques éndroits d'anneaux minces, à Carniere formée dans l'une des valves de trois Ints s'engrainant dans trois cavités de l'autre ve, & à faces latérales représentant des durs inégaux; le plus grand des deux est teint rougeâtre, & le mieux formé *. 9.4. 806. Un Cœur de l'espéce du précédent, 328. fig. 165.

is un peu moins grand, & dont le fond est

j ne pâle. 30. 807. Un Cœur rare de Carthagene d'Amé-

lue, fauve, excepté vers les bords qui sont




dans toute leur étendue & à distances égales, de petites tuiles, à charnière comme les précédens, & nommés Cœurs de bœuf tuilés, 28:11
tous deux de la plus parsaite conservation *. *Arg.pl. 23

812. Deux Cœurs de la Jamaique, blancs, à lett. M. grosses stries chargées d'anneaux cerise, finissant f. 160. par de prosondes dentelures, à côtés inégaux, dont le plus allongé représente le mieux un cœur, & grands dans leur espèce nommée la Fraize*. 30. 2.

813. Six cœurs par pendans: sçavoir, deux 316. fig. 153. Fraizes à stries plus fines, chargées d'anneaux litt. A. Bonan. cl. 3; jonquille très-ferrés, excepté vers les sommets s. 375. qui font blancs & dépourvus d'anneaux, nommées Fraizes blanches *; deux petits blancs des * List. tabi Indes, à stries ficelées & cannelures piquetées, 315. f. 152. à valves composées de trois faces, dont une applatie, & nommés Caurs triangulaires ou Caurs en soufflet *; & deux d'Amérique, blancs * Gualt. tab. marbrés l'un de fauve, l'autre de jaune & de 38. lit. C. rouge-brun, à stries longitudinales bien pro- 44 litt. H. noncées, de forme plus courte & plus bombée, mais d'ailleurs affez ressemblante à celle des précédens, nommés en France Cœur de #16. pigeon, & en Amérique Cour de l'homme *. 8 * Bonan. cl:

814. Quatre autres par pendans, dont deux 2. f. 94. Cœurs triangulaires, grands dans leur espèce, & deux Cœurs de S. Domingue, blancs nués

Tome I.




contraire l'un à l'autre, & bleus en cet endroit, à charniere formée dans les deux valves, de IV. FAM. trois larges dents, dont une latérale, espéce CEURS. nommée en France Boucarde ou Cœur de bœuf. & en Hollande Bonnet de fou*. 3.2.

* Seba, pla 817. Deux grands Cœurs de la même mer: 86. n°. 1. Gual. tab. 71. sçavoir, un fauvé nué de blanc & de bleu pâle, litt. E. de forme très-bombée, à grosses stries longitu-f. 111. dinales hérissées de pointes plus ou moins longues, à charniere composée de cinq dents dans l'une des valves, & de quatre dans l'autre, & nommé Cœur de bœuf épineux *; & l'autre fauve- * Arg. pl. 232 oux, à stries moins grosses, plus serrées & plus séba, pl. 86. hargées de pointes que le précédent, espéce no. 4. Gualt. tab. 72. 10mmée simplement Cœur épineux *. 3.

818. Les mêmes Coquilles un peu moins 86. n°. 3. * Séba, pl.

randes. aveclast. 354. 4" 19.

819. Six grands Cœurs de la Méditerranée: çavoir, deux blancs, à groffes stries & larges annelures longitudinales, à stries transversales nduleuses très-fines en forme de rides, dans un desquels les grosses stries sont chargées surout vers le bas, de quelques tuiles ou mammeons *; deux qui n'en dissérent qu'en ce qu'ils * Bonan. cle ont rayés par zônes inégales de blanc, de fauve 2. f. 97. c de rouge-brun, & sans tuiles *, tous à chariere comme les précédens; un Cour de bouf 86. nº. 7. vineux, & un Bonnet de fou. 3. 16. Bonan. cl. 2. f. 100. \$20. Huit Cœurs de moyenne grandeur, litt. M. Gualt. tab. 71



GENRE SECOND.

ARCHES

823. LEUX petits Cœurs des Indes, à carenne étroite, rares & en pendant, de la forme IV. FAM. d'une amande dépouillée de sa coque, à robe CEURS. en rezeau granuleux très-fin, l'un brun-noirâtre, l'autre fauve-roux, à l'exception de deux petites bandes longitudinales blanches, qui dans l'un & l'autre s'étendent des sommets aux bords des deux valves, & nommés en Hollande Amande rotie: leur charniere, ainsi que dans toutes les Coquilles de ce genre, est presque égale à la largeur des battans, & composée d'une suite nombreuse de petites dents dans l'une & l'autre valve. 30". 18!

824. Un Cœur des Indes, très-rare, canelle dans le corps, blanc vers les bords, & teint de violet en dedans, à carenne fort oblongue, à valves applaties vers l'une des faces latérales, qui représente un cœur des mieux formés, à fries fines longitudinales accouplées, traversées l'autres encore plus fines & plus serrées, & à larges avances ou appendices intérieurs en forme d'oreilles : cette Coquille provient de la

Ziii

IV. FAM.

vente de la vente de M. l'Abbé de Fleury qui la nommoit Coqueluchon de Moine: elle porte près de quatre pouces sur trois. 360.

825. Un autre Coqueluchon de Moine moins grand, & de couleurs plus foncées que le précédent. 250#

826. Un Cœur de la Jamaique, peu commun, blanc, à grosses stries longitudinales, larges & applaties, à carenne large, à coque épaisse & pesante, à bords intérieurs profondément découpés, & à dents de la charniere lamelleuses, plus grandes que dans toutes les Co-

* Lift. tab. quilles de ce genre *. 24."

238. f. 72.
Gualt. tab.87.

Blanc, à grosses stries longitudinales chargées
par zônes de petits tubercules, à carenne oblongue, & grand dans son espèce, nommée par

*Arg. pl. 23. M. d'Argenville la Corbeille *; & deux d'Amélett. C. Gualt. tab. 87. rique, blanc fale, à stries longitudinales charlitt. E. gées de petits anneaux, à carenne lozange,

* Arg. App. large dans l'un *, étroite dans l'autre : celui-cia pl. 3. lett. H. List. tab. 240. les valves un peu inégales dans le bas. 31.2.1. fg. 75. 828. Cinq Cœurs : sçavoir, deux d'Améri-

que, blancs, à stries longitudinales chargées, ainsi que les cannelures, d'autres très - fines transversales, & à carenne peu large & fort al-

* Ibid. tab. longée *; un comme le premier de l'article 230. Gualt. tab.87. précédent, & deux comme les autres du même litt. B.

Rumph. tab. article. 3".9.

829. Trois Cœurs: sçavoir, deux grands en pendant, à chevrons alternatifs blancs & fauve- Cœurs. roux; à stries longitudinales un peu rabotteuses, à valves béantes vers le bas, à carenne large & fort allongée d'un côté, ainfi que la forme de la Coquille, nommée Arche de Noé, à cause de sa reffemblance avec un navire *; & un femblable *Arg. pl. 23. au premier de l'article 827. 3". 12.

Rumph. tab.

830. Cinq Cœurs: sçavoir, deux de l'espéce 44. litt. P. des premiers de l'article 828, mais beaucoup plus grands; & deux grandes Arches de Noé, sur la carenne de l'une desquelles adhère une autre petite Arche de même espéce. 3".

831. Neuf Arches de Noe, dont quatre à-peuprès semblables à celles de l'atticle 829, mais moins grandes, & de couleurs plus vives *; * Gualt, tab. une qui n'en différe que par sa forme moins al- 87. litt. H. longée, & par sa carenne qui est très-large *; * Ibid, lit. P. une blanc-fauve, & une brune, qui ont ceci de particulier, que leurs carnes latérales sont chargées de petites feuilles, que la carenne en est marron foncé, & leur robe réticulée *: & deux * Ibid. ling. blanches papyracées, à robe réticulée, à carenne étroite & creuse; l'une de forme large & applatie, bordée de Drap marin, & l'autre de la forme ordinaire. 3.12:

832. Treize Arches de Noé de différentes grandeurs, & des variétés de l'article précédent. 5 19!

7. iv.

GENRE TROISIEME.

CAMES TRONQUÉES ET CONQUES DE VÉNUS.

IV. FAM.

833. N Cœur des Indes, peu commun blanc & lisse, à coque mince, à valves de forme ovale, applaties vers l'un des côtés, où elles représentent une espèce de cœur fort allongé, dont le contour est relevé d'un pli en vive arrête, à charniere composée dans l'une des valves, de trois dents, dont deux latérales, s'engrainant dans les cavités correspondantes de l'autre valve, & connu sous le nom de Came

* Gualt. tab. coupée * 12 .

834. Une rare & très-grande Came coupée, dissérente de la précédente en ce qu'elle est à coque épaisse, de forme plus bombée, que le contour du cœur qu'elle représente n'est point en vive arrête, & que les dents de sa charnière en sont plus grosses & moins allongées. 15.

835. Une Came coupée très-rare, blanche & polie, nuée par zônes & par traits longitudinaux de violet, à retour des valves en forme de cœur, chargé de stries sines longitudinales

Indées partant d'un fillon ovale, & représenant une chevelure flottante, à charniere for- IV. FAM. née dans l'une des valves, d'une seule dent, x de deux cavités recevant les deux dents de 'autre valve, à bords dentelés, & nommée par ette raison en Hollande la Scie *. 47. 19!

836. Deux Cames coupées des Indes orienales, peu communes, blanches teintes de vioet tant en dedans qu'en dehors, à robe finenent reticulée, à applatissement des valves en orme de cœur bordé vers le bas de petites euilles tuilées, à stries transversales lamelleuses, n vive arrête près des bords, & à charnière omposée dans l'une des valves, de quatre lents, s'engrainant dans autant de cavités corespondantes. On nomme cette espèce la Came oupée en bec de flûte *. 17 . 1?

837. Quatorze petites Cames coupées des lett. L. ndes, & par pendans: sçavoir, six blanches, f. 220. rois en entier, & les trois autres nuées de violet, 43. litt. F. outes à stries fines longitudinales, à bords denelés, & à charniere formée dans l'une & l'aure valve, de quatre dents *; quatre de forme * List. tab. emblable, dont deux canelle & deux citron ; 375.f. 216. &c leux rayonnées de blanc & de canelle foncé, Gualt tab. 890 isses dans le corps, à stries fines, granuleuses litt. D. ur la face tronquée, de forme plus applatie que les précédentes, à charniere composée dans haque valve, de trois petites dents, & nom 6.1.

* Séba, pl.

* Arg. pl. 21.

IV. FAM. CŒURS. * Gualt. tab. 88. litt. O. Arg. pl. 22. lett. L. Bonan. cl. 2. nº . 47 .

\$6. n°. 10.

mées Radiées *; & deux Cames en bec de flut 838. Quatorze Cames coupées; sçavoir deux d'Amérique, blanches, revêtues de leu épiderme verd de terrasse, nuées de violet e dedans, à stries circulaires fines & peu pro noncées, & à charniere comme celle de l'article 835; deux de même espèce, mais polies & dont la robe est devenue par-là d'un beat violet vers la tête, & blanche vers les bords * séba, pl. deux petites Scies polies *; quatre Radiées rayonnées l'une de fouci, l'autre de violet, &

les deux autres de canelle; & quatre sembla-

bles aux premieres de l'article précédent, dont deux nuées de rose pâle. 8.5.

839. Huit Conques de Venus : sçavoir, une d'Amérique, lilas nué de blanc, à stries circulaires saillantes en vive arrête, terminées dans tout le contour de la face qui représente le Cœur, par un rang de longues pointes, & un demi-rang intérieur de pointes plus petites, au centre desquelles, qui est un peu renssé, se trouve une tache ovale violet plus foncé, & à charniere formée dans l'une & l'autre valve, de trois dents, espèce nommée Concha Veneris à poin-

* Arg. pl. tes *; un Concha Veneris semblable, mais dé-21. lett. I. Gualt, tab. 76, pouillé de ses stries & de ses pointes, poli, & ett. D. Rumph. tab. devenu par-là blanc, à l'exception de la tache 48. nº. 4. ovale & des endroits où se trouvoient les stries. qui sont restés violet; un Concha Veneris sans pointes, blanc, à stries circulaires moins sailantes, à renflement latéral rouge-brun dans IV. FAM. e milieu, nommé en Amérique la Créole; une Cours. Créole d'une autre variété, lilas nué de blanc, & de forme moins bombée que la précédente; leux Conques de Vénus des Indes, & d'une aure variété peu commune, petites, à robe en ézeau granuleux, blanche tachée de gris, & lesquelles le renflement latéral est bordé de peites tuiles au lieu de pointes; & deux autres suffi des Indes, lisses, blanches, à renslement atéral marron, & nommées Gourgandines *. 40

840. Sept Conques de Vénus: sçavoir, deux 21. lett. F. Concha Veneris à pointes; un dépouillé; une Créole de la premiere variété de l'article précédent; deux Gourgandines canelle nué vers les pords de blanc, & à renslement latéral marron nué de bleu; & un petit Concha Veneris à réreau qui ne différe des quatrieme & cinquieme de l'article précédent, qu'en ce que la marbrure n'y est jettée que sur les bords, & par trois grandes taches feulement. 24"1.

841. Dix Conques de Venus : sçavoir, deux Gourgandines l'une souci, l'autre blanche teinte de fauve ; une qui ne différe des précédentes que par sa forme plus bombée, par un enfoncement dans le milieu de sa face oblongue latérale, & par ses taches fauves disposées par zônes & par rayons sur un fond blanc, espéce que l'on pour-

IV. FAM. Caurs.

roit nommer fausse Gourgandine; deux autre applaties des deux côtés du sommet, l'une blanche tachée de fauve, l'autre fauve tachée de blanc; & cinq petites des Indes, dont une blanche, à quelques traits pourpre, une ca nelle foncé, & trois blanches marbrées de violet, de verd & de bleu, toutes à stries circulaires, & à enfoncement latéral sur lequel s'étendent aussi les stries. 12". 7.

842. Quatre Conques de Venus: sçavoir. deux Gourgandines couleur de chair, à renflement latéral fauve, à coque plus épaisse, & de forme beaucoup plus bombée que les précédentes, variété qui n'est pas commune, & deux de l'espèce des quatrieme & cinquieme de l'article précédent. 18.1.

843. Onze Conques de Venus d'Amérique: sçavoir, une marbrée de blanc, de fauve & de marron, à stries circulaires grosses & arrondies en bourrelet, excepté vers l'enfoncement latéral, où elles sont minces & saillantes en forme

litt. A. 48. n°. 5. List. tab. 279. f. 116.

88. litt. D.


Arg. pl. 21. de petites feuilles ; espéce nommée Vieille ridée; Gualt, tab. 85, une Vieille ridée peu commune, blanche, à Rumph. tab. deux rayons rose séche, à stries circulaires minces, recourbées en forme de feuilles, & découpées le long des bords de l'enfoncement la-*Gualt, tab. téral qui est fauve-roux *; deux blanches, à stries fines circulaires en vive arrête, mais peu

élevées & fort écartées les unes des autres, à

infoncement latéral plus profond que dans les récédentes, & nommées Levantine de la petite IV. FAMA Spéce; deux autres blanches rayonnées de traits CŒURS. & bandes interrompues marron clair & canelle, stries fines longitudinales, & à stries circuaires en vive arrête, encore plus distantes les mes des autres que dans les précédentes *; leux grises, à trois rayons blancs sur chaque 378. f. 115. valve, à stries transversales serrées, arrondies x bifourchues; deux autres, qui n'en différent ru'en ce que les rayons y sont moins sensibles *, " Ibid talles x un Concha Veneris à pointes. 30.

844. Une Conque de Venus orientale trèsare, gris-verdâtre dans le corps, de forme un peu applatie, à coque très-épaisse, à stries irculaires en forme de feuilles tranchantes, 10mbreuses vers le bas, fort distantes vers le naut, & à enfoncement latéral très - profond auve-roux: cette Coquille nommée magna Vetula ou Levantine de la grande espéce *, porte rois pouces deux lignes sur deux pouces huit 21. lett. K. Rumph. tab. ignes, grandeur très - confidérable dans cette 47. n°. 1.
Valent. béra espéce. 724.1.

845. Un Cœur des Indes, blanc, à côtes & groffes stries longitudinales, les premieres tachées par intervalles, de pourpre, & chargées de tuiles peu saillantes, à bords très-profondément dentelés, à face représentant le Cœur, concave vers le sommet, & à charniere com-



IV. FAM. dent, & de deux filets longitudinaux, se lo geant dans la cavité & les rainures de l'autr valve, de l'espéce nommée Chou ou Feuille d

*Arg. pl. 23. chou, & grand dans cette espéce *. 45.*

List. H.

List. tab. 350.

846. Deux Feuilles de chou de moyenn

Gualt. tab. 93. grandeur, en pendant, & très - vives en cou
litt. A.

Rumph. tab. leur. 35.*4.

Rumph. tab. 10th . 97

847. Un grand Cœur des Indes, peu com mun, à stries longitudinales & transversale fines, mais rabotteuses, formant un rézeau asse grossier, à six grosses côtes chargées à distance égales de tuiles minces presque droites, & de plus en plus grandes, à mesure qu'elles s'approchent des bords, à face représentant le Cœur applatie & ouverte dans le milieu, & charniere formée dans l'une des valves, de trois dents, & de deux dans l'autre; espéce nommée Faitiere

4 Arg. pl. ou Tuilée*, & de la plus parfaite conservation 23, lett. E.
Rumph. tab. 848. Une Tuilée semblable à la précédente, 43, litt. A.
Gualt. tab. 93, à cela près que la couleur en tire un peu sur le litt. B.
citron. 45.

849. Une autre Tuilée, nuée de couleur de rose, & un peu moins grande que les précédentes. 30.

850. Une autre, blanche vers la tête, couleur de rose vis dans le reste, à seuilles naissantes seulement, de sorme plus applatie, & d'une lariété moins commune encore que les précéentes *. 23.

851. Une de forme plus étroite, plus oblongue * Gualt. tab. z plus bombée que les précédentes, à tuiles 92. litt. G. ombreuses partie peu élevées, & partie couhées les unes sur les autres, & à face représenint le Cœur, laissant une grande ouverture vale dans le milieu, dont les bords sont denlés en dedans vers le haut, & retroussés en rme de lévres vers le bas. 30.1.

852. Une autre blanche teinte de couleur de bse & d'aurore, bordée en dedans de cette erniere couleur, à neuf côtes qui ne sont charées que de tuiles naissantes, couchées les unes r les autres, de forme large & bombée, & grande ouverture latérale, semblable à celle la précédente *. 51.1.

853. Une très-grande Tuilée d'un pied sept 43. litt. B. ouces de long sur un pied de large, à six f. 190, osses côtes réticulées, où les tuiles paroissent peine vers le bas, à intervalles des côtes fort ofonds, blanc sale & rabotteuse en dehors, un beau blanc en dedans, & conservant enpre une partie de son nerf, dont on taille les étendues pierres jouant l'opale, nommées ulgairement Pierres a queue de paon. Cette oquille est connue sous le nom de Bénitier,

CŒURS.

* Ibid. lit. A.

IV. FAM.

depuis qu'on a employé en effet pour Bénitiers dans l'Eglise de Saint Sulpice de Paris, le deux valves d'une semblable, dont la République de Venise avoit autresois fait présent à François Premier. 60.



CINQUIEME

CINQUIEME FAMILLE.

TELLINES

Les Coquilles différent de celles des leux familles précédentes, qui, à pro-V. FAM. rement parler, n'en font qu'une, par ine forme oblongue, & en ce que le ommet des valves ou la charnière font oujours plus ou moins éloignés du miieu de leur longueur. On peut les divier en trois genres; sçavoir,

- 1°. Les Tellines exaclement fermées ou éantes seulement à l'une des extrémités; ur forme est oblongue, assez platte, lus large d'un côté que de l'autre, & charniere, ainsi que la tête, en sont lacées près du milieu.
- 2°. Les Tellines béantes aux deux exémités; leur forme est très oblongue, galement large, mais peu bombée ans toute leur longueur; la charniere a est plus éloignée du milieu:

Tome I. A

V. FAM. TELLINES.

3°. Les Manches de couteau, ou Tellines improprement dites, dont la forme est extrêmement longue, également large & bombée dans toute leur longueur; elles sont béantes aux deux bouts, dans l'un desquels est située la charniere.

GENRE PREMIER.

TELLINES EXACTEMENT FERMÉES, OU BÉANTES SEULEMENT A L'UNE DES EXTRÉMITÉS.

854. UNE Telline des Indes, peu commune, blanche nuée de fauve, recouverte de suites de chevrons gris de lin peu prononcés, à quatre rayons de taches rouge brun, à stries transversales fines & applaties, & à charniere formée de trois dents dans l'une des valves, & de deux dans l'autre, nommée Aîle de papillon, & * Arg. App. grande dans son espèce *. 9.

855. Quatre Tellines des Indes, peu communes; sçavoir, une lisse ventre de biche, ornée dans toute sa robe de traits fins en chevrons se croifant diversement, canelle dans le haut, violet

* List. tab. clair dans le bas *; deux de même espéce, mais 356. f. 339.

plus petites & à stries transversales très-fines *; & une Aile de papillon. 15.3.

856. Une Telline de la Chine, rare, à zônes TELLINES. * Gualt. tale. alternatives inégales blanches & couleur de rose 86. litt. H. en dehors, couleur de rose très-vif en dedans, cù l'on remarque un surcroit d'épaisseur dans le milieu, & à charnière formée dans l'une & l'autre valve de deux dents *. Cette Coquille, * Ibid. litts ainsi que toutes celles de ce genre qui suivront, List. 1906. ont, vers le côté le plus étroit, un pli ou sinuo-f.233. sité dans les deux valves, qui les rend béantes en cet endroit. 71."

857. Quatre Tellines de même forme que la précédente; sçavoir, deux des côtes de Bretagne, blanches nuées vers la tête de ventre de biche, aurore clair en dedans; & deux des In-

des entiérement blanches. 9.

858. Quatre Tellines des Indes par pendans; sçavoir, deux blanches teintes de jonquille, à rayons couleur de tose, interrompus par quelques zônes de nuances plus foibles, à stries fines transversales, & nommées Tellines radiées *; & deux blanches à extrémité des sommets cerise, tab. 45. lit. H. & dont la finuosité latérale est moins prononcée que dans les précédentes. 8. 2.

859. Quatre Tellines par pendans; sçavoir, deux d'Amérique, blanches teintes en partie de couleur de chair, à tête cerise, à zône un peu creuse, située vers le milieu, & à sinuosité latérale

Aa ii

presqu'insensible *; & deux Radiées, l'une à V. FAM. rayons jonquille & orangé, l'autre à rayons Tellines. couleur de chair foncé & lilas clair, toutes deux * Lift. tab. 193. fig. 236. grandes dans leur espèce. 8."

> 860. Une Telline des Indes peu commune, couleur d'or en dehors, nuée de cette couleur & de violet en dedans, à valves composées de deux faces très-inégales entr'elles, formant un angle très-obtus : la plus petite de ces faces est granuleuse & bordée du côté de la tête de quelques dents triangulaires: on nomme cette efpéce en Hollande Telline-feuille, & en France

* Arg. pl. Langue d'or *. 23".1. 22. lett. E.

Rumph. tab. 45. litt. K.

861. Idem, à cela près que le violet y domine davantage. 14. 16.

862. Une Langue d'or plus grande que les précédentes, jaune-verdâtre en dehors, violet clair en dedans. 18.2!

863. Deux grandes & belles Tellines d'Amérique, lisses & d'un grand éclat, l'une ravonnée & nuée par zônes de blanc, de citron clair, de couleur de rose & de lilas, l'autre blanche à deux zônes citron clair, toutes deux à bords un peu finueux & à charniere comme * Arg. pl. les précédentes *. 30.

22. lett. A. 864. Idem, à quelque légere différence près List. tab. 397. Gualt, tab.89. dans les nuances. 30.

865. Idem. _ 24.1.

866. Idem. _ 16".

litt. I.

867. Quatre Tellines; sçavoir, une des Indes, peu commune, d'un beau violet tant en V. FAM. dedans qu'en dehors, & à charniere formée TELLINES. d'une seule dent dans l'une des valves, & de deux dans l'autre; deux en pendant, dont une cramoiss teinte dans une large zône de verd, & une couleur de rose, nuée dans une large zône de blanc, toutes deux de l'espéce nommée Griblette; & une semblable aux dernieres des quatre articles précédens, à cela près que l'on remarque quelques petites zônes couleur de rose vers le haut, & que l'intérieur de chaque valve est couleur d'or. 24"1?

868 Sept Tellines des Indes de diverses grandeurs; sçavoir, une blanche nuée en quelques endroits de citron, à tête ponceau, & à extrémité latérale doublement sinueuse, formant en cet endroit une espéce de bec allongé, nommée de-là Pince de Chirurgien*; deux de même es- * Gualt. tab. péce, citron clair; deux autres couleur de rose, 83. litt. T.

Arg. pl. 22.

à un rayon jonquille pâle sur l'une des valves, lett. O.

Rumph. tab. & à stries transversales très-fines; une totale-45. litt.L.
List tab. 3940 ment blanche, & une Telline blanche peu com- £, 237. mune, bombée vers la tête & d'un côté seulement, & à bords tronqués vers le côté sinueux & applati *. 20.

869. Dix-huit Tellines de moyenne gran-89. litt. B. deur & petites; scavoir, deux d'Amérique, lisses, nuées par zônes, & rayonnées de violet

* Guair, tab.

Aa iii

\$25. f. 238.

& de blanc *; deux à stries fines transversales rayonnées des mêmes couleurs; deux couleur Tellines. * Arg. pl. de rose, à stries fines semblables, nommées Tellines de la Chine; deux blanches, marbrées de traits fins en zig-zag bruns, interrompus par des rayons du fond, teintes en dedans de citron, & à stries transversales fines, mais bien 4 riff. tab. prononcées *; deux de nos mers, nuées par zônes de rouge, de jaune & de blanc; deux autres de forme plus étroite, rayonnées des mêmes couleurs; une blanc sale, à stries transversales obliques & sinueuses dans les deux tiers de sa robe, & longitudinales dans l'autre tiers, terminées par des dentelures; une blanche nuée vers la tête de lilas, à groffes stries longitudinales accouplées, traversées d'autres très-fines, qui ne sont guères sensibles que vers les bords; deux de l'espéce des premieres de l'article 859; & deux Pinces de Chirurgien. 5.4



GENRE SECOND.

TELLINES BÉANTES AUX DEUX EXTRÉ-MITÉS.

870. JEPT Tellines de nos mers; sçavoir, une grande fauve clair, à fascies inégales rabot- V. FAM. teuses & peu prononcées, jettées par ondes, à Tellines. coque épaisse, de forme très-oblongue, & à charniere formée dans l'une des valves d'une groffe dent qui s'emboîte sous une cavité correspondante de l'autre valve *; une plus petite * Gualt. tab. de même espéce * ; deux blanches teintes de 90. litt. A. Rumph. fauve, de forme un peu moins oblongue, & à tab. 45. lif. N. extrémités moins béantes que la précédente; une qui n'en différe que par la forme de sa charniere qui, dans l'une des valves, est formée d'un appendice fort saillant, garni de deux dents qui répondent aux cavités de l'autre valve; & deux de forme plus courte & plus bombée, nommées par Lister Cames Pholades; elles conservent toutes deux leur animal*. 7"4.

871. Une grande & belle Telline des Indes, *Arg. Zoorare, d'un beau violet, à deux rayons & quel-len. G. ques nuances de violet moins foncé, & à charniere formée dans les deux valves d'une lame

Aa iv

V. FAM. TELLINES.

platte transversale, terminée par une petite dent dans l'une, & par une cavité correspondante dans l'autre. 24".1.

\$72. Deux Tellines des Indes, peu communes, sur-tout de cette grandeur, papyracées, à robe violette, ornée de quatre rayons blancs tant en dehors qu'en dedans, & à charniere formée dans les deux valves d'une côte longitudinale intérieure, terminée par deux petites dents dans l'une, & par deux cavités correspondantes dans l'autre, espéce nommée le So-

* Arg. pl. leil levant *. 24.1.

12. lett. P. Rumph, tab. 45. litt. E. List. tab. 422. £. 226. Gualt. tab. 91. litt. B.

416. f. 260. litt. C. ·Bonan . cl. 2. fig. 77.

f. 1. * List. tab. 427. f. 265.


873. Cinq Tellines; sçavoir, deux de la Méditerranée, rose séche, à deux rayons blancs dans le milieu de la robe, à stries sines obliques un peu onduleuses, & à charnière de l'espéce * List. tab. décrite dans l'article 871 *; deux d'Amérique, Gualt, tab. 91. blanches, à stries transversales peu prononcées. à valves sinueuses d'un côté, moins béantes que dans l'espéce précédente, & à charnière sem-Adans, pl. 19. blable *; & un grand Soleil levant. 3.2?

874. Idem, à peu de différence près dans les couleurs. 3.

875. Trois Tellines blanches des Indes, peu communes; sçavoir, une papyracée transparente comme le talc, bombée sur-tout vers la tête, à stries fines transversales en forme de rides, à une extrémité beaucoup plus béante que l'autre, & à charniere formée dans l'une &

l'autre valve de deux petits appendices sous les sommets, espèce nommée la Lanterne ou la V. FAM. Papyracee *; & deux qui ne différent des deux Tellines. premieres de l'article 873, qu'en ce qu'elles sont 91. litt. D. entiérement blanches & de forme plus courte. 9.

876. Quatre Tellines ; sçavoir, une de la Méditerranée, revêtue de son épiderme roirâtre, à valves contournées ne pouvant joindre que près de la tête, très-béantes dans le reste de leur contour, chargées dans l'intérieur d'une excroiffance platte, dentelée dans ses bords, à charniere de l'espéce décrite dans l'article 871, & nommée le Bec de canard *; une de même *Rumph. espéce, mais polie & devenue par-là blanc sale teint de gris; une semblable aux deux dernieres de l'article précédent, & une Lanterne. 10".



GENRE TROISIEME.

MANCHES DE COUTEAU.

V. FAM.

V. FAM.

Tellines.

des Indes, rare pour sa grandeur, gris nué par ondes de fauve, de forme droite, & à charniere, ainsi que toutes celles de ce genre, formée dans l'une des valves, d'une dent applatie se logeant entre les deux correspondantes de l'autre valve i, deux d'Amérique, fauves nués de blanc, presque aussi gros que le précédent, l'ibid. tab. mais de moitié moins longs 2; deux des mêmes

parages, jaune pâle, à une des extrémités terminés en bourrelet, l'un desquels est revêtu inferior.

3 Ibid. fig. vers un bout, d'Ovaires de Buccins 3; & quatre d'Arg. pl. 24. de nos mers, dont deux courbes 4; & deux

S Gualt. tab. droits s nués de blanc, de gris & de verdâtre.

878. Quatre Manches de couteau: sçavoir,

deux rares, fauve & lilas, tachetés de pourpre foncé, minces, transparens, & de forme un subid. tab. peu courbe, nommés Gousses de fèves 6; & deux so. litt. E. Rumph. tab. de l'espéce des second & troisseme de l'article

45. litt. F. précédent. 8.19.



SIXIEME FAMILLE.

MOULES.

C e sont des Coquilles oblongues, non d'un côté à l'autre comme les Tellines, VI. FAM. mais de la tête au bord opposé; elles sont de plus caractérisées par l'égalité constante de leurs deux valves, & par leur sorme convexe, large vers le bas, sinissant en pointe aux sommets. Quelques-unes sont encore remarquables par leur belle nacre & les perles qu'on y trouve quelquesois. Nous les diviserons en trois genres; sçavoir,

1°. Les Moules proprement dites, dont les valves ferment exactement, & dont un des côtés est presque droit, tandis que l'autre & l'extrémité inférieure sont arrondis.

2°. Les Moules cylindriques, dont les valves sont sort longues, à peu près également larges des deux bouts, &

MOULES.

aussi exactement sermées que dans les précédentes, genre qui comprend les Pholades bivalves, nommées Dattes.

3°. Les Moules triangulaires, nommées particuliérement Pinnes marines, dont la forme est applatie, à peu près triangulaire isoscele, & dont les valves ne ferment point exactement.

GENRE PREMIER.

MOULES PROPREMENT DITES.

879. UNE Moule des parages voisins du détroit de Magellan, dépouillée de sa pellicule, & non polie, blanche vers le haut, violette & pourpre dans le reste, à stries longitudinales un peu ondées, croisées de distance en distance par d'autres transversales jettées par ondes, nacrée d'un bel orient, & offrant aux yeux, tant en dedans qu'en dehors, toutes les couleurs de l'arcen-ciel, à charniere formée d'une dent oblongue sous le sommet de l'une des valves, & d'une cavité de même forme dans l'autre; nom. mée Magellanique *, & grande dans son espéce. 19#

880. Une Moule Magellanique dépouillée % non polie, plus grande que la précédente, VI. FAM. blanche dans les trois quarts de sa longueur à Moules, prendre de la tête, & violet nué de blanc dans le reste- 12.5.

881. Une qui ne différe de la précédente qu'en ce qu'elle est toute blanche, excepté quelques nuances de violet jettées par zônes sur-

tout vers le bas. 3".

882. Une très-grande Moule Magellanique polie, & dont la robe privée de ses stries, est d'un beau pourpre yeiné de blanc & du plus grand éclat. 90.3

883. Uue autre polie & plus foncée en cou-

leur que la précédente. 71.19?

884. Une autre Moule Magellanique polie, dont les deux valves font jointes & affujetties ensemble par une bordure d'écaille, & forment ainsi une tabatiere à goulot à l'usage des Indiens, qui ressemble parsaitement à nos poires à poudre.) 3.

885. Deux Moules Magellaniques polies, dont une remarquable par une excroissance représentant parfaitement une autre Moule qui auroit crû sur la premiere, mais du reste semblable aux précédentes, & que l'on pourroit nommer Moule double; & une autre variété, blanche dans plus de la moitié de sa longueur, bleu-turquin légérement nué de blanc dans le reste, laquelle n'a jamais eu de stries, & dont le dedans

Moules.

est presqu'entiérement recouvert d'une couche légere, blanche, parsemée d'un grand nombre de petites perles : on n'y apperçoit pour toute charniere que la rainure latérale destinée à recevoir le ligament. 12.7.

886. Une Moule de la terre des Papous, polie, fauve nuée par ondes de blanc & de couleur de rose, de l'éclat de l'agate, de forme trèsbombée, un peu sinueuse dans son bord insérieur, bossue vers les sommets, d'où naissent deux avances arrondies en portion de cercle: on n'y distingue point de charniere, mais seulement un sillon léger & fort long, qui se termine dans chaque valve par une dent presque *Arg. pl. 22. insensible *: cette Coquille a plus d'un demi-Adans, pl. 15. pied de long sur deux pouces neuf lignes de

large. 15."

887. Une autre des mêmes parages, & semblable, mais moins grande; & une valve de Moule Magellanique, très-rare, mais un peu fruste, brun-noirâtre tant en dessus qu'en desfous, & portant un pied trois pouces & demi de long sur huit pouces & demi de large. 3-10-

888. Cinq Moules peu communes : sçavoir trois petites Magellaniques, dont une de forme affez large, blanche & nacrée depuis la tête jusqu'au milieu, bleu foncé nué de blanc dans le reste; une toute violette, à la tête près, qui est blanche, & une entiérement blanche: les deux

Plata, lisses & polies, à robe violet - noir VI. FAM. jouant l'opale, & bordee de violet clair. 12. Moules.

889. Quatre Moules de moyenne grandeur, & polies: sçavoir, une Magellanique peu commune, nuée d'orangé & de rouge-brun; & trois d'Afrique, dont une marbrée par ondes de lilas, de couleur de rose & de rouge-brun; une marbrée de blanc, de gris de lin & de lilas; une fauve tachée de verd, & marbrée par traits en zig-zag de fauve plus soncé: toutes les trois à charnière formée d'une très-petite dent sous le sommet de l'une des valves, qui se niche dans une cavité correspondante de l'autre valve. 27.

890. Quatre Moules: sçavoir, une de Rio de la Plata, revêtue de son épiderme marron foncé, & à charniere comme les dernieres de l'article précédent; deux d'Afrique, dont une jonquille clair, & à tête lilas; & une d'un beau verd, ornée dans toute sa robe de traits en zigzag plus soncés, imitant le point d'Hongrie; & une de la terre des Papous, polie, marbrée principalement par ondes de violet, de blanc, de sauve & de verdâtre.

891. Quatre autres Moules polies, dont une violette nuée de gris de lin, & jouant l'opale; une de Rio de la Plata, & deux d'Afrique, femblables aux seconde & troisieme de l'arricle précédent. 10.6.

VI. FAM. Moules.

892. Quatre Moules d'Afrique, dont un couleur de paille, à grand nombre de zônes for mées de traits en zig-zag fauves, imitant le poin d'Hongrie; une à cinq larges zônes alternative verd foncé & fauve clair; celles-ci bariolées d traits fins en zig-zag rouge pâle; une blanche & une jonquille pâle. 6.1.

893. Deux Moules d'Alger, ressemblante aux Magellaniques pour la nacre & les couleurs, mais de forme plus étroite & plus allongée grandes dans leur espéce; l'une desquelles est polie, l'autre revêtue de son épiderme, & adhérente encore à son byssus: leur charniere est de l'espéce cécrite article 879. 10#1.

894. Huit Moules d'Amérique: sçavoir, deux blanches rayonnées de rouge-brun, ayant à peu-près la forme de la Moule des Papous, & * List. tab. nommées Tulipes *; deux de même espèce, 319. f. 198. mais revêtues encore de leur épiderme, partie

mais revêtues encore de leur épiderme, partie marron & partie fauve; deux petites de même forme, couleur de rose; & deux petites grises tachées de violet soncé, nuées vers l'un des bords de couleur de rose, à stries longitudinales très-sines, terminées par des dentelures presque insensibles, & à charnière formée de deux très*Arg. Pl.22. Petites dents qu'on ne decouvre qu'à la loupe,

espèce nommée Gueule de souris, & par M. Adanson le Dotel *. & S.

895. Trois belles Moules de la Méditerranée,

lett. K. Lift. tab. 366. f. 206. Adanf. Hift. du Sénég. pl. 15. fig. 3. dont une très-grande revêtue de son épiderine noir, de forme large, & à charniere formée de VI. FAM. deux petites dents sous les sommets; & deux Moules. de même espèce, polies, moins grandes, d'un beau violet en dehors, blanches bordées de violet en dedans *. 9.4.

896. Cinq Moules de la Méditerranée, de List. tab. 364. l'espèce des précédentes : sçavoir, deux revê-f. 203. tues de leur épiderme brun-noiratre, à l'une desquelles adhére un groupe de tuyaux vermiculaires; & trois polies, dont deux d'un beau violet veiné en quelq es endroits de blanc, & une violette vers le haut, bleu foncé au dessous, & bordée vers le bas d'une zone fauve affez large. 11# 11!

* Gualt, taba

897. Quinze Moules de différentes grandeurs, la plûpart dépouillées de leur épiderme : sçavoir, deux d'Amérique, blanches au sommet, bleu foncé dans le reste, à charniere formée de trois petites dents, & chargées l'une & l'autre de deux Huitres blanches papyracées. d'une espèce très-rare; deux petites rousses; de la forme des Moules des Papous; deux Tulipes; deux Gueules de souris; une Moule de la Méditerranée, de la variété de la derniere de l'article précédent; quatre de nos mers, rayonnées de violet & de bleu; deux autres bleu foncé; chargées de glands de mer; & une petite boëte de semence de Moules de nos mers. 6.2.

Tome I.

GENRE SECOND.

Moules Cylindriques et Pholades BIVALVES, NOMMÉES DATTES.

Moules.

898. DEUX Moules peu communes en pendant, à coque très-mince, nacrée en dedans, de forme presque cylindrique un peu applatie vers l'un des bouts, à robe partie fauve, & partie chargée d'un dessein en rézeau très-sin, de couleur plus foncée, qui se ramifie vers le bas, & qui a fait donner à cette espéce le nom de Moule arborisée: on n'y apperçoit nulle trace de charniere. 17.

899. Deux Moules arborisées, à ramifications du dessein plus nombreuses & mieux prononcées que dans les précédentes, qu'elles fur-

passent aussi en grandeur. 20.

900. Dix Pholades bivalves: sçavoir, deux rares d'Afrique, revêtues d'un périoste brun, à stries fines longitudinales partant du sommet en forme de rayons, & à bords repliés en partie l'un sur l'autre en dedans des valves; deux grandes d'Amérique, dont une revêtue de son épiderme verdâtre, à stries onduleuses très-

4 Rumph. fines, & nacrée en dedans *; l'autre laisse voir tab. 46. lit. F.

robe blanche de la Coquille dans les parties u l'épiderme a été enlevé; deux petites noires VI. FAM. es mêmes parages ; & quatre de la Médi- Moules. rranée, dont deux marron 2; une fauve, & 90. litt. D. ne blanche dépouillée de son épiderme. 3.1. lett. K. 901. Un groupe de quatre Dattes de la Mé-f/28 & 29. iterranée, dont trois grandes & une petite, 327. f. 268. gées dans la pierre même qu'elles ont creusée; t deux grandes de l'Amérique, dont une polie,

Arg. pl. 26. autre simplement dépouillée de son épiderme, outes deux parfaitement blanches & nacrées. 2".1.



GENRE TROISIEME.

PINNES MARINES, NOMMÉES AUSSI JAMBONS ET JAMBONNEAUX

VI. FAM. Moules. de neuf pouces & demi de long, & à coque mince, rouge & transparente, de forme assez large, à huit côtes longitudinales partant du sommet, laissant entr'elles de larges, mais peu profondes cannelures, chargées, ainsi que les côtes, de feuillets minces & couchés, dont quelques uns s'élevent en forme de tuiles, nacrée en dedans vers le haut, & à charnière formée, ainsi que toutes celles de ce genre, d'un simple ligament, sans aucun vestige de dents. 35.79

903. Une Pinne-marine des Indes, peu commune, de près d'un pied de long, de forme plus étroite, & à coque plus épaisse que la précédente, brune en dehors, presqu'entiérement nacrée en dedans, à stries fines longitudinales peu prononcées vers le bas, où elle est chargée d'une grande Huitre de l'espèce des Crêtes de coq. 20"1

904. Quatre Pinnes - marines de moyenne, grandeur: sçavoir, deux des Indes, dont une

coque peu épaisse, transparente, & de couur de corne, à stries fines longitudinales, & VI. FAM. e forme affez large vers le bas ; l'autre est Moules. uve, chargée dans une partie de fa robe de ries qui partent du sommet en forme de rayons érissés de tuites plus ou moins longues, pliées r cornets ou tuyaux cylindriques vers le bas es deux valves qui sont coupées à équerre *; * séba, pl. eux de la Méditerranée, couleur de rose pâle, 91. nº. 3. resqu'entiérement recouvertes de feuillets onis & plissés, formant des tuiles nombreuses plus 1 moins cylindriques, & à l'une desquelles there encore fon By flus * Plus un By flus * Bonani cla étaché. 6. 905. Sept petites Pinnes-marines : sçavoir, litt. B. ux d'Amérique, couleur de rose, papyracées, tries longitudinales un peu sinueuses, chargées rs le bas de quelques tuiles *; une violette des * qualt. tah. des, à tuiles plus longues & plus nombreu-79. litt. E. *; deux papyracées de la côte Coromandel, * Arg. pl. 227 rdâtres nuées de pourpre, à stries fines non ilées *; une rare par sa forme bizarrement * List. tab. ntournée, à grosses stries longitudinales peu 371. fig. 212. imbreuses; une de l'espèce des dernieres de rticle précédent, & un By flus. 12.

906. Dix autres, la plûpart papyracées; sca-

nt une a quelques tules vers le bas; une 78. litt. C. gérement sinueuse vers la tête *; une gris de * Rumph.

Bb. iij ub. 46. let. No.

MOULES. 370. f. 211.

litt. A.

lin nuée de pourpre, à stries fines longitudina VI. FAM. les, traversées d'autres encore plus fines *; une * List. tab. violette presque en entier; trois des variétés déja décrites, & une comme la sixieme de l'article précédent, dont les deux valves sont considérablement arquées. Plus, deux Bysus, & deux plaques de Pinne-marine, taillées & polies, imitant la Cornaline, 94"10.

907. Six Pinnes-marines; sçavoir, deux de la Méditerranée, couleur de corne, à stries longirudinales peu prononcées, & à feuilletures transversales ondées & déchiquetées, couchées * Bonan et les unes sur les autres *; trois de la même mer Arg. pl. 22. dont une de forme moins allongée que les prélett. B.
Gualt. tab. 78. cédentes, de couleur plus obscure, & à feuilletures non déchiquetées; les deux autres sont de l'espéce des deux dernieres de l'article 904; & une du Sénégal, de huit pouces de long, de forme large & applatie, à stries longitudinales nombreuses, hérissées de tuiles plus ou moins

> longues, dont les plus grandes sont pliées en tuyaux cylindriques. C'est l'Apan de M. Adan-

* Adams. pl. fon *. 9.19. 15. £. 5.

908. Une Pinne-marine de la Méditerranée, de l'espéce des dernieres de l'article 904; elle * Séba, pl. porte un pied huit pouces de long *. On a joint gr. n°. I. à cette Coquille une paire de bas & une paire de gands de Byssus, qui ne cédent en rien à ceux de foie pour la finesse & la beauté. Ils viennent de la Manufacture de Naples. > 3



COQUILLES DE MER.

CLASSE TROISIEME.

MULTIVALVES.

On range sous cette classe, qui est moins nombreuse & beaucoup moins Multivals variée que les précédentes, les Coquilles composées de plusieurs pièces, ordinairement inégales entr'elles. Nous la diviserons en six familles, qui sont,

- 1º. Les Oscabrions.
- 2°. Les Pholades.
- 3°. Les Tuyaux de mer multivalves.
- 4º. Les Glands de mer.
- 5°. Les Pouce-pieds & Conques ana-
 - 6°. Les Oursins.



Bb iv

PREMIERE FAMILLE.

OSCABRIONS.

Na. Adanson a rangé ces Coquilles OSCABRIONS, dans la classe des Univalves, à cause de l'animal qui les habite, qu'il a reconnu appartenir au genre des Lépas; mais, comme nos divisions ne sont fondées que sur les Coquilles mêmes privées de leurs animaux, nous ne pouvons nous dispenser de rapporter cellesci aux Multivalves. Elles ont la forme d'un demi-ovoide, & sont composées de huit écailles courbes, posées en recouvrement les unes sur les autres de devant en arriere, relevées toutes dans le milieu d'une petite côte plus ou moins aiguë, & enclavées vers le bas dans une membrane flexible, écailleuse & chagrinée dans son contour. Cette famille ne contient qu'un seul genre,

> 909. Douze Oscabrions formant six variétés sçavoir, deux du Chili, à écailles violet-noir

nué de jaune vers le haut, traversées chacune dans le milieu d'une bande affez large, & de I. FAM. deux rayons obliques de même couleur que le OSCABRIONS. fond, à côte longitudinale obtuse, & à bords de la membrane deftitués d'écailles ou non chagrinés. Leur forme un peu arquée leur donne beaucoup de ressemblance avec une grosse Chenille, ou avec une Chaloupe, dont les membres & les varangues sont représentés par les écailles courbes de la Coquille ; deux à-peu-près de même forme, mais moins arqués, bleu céleste en dedans, à contour extérieur de la membrane revêtu de très-petites écailles qui imitent le chagrin, & de plus orné de taches alternatives grises & noires; deux de S. Domingue, plus grands que les précédens, gris cendré en dehors, & chagrines fur leurs bords *; deux de la * Arg. pl. 25. Caroline, gris de lin, nués de verdâtre, à taches lett. L. brunes triangulaires sur le milieu des écailles, pl. 61, nº. 3 qui sont chargées chacune vers les côtés de deux suites triangulaires de stries partie longitudinales, & partie tra sversales, à extrémités chagrinées ainsi que le contour, & blancs en dedans; deux petits de nos mers, bruns nués de verdâtre, & pointillés de gris en dehors, violets en dedans, à côte du milieu plus aigue que celle des précédens, mais du reste semblables pour les stries & la partie chagrinée *; Arg. pl. 278 deux autres petits de couleur cendrée, de for-lett. M.

394 COQUILLES MULTIVALVES

I. FAM. OSCABRIONS.

me étroite & allongée, à bords de chaque écaille chargés de deux crans triangulaires & très-finement striés. Plus, un Oscabrion dont les huit piéces ont été détachées pour en faire voir la structure, & dont la membrane ressemble alors à la carcasse d'une chaloupe privée de son bordage.

910. Quatre très-grands Oscabrions des parages Magellaniques, de forme plus large & plus applatie que ceux de l'article précédent; deux desquels ont les écailles brunes tachées dans le milieu de blanc, & striées à-peu-près comme celles de la petite tortue de terre; les lett. V. Séba, tom. 2. deux autres sont tels qu'ils sont sortis de la pl. 61. n°. 6. mer *, 2, "



SECONDE FAMILLE.

PHOLADES.

CES Coquilles, dont le caractere général est de se loger dans les pierres ten PHOLADES. dres, l'argille & le bois, sont ordinairement composées de cinq ou six piéces fort inégales entr'elles, & plus ou moins fines, dont les deux plus grandes, qui font latérales, répondent aux battans des Bivalves; les autres, qui font beaucoup plus petites, se trouvent fixées par des ligamens partie sur le sommet & sur le repli extérieur de chaque battant, partie le long des battans mêmes, soit en dessus, soit en dessous. Ces dernieres piéces sont si fragiles & si minces, qu'il est rare de les trouver jointes aux deux principales qui d'ailleurs ne ferment jamais exactement. Nous connoissons deux genres dans cette famille; sçavoir,

- 10. Les Pholades sextivalves.
- 2°. Les Pholades quintivalves.

GENRE PREMIER.

PHOLADES SEXTIVALVES.

JII. FAM. voir, une de nos mers, blanc sale, de forme Pholades. allongée, à robe en rézeau granuleux dans les deux tiers de sa longueur, à valves sinueuses & évasées vers l'une des extrémités; elle con
TARG. Pl. 26. serve son animal; une autre de même coulett. H. I.
List. tab. 433. leur, mais de forme plus large, plus courte & f. 276.
Gual. tab. 105. plus hombée; elle n'est reticulée que dans sa litt. A. B. C. partie antérieure, le reste de sa robe n'a que des stries transversales en saçon de rides: l'ani
List. tab. mal y est aussi rensermé 2; une grande d'AméGual. tab. 105. rique, blanche, de forme allongée, à grosses séba, pl. 16. stries longitudinales tuilées partant des sommets,

traversées d'autres très-fines & onduleuses, à larges replis des valves sur les sommets, à larges replis des valves sur les sommets, &

³ List. tab. à bords dentelés ³; & une petite d'Angleterre , 60121. tab. 1055. entiérement réticulée 4. 6.

4 Lift. tab. 912. Idem. 3".?.
435. f. 278.
Gual. tab. 105. 913. Deux grandes

litt, E.

pendant, de la variété de la troisieme de l'article 911. 6.12.

DE MER.

913. (bis) Six Pholades de la Méditerranée, avec leur animal parfaitement conservé dans II. FAM. l'esprit-de-vin: elles formenttrois variétés. g. PHOLADES.

GENRE SECOND.

PHOLADES QUINTIVALVES.

914. DEUX Pholades des Indes, à cinq pièces, dont les trois petites sont placées, l'une sur les sommets, les deux autres le long des valves tant sur le dos que dans la partie inférieure : la forme totale de la Coquille est presque conique, & la robe en est partie lisse, partie très-finement réticulée, & partie simplement ridée *; plus, un morceau de bois qui se sépare en trois, contenant deux petites Pholades de tab.46. litt. H. cette espèce, & plusieurs cavités coniques que d'autres y ont creusées. Cette variété de Pholades n'est pas commune. 4"

915. Six Pholades de l'espèce précédente, dont cinq nichées en partie dans un morceau de

bois. 16.



TROISIEME FAMILLE.

TUYAUX DE MER MULTIVALVES.

Es Coquilles, que M. Adanson a TUYAUX DE distinguées le premier des Tuyaux de MER MULTI- mer univalves, ne différent de ces derniers que par deux valves ou par deux paires de petites valves qu'on trouve en dedans, qui, lorsqu'elles ne sont qu'au nombre de deux, peuvent faire regarder la Coquille comme trivalve, & comme quintivalve lorsqu'elles sont au nombre de quatre; ce qui constitue deux genres dans cette famille, que nous comprendrons dans les deux articles suivans.

> 916. Quatre petits Tuyaux trivalves d'Amérique, adhérens à un cœur de l'espéce nommée Marron épineux, composés chacun extérieurement d'un tuyau grisâtre fermé & bombé par un bout, chargé en cet endroit de tubercules, mais mince, foré, relevé & un peu applati par l'autre, & intérieurement de deux petites valves affez semblables pour la forme aux battans des

Pholades de la famille précédente : la ressemblance de ces Tuyaux avec une Cornue ou Re- III. FAM. torte, leur en peut faire donner le nom; un pe-TUYAUX DE tit Tuyau decette espèce, dont la partie supé-valves. rieure a été enlevée pour faire voir les valves intérieures dans leur position naturelle ; deux autres petites valves détachées de l'un des quatre Tuyaux précédens; une espéce de fruit spongieux que l'on trouve sur le rivage de la côte Coromandel, dans lequel sont logés plufieurs Tuyaux quintivalves diversement contournés, fermés & bombés par un bout, minces & forés de l'autre; deux Tuyaux de même espéce, l'un desquels a été troué à sa partie bombée pour en tirer les quatre petites valves intérieures, dont les deux qui occupent la partie inférieure du Tuyau, sont arquées, & les deux qui se trouvent à l'extrémité supérieure, sont en forme de palettes ou de petites cuillers à manche court; ce qui doit faire regarder cette espèce de Tuyaux, comme une variété de celle que M. Adanson a décrite sous le nom de Taret; un autre Tuyau quintivalve blanc, long, un peu sinueux, fermé par le bout le plus large, d'une espèce d'opercule hémisphérique, qui est comme engagé dans le Tuyau; ouvert par le bout le plus étroit, dont l'orifice est parragé par une cloison longitudinale de peu d'étendue, en deux petits demi-cylindres inégaux, & dans

COQUILLES MULTIVALVES

VALVES. 29. f. 1:

Pintérieur duquel on reconnoît en l'agitant III. FAM. que sont contenues les petites valves qui lui Tuyaux DE sont propres ; c'est le vrai Taret rongeur de bois de M. Adanson *; deux Tarets d'une autre va-* Adans. pl. riété, dont le dedans est sur-tout remarquable par un grand nombre de feuillets circulaires minces, en vive arrête, & placés en forme d'anneaux, à distances à-peu-près égales les uns des autres vers le bout le plus étroit du Tuyau, l'un desquels a été coupé dans la longueur de plus d'un pouce, pour en mettre la construction intérieure à découvert *. Plus, deux valves arquées provenantes de cette variété de Tarets, lesquelles sont beaucoup plus larges que celles des autres variétés. 29.12

41. litt. F. G.

917. Quatre morceaux de bois criblés & vermoulus par des Tarets de la derniere variété de l'article précédent : l'un desquels est un morceau de sapin de treize pouces de long sur quatre de large & autant d'épaisseur, dont une des faces présente encore un de ces Tuyaux niché dans son trou, & des fragmens de plusieurs autres. Les trois autres morceaux font beaucoup moins grands, & contiennent plus ou moins de ces Tuyaux. at 12



QUATRIEME

QUATRIEME FAMILLE.

GLANDS DE MER.

CES Coquilles, dont le caractere diftinctif est de s'attacher par groupes IV. FAM. nombreux aux cailloux, aux autres co- MER. quillages, & généralement à tous les corps qui se présentent, sont composées de deux portions, l'une extérieure de forme cylindroïde ou conoïde, & l'autre intérieure de forme pyramidale quadrangulaire.

La premiere de ces portions ressemble à un calice formé de douze pétales triangulaires oblongues, liées intimement les unes aux autres, dont six plus épaisses ont leurs pointes vers le haut, & six plus minces ont les leurs renversées.

La seconde est composée de quatre valves triangulaires à coulisse, que l'animal a la faculté d'écarter les unes des autres par leurs pointes, pour en faire

Tome I. Cc

COQUILLES MULTIVAL VES fortir un panache, au moyen duquel il IV. FAM. se procure sa nourriture. Cette famille

GLANDS DE ne contient qu'un seul genre.

MER.

litt. H.

litt. E.

lett. C.

918. Quatre groupes de Glands de mer, & la portion intérieure détachée d'un autre Gland de mer: sçavoir, le premier groupe de deux Glands violets de diverses nuances, d'environ deux pouces de diametre dans le bas, & de, presque autant de hauteur, à pétales épaisses chargées de stries longitudinales, & pétales minces striées transversalement, espèce nom-* Arg. pl. mée Gland de mer Turban * : le fecond de deux 26. lett. A. Gual. tab.106. glands de forme moins renflée, de plus de deux pouces de haut sur un pouce de diametre dans le bas, à pétales épaisses amaranthe clair, & pétales minces violet nué de blanc, striées comme celles des précédens, & de l'espéce nommée * Rumph. Gland de mer Tulipe *: le troifieme d'un grand tab. 41. lit. A. nombre de petits Glands violet clair & blancs, adhérens à un grand Lépas, & nommés fim-* Arg. pl. 26. plement Glands de mer rayés *, & le quatrieme d'un grand nombre d'autres Glands blanc fale, très-petits, & conservant presque tous leur

* Gualt. tal. portion intérieure * : ce dernier est de nos mers; 106. litt. G. les trois premiers viennent des Indes. 3" Bonan. cl. r. no. If.

919. Deux Glands de mer: sçavoir, unrare, violet, dont les pétales épaisses sont chargées d'épines, & nommé Gland épineux ; il adhére à une valve de Conque anatifere; un de la Méditerranée, conservant ses valves intérieures, IV. FAM. fixé sur une petite branche de Corail rouge, & GLANDS DE recouvert en entier de cette substance; & une Moule Magellanique violette, à tête blanche. dont une des valves est chargée d'un grand nombre de petits Glands de mer blancs & lilas, à stries longitudinales ondées sur toutes les pétales, & garnis tous de leurs valves intérieures. 22.2.

920. Un groupe de trois Glands de mer Turbans, & un de trois Glands de mer Tulipe, adhérens à un fragment de Moule Magellanique; deux Glands de mer revêtus de Corail rouge. liés ensemble par deux branches de même matiere; un d'Amérique, couleur de rose, dont les pétales épaisses sont sans stries longitudinales, mais seulement un peu rabotteuses, & dont les pétales minces finissent par une section oblique, ce qui en rend la bouche crénelée; & un Gland Turban adhérent à une valve de Crête de coq; en tout dix Glands de mer. 15.2.

921. Quatre groupes de Glands de mer : sçavoir, un de plusieurs petits couleur de rose, adhérens à un Lithophite épineux, & formant un joli bouquet, auguel ce Lithophite sert de tige; trois autres de gros Glands Turbans, dont un de cinq, & deux de trois chacun; un Pétoncle & un Lépas de nos mers, chargés l'un & l'autre de petits Glands de l'espèce commune.

Cc'ii

COQUILLES MULTIVALVES

MER.

Plus, une Coquille des mers du Nord, formée extérieurement comme les Glands de mer, mais GLANDS DE différente en ce que les douze pétales en sont un peu recourbées vers le haut, six desquelles sont chargées chacune de quatre côtes striées transversalement, & en ce que la base en est concave, percée dans le milieu d'un trou rond, & divisée en plusieurs cellules étroites & profondes; espéce que l'on trouve adhérente à la peau des Baleines, & qu'on nomme par cette raison * List. tab. Pou de baleine *: en tout sept piéces. 18.

445- f. 288. Gual. tab. 106. lett. Q.

922. Un groupe de six Glands de mer blancs & de la forme d'un cône tronqué, à pétales épaisses chargées de stries longitudinales trèsfaillantes en forme de rayons, de l'espéce nommée Clochette; & adhérens au dos d'un Crabe; un Gland de mer blanc nué de violet, à pétales épaisses & minces, mieux prononcées que les précédentes, ce qui lui a fait donner le nom de Gland de mer à côte de Melon : il est chargé d'onze autres petits Glands de même espéce; un Gland revêtu de corail rouge, tenant à une branche de même matière, & représentant une tulipe avec sa tige; un groupe de Glands couleur de rose, & un de trois gros Glands Turbans; en tout eing piéces. 14"




CINQUIEME FAMILLE.

CONQUES ANATIFERES OU POUCE-PIEDS.

Ces Coquilles, qui doivent le premier de ces noms à la fausse opinion où l'on V.FAM.
étoit autresois que certains canards de PIEDS.
mer y prenoient naissance, sont toutes remarquables par un pédicule plus ou moins long, qui leur sert de support.
Nous n'en connoissons que trois es-péces.

1°. Celle qui a retenu le nom de Conque anacifere, & qui est composée de cinq valves à peu près triangulaires, assez dissérentes entr'elles, dont deux grandes & trois petites, portées sur un pédicule membraneux, long, étroit & ridé.

2°. Les Pouce-pieds de nos mers, lefquels sont composés de cinq valves inégales, dont deux ovales & convexes, deux lozanges, & une en forme de bec,



fans compter un grand nombre d'autres V. FAM. POUCE. plus petites qui toutes sont portées sur pédicule court, large, noirâtre, chagriné & assez semblable à une bottine.

3°. Les Pouce-pieds des Indes, composés de huit grandes valves & d'un grand nombre de petites recourbées en façon de panache, & portées sur un pédicule large & long.

923. Un groupe de Conques anatiferes des Indes, adhérentes par leurs pédicules trèslongs, à un morceau de bois de sapin de qua-

* séba, pl. torze pouces de hauteur *. 32.74.

924. Un très-beau groupe de Pouce-pieds de nos mers, formant un bouquet de huit pouces tant de hauteur que de largeur, & de la plus parfaite conservation, sur lequel se trouvent quelques Moules entremêlées avec les Pouce-

* Arg. pl.28. pieds *. 60".

925. Six variétés de Pouce-pieds: sçavoir, deux Pouce-pieds des Indes, rares, nommés Couronnes de serpens, tous deux isolés & privés

* Séba, tom. de leurs pédicules *; deux de nos mers, de la 2. pl.61. n°.8.

Ibid, tom. 3. variété de ceux de l'article précédent; deux pl. 16. n°. 3; branches, l'une de trois, l'autre de cinq ConRumph. tab.

ques anatiferes d'Europe, à pédicule large &

court ; dix Conques anatiferes, à pédicule mince, groupées ensemble 2; un paquet de V. FAM. plusieurs autres enfilées, & un morceau de bois piens. de sapin, chargé de Conques anatiseres des 1 Séba, pl. 16. nº. 1. b. Indes, de la variété de l'article 923. 14.1.

² Ibid. n°. Arg. pl. 26. lett. G.



SIXIEME FAMILLE.

OURSINS.

VI. FAM.
OURSINS.

E sont des Coquilles de sorme voûtée plus ou moins convexe, composées d'une quantité prodigieuse de piéces de rapport fragiles, hérissées de pointes nombreuses qui tombent après la mort de l'animal, & qui laissent alors à découvert les apophyses & les petits trous sans nombre dont la Coquille est couverte.

Le célébre M. Klein, en donnant au Public deux distributions de ces Coquilles, tirées l'une de l'anus, l'autre de la bouche, dit qu'il en auroit pû faire une troisieme prise de la figure extérieure: c'est celle que nous présentons dans ce Catalogue, non comme la plus parfaite, mais comme la plus simple & la plus commode. Nous diviserons donc les Oursins en six genres; sçavoir,

re. Les Oursins de forme hémisphérique ou sphéroïdale, nommés Turbans Oursins. (Cidares.)

2°- Les Oursins de forme ovoide, échancrée d'un côte, à base un peu applatie, & à partie supérieure sillonnée, nommés Cœurs marins, Barillets ou Pas de poulain (Spatagi.)

3°. Les Oursins de forme ovoide sans échancrure, & fort convexe depuis la bouche jusqu'à la pointe tronquée, nommés Oeus marins ou simplement Ovoides (Brissi).

4°. Les Oursins à pans irréguliers, de forme large & peu bombée, & ornés dans leur partie convexe d'une espéce de fleur à cinq pétales, nommés Pavois ou Boucliers (Scuta.)

5°. Les Oursins de forme applatie, ornés dans leurs deux faces de cinq feuilles, & percés ou non de quelques trous oblongs, nommés Gâteaux ou Beignets (Placentæ.)

6°. Les Oursins de même forme que

410 COQUILLES MULTIVALVES

VI. FAM.
OURSINS.

les précédens, mais dont la moitié & plus de la circonférence est rayonnée ou dentée en forme de roue, tandis que l'autre moitié est entiere & arrondie, nommés Rotules (Rotulæ.)

GENRE PREMIER.

TURBANS.

née, couleur de rose, de forme sphéroidile, à sommet très-élevé, à bouche ronde, située, ainsi que dans tous ceux de ce genre, au milieu de la base, qui est un peu convexe, à grands petits colures, chargés d'apophyses nombreuses en forme de grains de millet, qui ont sait donner à cette espèce le nom de Turban miliaire; & desquels l'un est encore hérissé de ses piquans jaune pâle, sins comme des aiguilles.

927. Deux grands Turbans miliaires de la même mer, violet foncé, de forme sphéroïdale, mais à sommet moins élevé que les précédens, hérissés tous deux de petits piquans ai-

* séba, pl. guille fauve-gris *. 4.10.

12. nº. 9.
Klein. pl. 1.
228. Deux autres, dont un fauve-verdâtre, lett. A.
à fommet élevé, à base applatie, & hérissé de

piquans verds, clair semés & un peu longs: l'autre est de la forme de ceux de l'article pré- VI. Fam. cédent, mais un peu plus petit, d'un beau violet, ainsi que ses piquans dont l'extrémité tire sur le blanc. 3.1.

929. Deux très-grands Turbans miliaires de la Méditerranée, dépouillés de leurs piquans, de forme sphéroïdale, à petits colures nués de couleur de rose, de verdâtre & de brun, à panneaux bien prononcés, dont les rangs de sutures sont fauve clair, à base presque platte, & nommés particuliérement Turbans à panneaux *. 6.5.

930. Trois Turbans miliaires, dont deux de Klein. pl. 50 la Méditerranée, de la forme de ceux de l'article 927, mais plus petits, violets ainsi que leurs piquans ; & un d'Amérique, dépouillé de ses pointes, de forme hémilphérique, & à bouche décagone de cinq grands & cinq petits côtés alternatifs *. 3.1.

931. Sept Turbans miliaires: sçavoir, cinq 1. lett. D. armés de leurs pointes, dont un violet foncé, à piquans fauve clair; un noirâtre en entier; un marron, à piquans violets; un couleur de rose, à piquans blancs rabattus; un olive foncé en entier; & deux dépouillés de leurs piquans, dont un couleur de rose, à apophyses jaunes, & un violet, à apophyses fauve clair. 4.2!

932. Douze Turbans miliaires, dont dix de

* Gualt. tab. 107. litt. E.

* Ibid. pl.

COQUILLES MULTIVALVES

OURSINS.

movenne grandeur & deux petits, fix des-VI. FAM. quels sont hérissés de leurs piquans, & de couleurs variées: parmi ceux qui en sont privés deux sont verds de diverses nuances, deux couleur de rose, un nué de couleur de rose, de fauve & de brun; tous les cinq à apophyses blanches, & un gris de perle en entier. 3"8'

933. Trois Turbans d'Amérique: sçavoir deux grands fauves, teints l'un de rougeâtre, l'autre de blanc, dépouillés de leurs piquans; tous deux à sommet élevé, à cinq espéces de pans arrondis, & à bouche décagone sinueuse dans les angles, nommés Turbans miliaires an-

* Klein. pl. guleux *; & un petit rare, noirâtre, hérissé de piquans très-longs & très-nombreux, nommé

* Rumph. Ourfin à soyes *. 3". tab. 13. no.5.

934. Huit Turbans dépouillés de leurs piquans, dont un grand & sept petits: sçavoir, le premier des Indes, rare, miliaire anguleux, à base & sommet applatis, à colures marbrés dans toute leur longueur de verd & de violet. & par bandes transversales de blanc, & à bandes percées de trous, larges, blanches & repré-*Arg. pl. 25. sentant une espèce d'ouvrage en filigrane *; un des Indes, rare, miliaire, verd pâle, à tête élevée, à colures grands & petits peu inégaux en largeur, chargés d'apophyses nombreuses, entre lesquelles les bandes percées de trous, pa-


roissent à peine; deux de la Méditerranée, mi-

Séba, pl. 11. nº. 6. A. B. Gual. tab.107. Ser. M.

liaires & applatis, à colures verd foncé, & à bandes percées de trous, blanches 1; deux de VI. FAM. l'Océan, miliaires aussi, très-applatis, & verd Oursins. foncé en entier ; & deux de l'Isle de France, 10.10 13. a.b. nués de fauve & de couleur de tuile, à cinq lett. B. 2 Ibid. let. C. grands & cinq petits colures, séparés par des bandes en filigrane, & apophyses de moyenne grandeur, qui ont fait donner à cette espéce le nom de Turbans à grains de petite vérole3. 3.1.

935. Huit Turbans dépouillés de leurs pi-lett. G. H. quans: sçavoir, deux des Indes, rares, à grains de petite vérole, dont un fauve clair, à bouche décagone sinueuse dans les angles, & à base applatie; & un gris-vineux, à petits colures élevés, à grands colures enfoncés & dépourvus d'apophyses dans le milieu de leurs parties supérieures, & à bouche large, nomméle Turban turc 4; & six miliaires de la Méditerranée, des variétés déja décrites, dont cinq verds à tab. 14. likt. B. apophyses blanches, & un grisâtre. 3.15.1 lett. B.

936. Deux Turbans de l'Isse de France, à grains de petite vérole, peu communs: sçavoir, un violet foncé, recouvert en entier de grands piquans applatis en forme de spatules ou de pignons de pommes de pin, se recouvrant mutuellement, & ne laissant voir les uns des autres en dessus, que de petits pentagones dont l'arrangement imite celui des carreaux d'une chambre, à base hérissée aussi de petits piquans



VI. FAM. que sa ressemblance à un artichaut, a fait appeller de ce nom; d'autres le nomment le Char-

* Arg. pl. don*; & un de même espéce, dépouillé, violet 25 lett G.
Klein, pl. 23. clair, dont la forme est alors elliptique, à base lett. A. B.

platte, à bouche large & sinueuse, & à grand

* Ibid. pl., nombre d'apophyses *. 19-2.

937. Idem. 19.1.

938. Un grand Turban d'Amérique à grains de petite vérole, rare, de forme sphéroidale applatie, noirâtre en entier, à piquans cylindriques longs & fins, chargés de stries longitudinales granuleuses qu'on ne distingue bien qu'à la loupe, & finissant tous par une pointe ob-

* séba, pl. tuse & forée *. 5.

Rlein pl. 27.

939. Un Turban des Indes, de forme elliptique, rare & très-bien conservé, à cinq grands & cinq petits colures, chargés chacun de deux rangs longitudinaux de grosses apophyses en forme de mammelons: cet Oursin est garni de ses dents, & hérissé dans le corps de gros piquans en forme de pieux de palissade ou de doigts, cendrés, rayés vers le bout & par zônes de sauve clair, longs, arrondis, finissant en

*Ibid. pl. 21. tiers point *; & vers la base, d'autres piquans Arg. pl. 2) plus petits en forme de spatule, violet nué de fauve. Rumphius nomme cette espèce l'Oursin

* Rumph. digite *. 100

tab. 13. n°. 2. Séba, pl. 13. 940. Un grand Turban à mammelons, & din°. 1 & 2. gité, de même forme que le précédent, mais hérissé dans le corps de piquans d'une variété VI. FAM. rare, en ce qu'ils font très-longs, d'une seule OURSINS. couleur verdâtre, & ornés d'une côte longitudinale en vive arrête, qui les fait paroître comme triangulaires; les piquans de la base sont en forme de spatule, beauçoup plus courts, & violet nué de fauve * : cet Oursin est garni de * Séba, pt. sés dents, & porte près d'un pied de, diametre en mesurant de l'extrèmité des piquans d'un côté, à l'extrémité des piquans de l'autre. 40.

941. Un Turban à mammelons de la Méditerranée, peu commun, de forme sphérique, noirâtre, à gros piquans gris, à-peu-près cylindriques, & cannelés vers l'extrémité qui est arrondie *. 9.

942. Un Turban à mammelons de l'Isle d'Amboine, sphérique, noirâtre, à gros piquans peu longs, en forme de pilon, chargés de stries longitudinales granuleuses bien prononcées vers l'extrémité, qui s'élargit & forme une espéce de tête sur laquelle les stries se prolongent en façon de rayons *. 6."

943. Deux Turbans à mammelons de la Méditerranée, de forme sphérique, l'un fauve dépouillé de ses piquans, garni de ses dents, à cinq grands colures chargés chacun de deux rangs de mammelons, & séparés les uns des autres par des bandes onduleuses dont les bords

* Ibid. nº . 3.

416 COQUILLES MULTIVALVES

_ sont en filigrane, nommé le Turban maure 1; VI FAM. & un Turban maure garni de ses piquans ronds, OURSINS. très-longs, s'amincissant de leur base à leur ex-1 Rumph. tab. 13. nº. 3. trémité, striés en longueur, & forés dans le Klein. pl. 3. bout 2. 9lett. C. Arg. pl. 25.

lett. E. litt. E. Bonan. cl. r.

944. Quatre Turbans à mammelons : sça-Gual. tab 108. voir, un de la Mer Rouge, blanc sale, dé-² Ibid. lit. D. pouillé de ses piquans, de forme hémisphérinº. 17 & 18. que, à cinq grands colures chargés de deux 3 Arg. pl. 25. doubles rangs de mammelons, & cinq petits colures chargés d'un double rang seulement 3: & trois Turbans maures un peu moins grands que les précédens, dont deux dépouillés de leurs piquans: on a enlevé la base & le sommet de l'un de ces Oursins, & on donne à part les dents & osselets, formant ce que l'on appelle la Lanterne d'Aristote : le troisseme est garni de ses piquans grands & petits. 8.

945. Cinq Turbans à mammelons : sçavoir, deux d'Amérique, à piquans gros & courts. grisâtres, striés & granuleux, terminés par une 4 Séba, pl. couronne platte, d'où sort un petit mammelon Rumph. tab. radié 4; un de même espèce, dépouillé de ses pointes, remarquable en ce que, quoique les grands colures en soient fort larges, on n'y trouve que deux rangées de gros mammelons. séparées par un amas d'autres très-petits; & deux Turbans maures, l'un garni de ses piquans, l'autre d'un beau violet dépouillé des fiens, 6. 946.

946. Huit Turbans dépouillés de leurs piquans, & par pendans: sçavoir, deux grands VI. FAM. à mammelons, de l'espéce de celui de l'article Oursins. 940 *; deux moins grands, qui ne différent de * Gualt. tab. ceux-ci qu'en ce que les apophyses de leurs petits colures ne se continuent point jusqu'au fommet; ils appartiennent à l'espèce de l'artitab. 13. n°. 1.
clé 939 *; & quatre à grains de petite vérole, Gual tab. 108.
dont deux à hase un peu convexe. & à groffes. dont deux à base un peu convexe, & à grosses Klein. pl. 3. apophyses peu nombreuses *; & deux comme ett. A. B. * Ibid. pl. 24 le dernier de l'article 936. 4."





Tome I.

Dd

GENRES II & III.

CŒURS MARINS ET ŒUFS MARINS.

947. LINQ Cœurs-marins: sçavoir, un de VI. FAM. nos mers, de forme large & médiocrement OURSINS. convexe, orné en dessus d'une seur à cinq pétales en forme d'étoile, quatre desquelles sont bordées d'une double rangée de petits trous; fémé dans le reste d'apophyses inégales & peu saillantes, à échancrure peu profonde dans le haut, qui se prolonge jusqu'à la bouche : celleci est près de la circonférence, ainsi que dans *Atg pl. 25. tous les Oursins de ce genre 1; & quatre de lett. K. forme plus oblongue & plus bombée, dont un de nos mers, à sillon large & assez profond, qui passe du dos jusqu'à la bouche, accompagné fur le dos seulement de quatre autres plus petits posés obliquement, percés chacun de quatre rangées de trous, & à robe semée d'apophyses

Lit. I. très-fines, espéce nommée Pas de poulain ; Gual. tab. 109 un de même espéce, revêtu encore de ses pilit. D. Séba, tab. 100 quans capillaires ; un d'Amérique, de même no. 21. a.b. Sklein. pl. forme & de même grandeur, mais différent en se suit. A B

+ Gualt. tab. finueux 4; & un de nos mers, plus gros, de

forme un peu plus oblongue que les précédens, & ne différant d'ailleurs du second qu'en ce que VI. FAM. les fillons en sont tous très-prosonds; espéce Oursins. nommée Tête de mort *. 21

948 Les mêmes Ourfins, avec cette diffé-tab. 14. no. 20 rence que le premier est ici plus bombé, & nº. 16. que le quatrieme est couvert en partie de ses

piquans capillaires. 17 19

949. Sept Oursins: sçavoir, quatre Ovoides ou Œufs marins, dont un de forme étroite. gris en dessus, blanc en dessous, à quatre larges fillons partant d'une cavité garnie de quatre trous, ornés chacun de quatre rangées de petits trous, & entourés d'un autre sillon trèsléger, qui représente une espèce de demi - dalmatique, à base un peu convexe, & à trèsfines apophyles*; un de même espéce, couvert * Klein. pl en entier de ses piquans capillaires gris, lesquels 3, lett. D. Gual. tab.1096 ressemblent à de gros poils de souris; deux d'A-lit. A. Rumph. tab. portion plus bombé *; & l'autre gris en entier, * Ibid. n°. peu commun, de forme large, à robe semée 19. a. b. d'apophyses blanches entourées chacune d'autres plus petites, à fillons ponctués très - profonds, entourés d'un autre étroit & peu prononcé, dont le contour représente cinq bastions avec leurs flancs & leurs courtines: les trois autres sont des Cœurs-marins, dont un de

Dd ii

420 COQUILLES MULTIVALVES

VI. FAM. OURSINS.

Pas de poulain de nos mers, de la variété du fecond du même article, l'un desquels est garni de ses piquans. 15.16.

950. Idem. 14.

de forme large un peu élevée, gris nué de fauve en dessus, blanc en dessous, orné comme les précédens dans sa partie convexe, d'une étoile à cinq rayons, dont quatre seulement sont percés de petits trous, à intervalles des rayons formant un compartiment chargé d'apophyses assez grosses, entourées d'autres très - sines, à apophyses du dessous disposées d'une façon très-élégante, & chargées chacune de petits grains, qui à la loupe brillent comme autant de perles. Cette Coquille que les Hollandois regardent comme une variété de celles qu'ils ap*Séba, pl. pellent Têtes-mortes *, porte plus d'un demi*Séba, pl. pellent Têtes-mortes *, porte plus d'un demi*Séba, pied de long sur quatre pouces de large. 75.**



GENRE QUATRIEME.

PAVOIS OU BOUCLIERS.

052. 3 1 x Oursins de différentes grandeurs : scavoir, deux grands d'Amérique en pendant, VI. FAM. de forme un peu convexe en dessus, à base con-Oursins. cave vers le centre, à cinq pans arrondis, ornés dans leur partie convexe d'une rose à cinq larges pétales bombées, bordées chacune d'une double rangée de petits trous, & dans leur . partie concave, d'une étoile à cinq rayons caves & étroits, à robe semée dans toute son étendue de petits cercles creux dans lesquéls. sont les apophyses, espéce que sa ressemblance avec un Bouclier, a fait appeller de ce nom *; *Klein. pl. un des Indes, moins grand, plus convexe en séba, pl. 11. dessus, & plus concave en dessous que les pré-no. 2 & 3. cédens; un plus petit, qui en différe en ce qu'il litt. A. est plus applati, que la base n'en est presque point concave, & que les cinq pans en sont mieux marqués; variété nommée Pavois angulaire *; deux encore plus petits, de forme el- * Klein. pl. liptique, à base un peu convexe, à sommet seba, ph. 150. percé de quatre petits trous, d'où partent cinq no. 13 & 14. paires de rayons formant autant de pétales qui

Dd iii

COQUILLES MULTIVALVES.

VI. FAM. OURSINS. 1 Rumph, 86. lett. A. B. 3 Ibid. pl. 20. lett. H-P.

se prolongent jusqu'à la base 1. Plus, un grand Bouclier de l'espèce des deux premiers, coupé en trois pour faire voir les cloisons intérieures 2: tab. 14. litt. D. & dix Osselets en forme de soc dentelé, dont séba, pl. 15.
séba, pl. 15.
n°. 33 & 37.
font composées les cinq doubles dents molaires,

² Klein. pl.
& les cinq dents canines du même Oursin³

953. Un très-beau Pavois d'Amérique, portant près de neuf pouces de long sur sept & demi de large, de forme platte, à pétales plus oblongues & moins bombées que dans les premiers Boucliers de l'article précédent, à panneaux quarré-long, larges & bien prononcés; espéce nommée le grand Pavois applati, & ayant, ainsi que tous les Oursins de ce genre, la bouche au centre, & l'anus au bord de la base. 48.1.




GENRE CINQUIEME.

GATEAUX OU BEIGNETS.

954. DEUX Ourfins plats de l'Isle de Bourbon, ornés tant en dessus qu'en dessous d'une VI. FAM. fleur à cinq pétales, dont l'inférieure a ceci de OURSINS. particulier que les feuilles s'en sousdivisent & se ramifient en plusieurs autres : ils sont percés de part en part de six larges sentes, dont cinq placées près des bords à l'extrémité de chaque pétale, & la sixieme entre les deux pétales dela partie inférieure qui est la plus large *: cette * Klein, rt. espèce nommée Pain d'épice, à la bouche au 25 86 26. centre, & l'anus près de la troisieme partie de nº. 5 & 4. l'axe. Plus, un Oursin de même espéce, coupé en trois pour en faire voir le dedans, avec ses offelets. 5" 19!

955. Trois Pains d'épice: sçavoir, un de la Vera Cruz, peu commun, à cinq fentes, donc une au-dessous de l'anus, & quatre latérales *; un plus rare encore, à deux fentes seulement #1. lett. C. Gual. tab. 1202. vers le bas, & ayant l'anus près de la circon-lit. E. férence *; & un de la Barbade, à six sentes, qui n° 9 & 100 ne différe des deux de l'article précédent, qu'en sa leu de

Ddiv



ce que les fentes en sont plus longues & moins VI. FAM. larges *. 12".1.

OURSINS. * Klein. pl. Séba, pl. 15. n°.7 & 8.

956. Trois autres: sçavoir, un de la côte Co-24. lett. A. B. romandel, à fix fentes étroites, conservant ses piquans capillaires gris - cendré, de forme plus mince & plus platte que les précédens, un de la Barbade, à six fentes, & un de la Vera Cruz à cinq, semblables à ceux de l'article précédent. 957. Quatre Oursins plats: seavoir, deux de forme orbiculaire peu réguliere, à bords un peu relevés, ornés dans leur partie supérieure d'une

94.1. fleur à cinq pétales ; mais dépourvus de fentes ; espèce nommée Beignets ou Médailles*; & deux tab.14. litt. E. Pains d'épice, l'un à cinq & l'autre à six sentes. litt. B. C. Séba, pl. 15. Klein. pl. 12. lett. D.

958. Deux Ourfins rares, de forme platte & nº. 25 & 26. circulaire, mais un peu sinueuse dans son pourtour: sçavoir, un de couleur terreuse, à sommet un peu élevé, d'où partent cing pétales dont les extrémités se partagent en deux lignes qui s'écartent & se prolongent jusqu'à la circonférence; le dessein de sa robe, qui imite assez le rézeau de certaines toiles d'araignée, lui a fait *Ibid pl. 11. donner le nom d'Arachnoïde *: la bouche en est au centre de la base, & l'anus à la circonsérence; & un Arachnoide différent en ce que la couleur en est lie de vin noirâtre, la forme plus platte, les extrémités des pétales moins divergentes, & que l'anus en est placé un peu en deffus. 7. 8.

lett. A. Gual. tab. 110. litt. G.

GENRE SIXIEME.

ROTULES.

met un peu élevé, orné de cinq pétales affez VI. FAM.
femblables à la fleur du jasmin, & à douze
rayons dans la moitié de sa circonférence; espéce nommée l'Oursin solaire*: la bouche est
placée comme dans ceux du genre précédent, Klein. pl. 12.
mais l'anus est à la troisseme partie de l'axe; & séba, pl. 13.
deux peu communes, de forme plus applatie,
ornées dans la moitié de leur circonférence
d'onze échancrures, trois desquelles sont plus
prosondes; ces Oursins ont aussi deux sentes
latérales vers la partie non échancrée*. 6. * Klein. pl.

* Klein. pl.
* Klein. pl.
* Klein. pl.
* Klein. pl.
* Klein. pl.
* Klein. pl.
* Klein. pl.
* Klein. pl.
* Klein. pl.
* Klein. pl.
* Klein. pl.
* Klein. pl.
* Klein. pl.
* Klein. pl.
* Klein. pl.
* Klein. pl.
* Klein. pl.
* Klein. pl.
* Klein. pl.
* Klein. pl.
* Klein. pl.
* Klein. pl.
* Klein. pl.
* Klein. pl.
* Klein. pl.
* Klein. pl.
* Klein. pl.
* Klein. pl.
* Klein. pl.
* Klein. pl.
* Klein. pl.
* Klein. pl.
* Klein. pl.
* Klein. pl.
* Klein. pl.
* Klein. pl.
* Klein. pl.
* Klein. pl.
* Klein. pl.
* Klein. pl.
* Klein. pl.
* Klein. pl.
* Klein. pl.
* Klein. pl.
* Klein. pl.
* Klein. pl.
* Klein. pl.
* Klein. pl.
* Klein. pl.
* Klein. pl.
* Klein. pl.
* Klein. pl.
* Klein. pl.
* Klein. pl.
* Klein. pl.
* Klein. pl.
* Klein. pl.
* Klein. pl.
* Klein. pl.
* Klein. pl.
* Klein. pl.
* Ll. pl.
* Klein. pl.
* Klein.

960. Idem, à ces différences près que l'Oursin 12. lett. A. B. Gual. tab. 110. solaire n'a que dix rayons, & que l'une des litt. H. Séba, pl. 15. deux autres Rotules, a trois échancrures dans no. 17 & 18. la partie de la circonférence qui en est ordinai-

rement dépourvue. 10.2!

961. Un grand Carton très-intéressant, contenant quarante petites boëtes de dissérentes parties séparées d'Oursins, de tous les genres précédens: sçavoir, 1°. des Oursins coupés en divers sens pour en faire voir les parties intérieures: 2°. les dents & les osselets de plusieurs

426 COQUILLES MULTIVALVES, &c.

VI. FAM. O IRSINS. * Séba, pl. \$). n°. 12.


respeces, formant ce que l'on appelle la Lanterne d'Aristote*, dont une entiere, & les autres séparées; 3°. des piquans de toutes grandeurs, parmi lesquels il s'en trouve deux espéces extrêmement rares, dont on ne connoît point les Oursins; l'une est cylindrique, granuleuse & remarquable par des espéces d'anneaux ou de moulures dentelées, placées à distances égales; l'autre espéce est en sorme de suséau, à stries longitudinales granuleuses, hérissées de piquans très-pointus, &c. &c. &c. 9°.

961. (bis) Cinq Bocaux contenant douze Coquilles avec leurs animaux dans l'esprit-devin: sçavoir, un Lépas, une Tonne nommée l'Oublie, un Peigne, un Manche de couteau, une Came pholade, un Dail, une Pholade multivalve, un Buccin occupé par un Bernard l'hermite, deux Conques anatiferes, un Poucepied, & un Oursin, 12".



COQUILLES, &c.

427



SECTION SECONDE.

COQUILLES FLUVIATILES.

pas assez nombreuses pour pouvoir suivre ici le même ordre que dans notre premiere Section, nous les diviserons seulement en deux classes, les Univalves & les Bivalves. La premiere de ces classes ne renserme que six familles relatives à celles des Univalves de mer; seçavoir, les Lépas, les Plan-Orbis, les Limaçons, les Buccins, les Tonnes & les Vis. Nous n'en connoissons même que deux dans la classe des Bivalves, qui sont les Cames & les Moules ou Tenilles; ce qui nous engage à n'en point faire de subdivisions.



CLASSE PREMIERE.

UNIVALVES D'EAU-DOUCE.

962. VINGT - SIX petites Boetes contenant plusieurs Coquilles fluviatiles des trois premieres familles: sçavoir, six petits Lépas du lac de Genêve, blancs, lisses, à tête pointue & re-* Gualt. tab. courbée, & à bouche ovale *; six autres du 4. litt. AA. même lac, différens des précédens en ce que la robe en est réticulée, que la tête s'en éleve & recourbe davantage, & qu'on remarque dans le bord opposé au recourbement du sommet, une petite fente ou entaille, qui s'éleve jusqu'au * List. tab. quart de la Coquille *; un autre petit de la for-543. f. 28. me d'un demi-ovoïde, olive & transparent, orné de trois lignes longirudinales bleues par-*Ibid.f. 27. tant du sommet comme autant de rayons*; deux verd foncé, à stries circulaires inégales, à base presque ronde, & à tête élevée sans être sensiblement recourbée; quatre de la riviere des Lataniers dans l'Isle de France, dont deux à fommet un peu recourbé, & deux à appendice en demi-cornet; trois Tuyaux formés d'un amas de petites Coquilles fluviatiles, principalement de Plan-orbes & de Buccins, de petits brins &

filamens d'écorce & de bois, lesquels ont servi d'habit & de logement à une Teigne aquatique; huit autres Tuyaux à-peu-près semblables, de la riviere des Gobelins; trois autres Teignes de le fontaine de Verri près Genêve , revêtues de bois & d'écorce ; quatre Limagons à bouche ronde * olivâtres, à zônes marron, de forme * Arg. pl. bombée & élevée, dont un du lac de Genève, List. tab. 126. un de la Loire, & deux de la Seine; une petite f. 26. boëte d'Opercules marron clair, papyracés, litt. A. Séba, pl. 39. provenant de la même espéce de Limaçons; 20. 33 & 34. un Limaçon d'Amérique, du même genre, blanc dans le corps, à base & tête violettes, & à bouche presque triangulaire; cinq des Indes, de l'espéce du précédent, violets nués de blanc, à bouche formant un peu moins le triangle; trois Plan - orbes fauves des étangs d'Aranjuez *; trois Plan - orbes d'Amérique, * Gualt. tab. dont un blanc, de forme très-renflée, & deux 4. litt. D. D. gris; deux Plan - orbes de la riviere des Gobelins, l'un blanc & l'autre marron *; deux de la * Arg. pl. Seine; deux petits du lac de Genève, de for- 27. f. 8. me très-applatie, & à spirale chargée dans son fig. 41. milieu d'une côte mince en vive arrête, & fix petites boëtes contenant chacune douze petites Nérites de différentes rivieres de l'Europe *. 15 13 Arg. pl. 27. 963. Un Limaçon à bouche ronde d'Amé-f. 3. Gualt. tab. 4. rique, rare, fauve - blanc, marbré par zônes litt. LL. de taches quarré - long fauve-roux, à coque f. 38.

430 COQUILLES UNIVALVES.

mince & transparente, umbiliqué, & à lévres formant dans toute la circonférence de la bouche, un bord très-saillant, mince & plat; & deux Buccins non moins rares, blancs, à coque mince, à fix orbes, dont le premier est remarquable par un double applatissement du côté de la bouche, à lévres sinueuses & retroussées formant une espéce d'oreille, & umbiliqués. So 964. Une Nérite des Indes, rare, verd soncé, à six épines sorées, placées le long du milieu de la spirale, de plus en plus grandes à mesure qu'elles approchent du bord; la derniere de ces épines est plus longue que la Coquille même, qui conserve encores au mestire de constitue preme qui conserve encores au mestire de constitue de la coquille même, qui conserve encores au mestire de constitue de la coquille même, qui conserve encores au mestire de constitue de la coquille même, qui conserve encores au mestire de constitue de la coquille même, qui conserve encores au mestire de constitue de la coquille même, qui conserve encores se mestire de constitue de la coquille même, qui conserve encores se mestire de conserve

*Arg. pl. 7. même, qui conserve encore son opercule *. 12-2.

965. Deux Nérites rares, dont une verd de terrasse nuée de brun vers la tête & les bords, à stries fines transversales, à lévre intérieure dentelée, & extétieure finissant en une espéce *Gualt. tab. d'oreille ou d'umbilic *; & une de même espé-

4. lit. HH.

ce, polie & devenue blanche en dessus. 17"
966. Une très-grande Nérite du Mississipi, verd-noirâtre, ventrue & umbiliquée, à stries inégales en sorme de rides, qui partant d'un peu au - dessous de la clavicule, viennent toutes se perdre dans l'umbilic; espéce connue sous le

* Lift. tab. nom d'Idole *. 26.2!

précédente, dépouillée de son épiderme, & mi-partie de sauve & de blanc. 19

D'EAU-DOUCE.

431

968. Un Carton contenant dix - huit petites boëtes de Buccins fluviatiles : sçavoir, deux du Mississipi, rares, de forme oblongue, à bouche étroite & sinueuse, dont un revêtu de son épiderme verdâtre, l'autre dépouillé & gris de lin; un des Indes, ventru, blanc sale, marbré par taches longitudinales, & quelques zig-zags de rouge-brun; deux autres des Indes, de forme un peu moins renslée, & plus petits 1; un grand 1 Gualt. tab. des fossés de Geneve, blanchâtre, ventru, à s. litt. N. coque mince & clavicule très pointue 2; deux 2 Ibid. litt. L. des canaux d'Aranjuez, semblables au précédent, à cela près qu'ils sont plus petits & moins ventrus 3; deux de la Loire, & deux de la 7 Ibid. litt. I. Seine, à-peu-près semblables; deux petits des List. 1236 fossés de Genève, papyracés, à coque blonde & transparente 4; trois du même endroit, fort 4 Ibid. f. 23. ventrus, à bouche encore plus évasée, & re-litt. F. gardés par M. d'Argenville comme de petites Tonnes fluviatiles 5; deux d'auprès de Valence s Arg. pl. en Espagne, blanc de lait, à sept orbes renslés 27. f. 7. & à petit umbilic 6; deux fort petits du lac de f. 22. Gualt. tab. 5. Genève, blancs, ventrus, à bouche ronde 7; litt. G. quatre de la Marne, & seize de la Seine, à- 108. f. 1. peu-près de même forme; deux colorés de la Gualt. tab. 5. riviere de S. Thomé aux Indes orientales; cinq 7 Ibid. lit. B. de la Virginie, en forme de sabots, à petite côte aigue sur le milieu du dernier orbe 8; six de la Lézarde; deux de l'Isle de France, peu com- 111. f. 5.

COQUILLES UNIVALVES

muns, verd foncé, à sept orbes couronnés de tubercules aigus en forme d'épines, & nom-* Arg. pl. 27. més Thiares fluviatiles *; & cinq petites Thiares f. 6. Rumph. tab. fauves de la riviere de S. Thomé. 13.

33. litt. FF.

969. Vingt Coquilles fluviatiles: scavoir deux Buccins blancs, nués de gris de lin, marbrés par flammes longitudinales de marron, à tête couleur de rose, & à six orbes renssés; deux comme les quatrieme & cinquieme de l'article précédent; un des Indes, à bouche presque ronde, gris de lin tacheté par zônes de rougebrun; un autre rare, blanc rayé par zônes de fauve, à neuf orbes, dont les cinq derniers forment une clavicule aiguë, & les quatre autres renslés, finissant par une bouche ovale à doubles lévres retroussées en dehors, à stries fines longitudinales, & umbiliqué; deux petits peu communs, à cinq orbes renslés, terminés par

Arg. pl. une bouche faillante & toute ronde *; deux Thiares semblables aux antépénultiemes de l'article précédent; une plus petite, marron clair; une rousseâtre, grande & ventrue, à coque épaisse; une autre fauve; une petite blanche nuée de fauve, rare en ce que les épines qui couronnent les orbes, en sont moins nombreuses & plus réguliérement disposées; une Vis des Indes, rare, fauve-blond, marbrée par flammes longitudinales de rouge-brun, à cannelures

* List. 13b. en même sens, & à stries circulaires très-fines *; 317.f. 12.

8

D'EAU-DOUCE.

& cinq petites Vis brunes de la riviere de S. Thomé, à stries longitudinales & transversales formant un rézeau granuleux, 34#

CLASSE SECONDE.

BIVALVES D'EAU-DOUCE.

970. LINQ Cames fluviatiles, de forme à-peu-près ovale: scavoir, deux grandes & fort épaisses du Mississipi, dont une revêtue de son épiderme noir, à grosses côtes obliques & onduleuses en forme de rides, à stries circulaires fines & serrées, blanche nacrée en dedans, & à charnière formée dans l'une des valves, d'une très-grosse dent striée sous le sommet, & d'une longue avance latérale, qui s'engrainent dans les cavités & la rainure correspondantes de l'autre valve; & une d'une autre espéce, dépouillée, nacrée d'un très-bel orient tant au dedans qu'au dehors, & ornée de zônes alternatives blanches & couleur de chair : sa charniere différe de la précédente en ce que la grosse dent des sommets se subdivise en plusieurs lames striées & dentelées dans l'une & l'autre valve * ; une petite des Indes, revêtue en partie de son épiderme brun, 150. qui couvre une très-belle nacre, & à charniere

Tome I.

434 COQUILLES BIVALVES

formée de deux dents latérales; une petite des fossés de Genève, à stries sines circulaires, & à robe verte de plusieurs nuances; & une trèspetite du lac de Genève, verd d'eau, de forme plus applatie, mais du reste semblable à la précédente. 8."

971. Deux Cames du Mississipi, de l'espéce des deux premieres de l'article précédent, mais

plus grandes. 12# 2

972. Deux grandes Cames ovales du même fleuve, dont une revêtue en partie de son épiderme noir, qui dans les endroits où il a été enlevé, laisse paroître une très-belle nacre blanche en dehors, jouant l'opale en dedans; & une dépouillée jouant l'opale tant en dehors qu'en dedans, & déployant toutes les couleurs de l'arc-en-ciel: leur charniere est de la premiere espèce décrite dans l'article 970.24 L

973. Vingt-deux Moules ou Tenilles sluviatiles: sçavoir, deux grandes Tenilles d'étang, à coque très-mince, lisse, traversée de quelques rides, à sommet placé vers l'extrémité la plus large, & à charniere formée d'un filet longitudinal & d'une rainure correspondante peu sensible, toutes deux nacrées, & l'une revêrue de son épiderme verdêtre.

* List. tab. vêtue de son épiderme verdâtre *; une autre 156. f. 11.
Gualt. tab. 7. moins grande, mais plus bombée, à coque plus épaisse, conservant en partie son épiderme noirâtre : sa charnière est encore moins sensible qu'aux

D'EAU-DOUCE. 435

précédentes *; deux grandes du Mississipi, àbord finueux dans son milieu, à léger sillon s'éten- 155. f. 10. dant de la tête à cet endroit, à coque trèsépaisse. & à charnière de la premiere espèce décrite article 970 : l'une est blanche & dépouillée, l'autre conserve son épiderme noirâtre *, une de la riviere de Connel en Ecosse; * Ibid. taba deux des rivieres d'Irlande, blanches, revêtues 149. fig. 4. de leur épiderme verdâtre, & aux valves desquelles adherent de très - petites perles; deux de la Vologne en Lorraine, de forme un peu large & renflée, revêtues de leur épiderme noirâtre; & une petite boëte contenant douze perles provenant des Moules de cette espéce; deux de la riviere des Gobelins, à bords finueux d'un côté, à coque mince, revêtue de son épiderme verd clair *; une de la Loire, dépouillée, & d'une très-belle nacre *; une du Tage, de forme moins allongée, & deux de la Seine, oblongues, toutes trois dépouillées *; deux du * Ibid. Danube, jaune-verdâtre, rayonnées*; une de * Lift. tab. la Marne, de même couleur, mais non rayon-146. fig. 1. née *; deux petites du lac de Genève, papyra- * Gualt. tabe cées, de forme très - applatie, & à bords si- 7. litt. D. nueux; & une très-petite des fossés de Genève, de forme à-peu-près semblable, à stries transversales onduleuses & égales. 1549.



SECTION TROISIEME.

COQUILLES TERRESTRES.

Es Coquilles ne formant qu'une seule classe composée des trois familles suivantes, les Limaçons, les Vis & les Buccins, nous suivrons le même ordre que dans la Section précédente, sans entrer dans aucune fous-division.

974 Quatre Limaçons à bouche ronde, & umbiliqués, peu communs: sçavoir, un blanc marbré de jaune - roux, à bande transversale blanche, croifée d'une autre longitudinale de même couleur, à tête élevée, à six orbes renflés, & à lévre extérieure bordée en dehors * Lift. tab. d'un gros anneau ou bourrelet *; un plus petit; qui en différe d'ailleurs en ce que son sommet est moins élevé, que sa robe est blanche, à stries fines circulaires, & ornée dans le milieu d'une bande marron; un à-peu-près de même forme, à robe bariolée en rézeau de blanc & de souci, à pas des orbes bordés d'une suite de petits quarrés blancs & orangés, à base blanche ter-

53. f. 48.

coquilles TERRESTRES.

minée par une large bande orangé, & à lévres retroussées en dehors; & un à tête élevée, à bandes circulaires gris-bleuâtre, fauve & marron, à lévres faillantes & presque applaties. 3.

975. Un Limaçon rare de la Chine, gris de lin, à bouche & pas des orbes bordés d'une petite zone blanche, & ceint dans le milieu du corps, d'une autre de même couleur qu'une ligne blanche bordée de rouge, traverse en forme de croix. M. d'Argenville a rangé cetté Coquille parmi celles de mer *. 12.17

976. Six jolis Limaçons à bouche presque len. B. ronde, & peu communs: sçavoir, un de la Chine, verd nué de violet, à pas des orbes couronnés de rayons blancs, dont plusieurs se prolongent sur le corps en zig-zags jaunes, & à deux petites bandes longitudinales de même couleur vers l'extrémité du premier orbe; & cinq d'Amérique, dont deux jonquille, à bouche & pas des orbes bordés de rouge & de blanc, & de plus ornés d'une petite bande longitudinale blanche vers le milieu du premier orbe*; un fauve, à bouche & pas des orbes bordés de brun, & orné dans le milien du corps 55. f. 60. d'une petite zône blanche bordée de brun; & deux verd foncé, l'un desquels a la bouche & les pas des orbes bordés de jaune pâle. go".

977. Un gros Limaçon à bouche presque ronde, rare, a robe marron, imitant la cou-

Ee iii

leur & l'éclat de la sardoine, à quatre zônes blanches dans le corps, dont la derniere se pro-30". 1. longe sur tout le bord de la spirale jusqu'à la * List, tab. clavicule, & à lévre extérieure en bourrelet *.

978. Un autre de l'Amérique méridionale, non moins rare, à robe marron, ornée vers le bas d'une large zône blanche, qui s'étrécissant à mesure qu'elle s'éleve davantage, se change à la naissance du premier orbe, en une simple ligne jaunâtre jusqu'à la clavicule qui en prend la couleur, à bouche rouge de corail clair, &

* Séba, pl. à lévre extérieure large & retroussée *. 31.

ovale, peu communs, dont un a deux larges zônes dans le corps, l'inférieure rousse, & la supérieure fauve, qui se prolongent sur tous les orbes: l'autre à robe blanche, tous deux à clavicule brune, de sorme large, umbiliqués &

* Arg. pl. de l'espèce nommée Œil de bœuf *. 12"
6. lett. E. Gualt. tab.r. 980. Deux grands Limaçons rares, à bouitt. A. cho ovele à gâres elements.

che ovale, à zônes alternatives marron, & blanches nuées de bleu, à fix orbes peu élevés, dont le premier est très-bombé, à large & profond umbilic, & à lévres bordées d'o-

* Séba, pl. rangé * 24 Labrod offined un vortes on s'

1981. Six Limaçons de l'espéce des précédens, siçavoir, un grand couleur de noisette, à bouche bordée en dedans d'aurore vif, & en dehors de blanc, ainsi que l'intérieur de l'umbilic qui

est très-large, & à pas des orbes un peu concaves *; un verd clair, à quelques bandes lon- * Gualt. tab. gitudinales brunes; un rayé par zônes de verd 2. litt. T. clair & de marron; un noisette & un marron, à zônes brunes peu prononcées; & un fauve de diverses nuances, à deux zones étroites brunes, dont la derniere se prolonge sur tous les orbes, & à umbilic moins grand que les précédens. 18.

982. Douze Limaçons à bouche ovale : sçavoir, un verd clair, à deux doubles zônes brunes dans le bas du corps, à sommet plus élevé, mais du reste semblable à ceux de l'article précédent; deux de la côte Coromandel, peu communs, verd plus foncé, à très-petit umbilic, & conservant leurs opercules; six d'Amérique, à spirales roulées l'une sur l'autre comme dans les Planorbes, à un côté plus concave & umbiliqué, nommes Cornets de Saint-Hubert, dont deux rayés par zônes de blanc & de brun; deux d'olive & de marron, & deux de fauve clair & de marron *; & trois autres Cornets de Saint- * Arg. pl. 28. Hubert, très-petits, à sept orbes roulés dans f. 6. 2. Rumph. tab. un même plan. 6. porquis "

983. Deux Limaçons rares, à bouche ovale comprimée, & dont le milieu du premier orbe forme un pli en vive arrête : sçavoir, un blancgrisâtre, à robe très-finement réticulée, à quatre orbes presque dans un même plan, à sommet applati & a base un peu convexe *; & un * Guair. tab.

. 27. ditt. P.

F.e iv

gris-de-lin rayé de brun, à peu près de même forme, mais un peu plus convexe, à stries longitudinales obliques granuleuses & à lévre extérieure en bourrelet. 18"

984. Deux autres non moins rares & umbi-Tiqués, l'un de forme large un peu applatie, à robe fauve clair, ornée par zônes de chevrons canelle & rouge-brun, & à bouche en demiovale, dont les lévres sont légérement retrous-* séba, pl. sées *, l'autre de forme plus élevée, à clavicule 40. nº. 22 8 applatie, à robe fauve-roux, chargée de plis List. tab. 76. fins & onduleux blancs en forme de rides, à bouche ovale sinueuse, & à lévres très-saillantes

> 985. Un Limaçon rare, blanc, à petite bouche demi-ronde s'ouvrant du côté où est placée la spirale, à lévre extérieure retroussée, armée de quatre dents, & intérieure de deux seulement, de forme convexe des deux côtés, & à spirale marquée d'un simple sillon orangé très-

* Arg. pl. étroit *. 96.1. 28. f. 13 & 14. Lift tab. 99.

en dehors. 40#1!

£ 7.60

ng. 331.


986. Un autre Limaçon rare, fauve-roux, Bonan. cl. 3. de forme applatie, à fix orbes un peu renflés, dont le plus bas est marqué dans son milieu d'un pli en vive arrête, à base dont le centre est umbiliqué, & à bouche dont les deux lévres retroussées & sinueuses imitent assez les amfractuosités de l'oreille, & finissent par une es-

péce de goutiere qui se jette dans l'umbilic *, espèce nommée le Labyrinthe. 200. 5! 987. Idem. 200.

988. Six jolis Limaçons peu communs: sçavoir, deux à bouche demi-ovale, de forme applatie, blancs bariolés de traits obliques fauves, à deux zônes marron, dont la plus élevée se prolonge sur toute la spirale, à levres saillantes un peu finueuses, & umbiliqués *; un fauve à bouche demi-ronde, à six orbes roulés l'un sur l'autre, s'ensonçant dans le milieu qui est umbiliqué d'un côté, & à lévres un peu retroussées, nommé le Cornet de chasseur *; un à bouche *Gualt. tab. demi-ovale, armée d'un côté d'une dent, à robe Rumph. tab. fauve, bordée le long de la spirale d'une zône 27. litt. R. blanche, à tête un peu élevée, & à lévres blanches retroussées; un fauve orné sur le milieu du corps d'une zône orangé, à tête applatie, & à lévres très-peu faillantes en dehors; & un blanc à stries fines circulaires, & à tête médiocrement élevée. 36.47

989. Dix-huit Limaçons peu communs: sçavoir, deux blanes à bouche demi-ronde, à cinq orbes affaissés dans le milieu, à lévres saillantes, précédées d'un renslement transversal, & umbiliques ; un de Valence en Espagne, à bouche demi-ronde peu retroussée, blanc, à deux zônes marron dans le bas du corps, bariolé dans le reste de traits & de zônes sauves; deux

* Ibid. no.



à fix orbes un peu renslés, à lévres saillantes en dehors, & recouvrant l'umbilic, à bouche placée dans l'un de droite à gauche, & de gauche à droite dans l'autre, formant ainsi l'Unique & la Contre-unique de cette espéce; & deux fauvebrun, remarquables par un ensoncement transversal au milieu du premier orbe, laissant un repli intérieur, & à bouche garnie d'une grosse is a priority prigrate of

dent. 29: 19.

991. Dix gros Limaçons d'Amérique, à bouche demi-ovale, & par pendans: sçavoir, deux blancs de forme bombée, marron foncé en dedans, & à lévre extérieure retroussée, nommés l'Oignon blanc *; deux blancs teints en dedans * List. tab. de fauve, & de bleu vers la clavicule, à six orbes très-renflés, & à tête un peu élevée; deux marron clair, à zônes brunes fines & nombreuses, & du reste semblables aux précédens*; deux de l'espéce commune, blancs fasciés de 43. f. 40. fauve, l'un desquels conserve son opercule *; * List. tab. & deux marron foncé, à fix orbes applatis, Gualt. tab. 1. dont le premier a le milieu plié en vive arrête, litt. B. C. espèce rangée aussi parmi les Lampes antigues *. 6.4

992. Quinze Limaçons à bouche demi-ovale: Gualt. tab. 3. sçavoir, un rare, blanc nué dans une large zône d'orangé, de forme applatie, quoiqu'à orbes renslés, à lévres en bourrelet, garnies d'un côté d'une petite avance intérieure; un blanc teint

de fauve, de forme plus bombée, & à lévres en bourrelet, garnies d'un côté de quatre à cinq * List tab. dents *; un blanc qui ne différe du précédent qu'en ce que la bouche en est plus large & dépourvue de dents; deux blancs & un fauve, à

* Séba, pl. six orbes un peu affaissés & umbiliqués *; un Gualt. tab.3. rare blanc de lait, à peu près de même forme, mais sans umbilic, à spirale bordée de bleu céleste, à bouche très-étroite, à lévre extérieure

retroussée, échancrée, & fous laquelle on re* Seba, pl. marque deux dents *; un de l'espéce de celui
de l'article 978, mais dont la bouche est bordée
de noir; un comme les deux premiers de l'article 988; un qui en dissére en ce que le sommet
en est moins affaissé; deux Lampes antiques de
l'espéce des dernieres de l'article 991; trois des

variétés décrites à l'article 989. Plus un Limaçon coupé transversalement pour en faire voir la columelle & les spires intérieures. 12."

993. Onze très-jolis Limaçons de la Chine, à bouche demi-ovale, à cinq orbes un peu ren-flés, & légérement umbiliqués, dont un blanc, quatre citron, & cinq de diverses nuances de noisette & de marron, tous ornés dans le milieu du corps d'une zône ou double zône d'autres couleurs tranchantes sur le fond, se prolon-


* 1bid. pl. geant jusqu'à la clavicule, & un blanc en enarg. ph. 28. tier *. 11#18

Gualt. tab.3. 994. Idem, à de légeres différences près

dans les couleurs des zônes & du fond. 13.1.

mées la Luijante, la Livie , éces de par me 196. Sept Limaçons : sçavoir , deux très- squalt tab. 1. litt. C-Q. litt. C-Q. lbid. tab. 2. ticle 993 , dont un marron clair à large zône litt. A-F. litt. C-Q. lbid. tab. 2. Arg. pl. 24. blanche se prolongeant sur toute la spirale , & 23. f. 4 & 8. un blanc à zône étroite brune dans le milieu du premier orbe , mais ne se prolongeant pas plus loin; & cinq Limaçons-Sahots à bouche demiovale, dont deux gris-de-lin, à base & clavicule brunes , & à spirale bordée d'un lizeré de même couleur 3; & trois ornés sur tous les or- list. tab. bes de zônes alternatives blanches & rouge- Gualt. tab. brun, plus ou moins larges, tous à sept orbes litt. L. & à lévres relevées en tranchant. 36. 1.

997. Vingt-quatre Buccins; sçavoir, un rare à bouche ronde & petite, orné de zônes marron sur un fond jaune pâle, à six orbes renslés, séparés par des pas profonds, de forme effilée, approchante de celle des Vis, & à clavicule émoussée; un autre peu commun, à bouche ronde assez large, lie de vin soncé, à robe très-



* List. tab. finement réticulée, & umbiliqué *; douze pe-25. f. 23. tits couleur de chair vif, & du reste semblables

tits couleur de chair vif, & du reste semblables

* Ibid. tab. au précédent *; neuf autres de même espèce,

26. s. 24
Gualt. tab., des environs de Geneve, blanc-grisatre, dont
cinq avec leurs opercules; & une petite Unique
ou Bouche à gauche, blanche, ornée de deux
zônes canelle sur le premier orbe, & de slammes
longitudinales de même couleur sur les sui-

* Lift. tab. vans *. 130 11

998. Deux Buccins rares en pendant, à bouche presque ovale, blancs nués dans une large zône & par traits longitudinaux interrompus de sauve-roux, à lévres un peu retroussées, dont une Bouche à gauche & une Bouche à droi-

* Ibid. tab. te*. Les Hollandois ont nommé cette espèce le

Gualt. tab.s. Pavillon du Prince. 20".

999. Idem, à cette différence près que la Contre-unique est toute blanche, & l'Unique foible en couleur. 19

dens, mais un peu moins allongés, dont une Unique jonquille vif dans le bas, s'éclaircissant vers le haut, & à bande longitudinale brune

* List. tab. sur le premier orbe seulement *; & un blanc à 34. s. 33. Gualt, tab. s. zônes gris-de-lin sur le premier orbe, dont la litt. P. Arg. pl. plus élevée se prolonge sur le suivant, & de plus orné de deux bandes longitudinales brunes sur le premier & le second orbe.

1001. Trois Buccins, dont une Unique de

l'espèce de la précédente, citron vif dans le corps, s'éclaircissant vers le haut, mais dépourvue de bande brune; & deux blanc-grisâtre, de forme un peu moins renssée & à neuf orbes. 18.

ques, à robe blanc-sale nué de verdâtre, ornée dans le premier orbe de zônes jonquilles & bleues, slambée & tachetée par zônes de grisbleuâtre dans les suivans, jusqu'à la clavicule qui est rouge vis; & deux Contre-uniques à clavicule brune, fasciées dans les orbes suivans de blanc-sauve & bleuâtre, de gris-de-lin & de brun. 25.2

1003. Quatre Buccins peu communs : scavoir, deux des montagnes d'Amboine, marron bariolé de blanc, à dix orbes se recouvrant l'un l'autre, ressemblant pour la forme à une grosse Chryfalide un peu comprimée, à bouche demiovale très-étroite, armée de sept dents, & umbiliqués, espéce nommée Gueule de loup *; un grisatre flambé par bandes longitudinales de 9, lett. I marron, de forme allongée, à longues lévres 27. litt. I. retroussées en bourrelet, fléchies & sinueuses, litt. S. avant de part & d'autre une avance en forme de dent, qui rendent la bouche semblable à une oreille *; & un de même espèce, entiérement * List. tals. blanc & de forme plus raccourcie. Plus quatre 32. fig. 30. petites boëtes de Vis-Buccins, la premiere contenant une Unique de Valence en Espagne.

blanche, à bouche armée de deux dents sous la lévre extérieure, & d'une seulement sous l'intérieure; & une Contre-unique de même sor-

tient neuf petites Uniques de Geneve, blancgrisâtre, à stries sines longitudinales, & à lévre

² Ibid tab. intérieure armée de deux dents ²: la troisieme 41. f. 39.
Arg. pl. 28, en contient onze autres de forme plus effilée ³; f. 20.
Gualt. tab.4.
& la quatrieme, quatorze autres Uniques des litt. C.

mêmes lieux, de forme plus courte, ressem41. fig. altera. blante à celle des Enfans au maillot, & à bou-

Arg. pl. 28. che garnie de trois dents 4. 24.

40. fig 38.

communes pour leur grosseur: sçavoir, cinq à huit orbes médiocrement bombés, à robe ornée dans le corps de zônes alternatives plus ou moins larges blanches, gris-verdâtre, rouge & marron, & vers la rête de flammes longitudinales des mêmes couleurs, espéce nommée le

5 Séba, pl. Pavillon d'Hollande 5; & deux en pendant, 39. n°. 62-74. List. tab. 12. de même forme, cerclées dans toute leur robe n°. 7. Arg. pl. 11. de zônes inégales en largeur, blanches, pour-lett. M. pre foncé, aurore, gris-de-lin & citron pâle,

à clavicule marron foncé, & de la variété nom-

6 Ibid. pl. mée le Ruban 6. 15#19.

séba, pl. 40. 1005. Deux Rubans un peu moins grands, fig. 38. List. tab. 15. mais dont une Unique, & par cette raison trèsrare. 72. 1

1006. Deux grandes Vis-Buccins, dont une

très-

très-rare & Unique, grise, à flammes longitudinales rousses, & à robe réticulée *; & une Contre-unique blanche peu commune, à stries 39. longitudinales très-fines, & à clavicule un peu obtuse *. 49:1!

* Gualt. tab.

1007. Un carton contenant quarante-deux boëtes de Vis-Buccins de forme très - variée : scavoir, une rare blanche papyracée, à stries longitudinales très-fines, de forme un peu bombée, à clavicule aigue, à bouche demi-ovale, bordée de fauve, à lévres un peu retroussées, & umbiliquée; une qui ne différe de celle-ci qu'en ce que sa forme est plus pyramidale, & sa clavicule un peu affaissée; une blanc-grisâtre à bouche semblable à celle des précédentes, mais de forme plus effilée; une fauve, à stries longitudinales, de la forme des Enfans au maillot, & à bouche garnie d'une seule dent *; un Enfant au maillot, à stries plus fines, de 4 litt, R. forme moins renflée & plus cylindrique que le précédent; une Vis-Buccin fasciée dans tous ses orbes de brun & de marron, de forme un peu bombée, à clavicule applatie, & à lévres saillantes en vive arrête ; deux de forme plus effilée, blanches cerclées de lignes fauves, à lévre intérieure ou bas de la columelle convexe & cylindrique, strié transversalement, & laisfant derriere un umbilic *; deux fasciées comme * Ibid, litt, les précédentes, mais à bouche ovale simple, M.

Tome I.

1 List. tab. sans stries & sans umbilic 1; une jaune-pâle pa-Libid, f. 3. pyracée 2; deux blanches à bouche presque ronde, & légérement umbiliquées; deux de Valence en Espagne, dont une blanche veinée, & Ibid. f. 1. l'autre blanche fasciée de fauve 3; dix Vis d'Aranjuez de différentes grandeurs, fauve clair ou 4 Ibid. tab. grisatre, à clavicule tronquée 4; quatre petites ty f. 12. Gualt. tab. 4. du même endroit, à coque mince & transpalitt. O. P. Q. rente, à tête effilée, terminée par une clavicule cad.des Sc. an. arrondie en mammelon 5; une boëte de petites 1759, pl. 3. Vis blanches à une zône noire dans le bas 6; Vis Dianches a une 5 List. tab. une boëte d'autres de même espèce, mais tou-Mém. del'Ac. tes blanches; une de petites Vis fauves de Ge-6 List. tab: neve, ventrues, à six orbes & à bouche garnie 7 Gualt. tab. de dents 7; une d'autres de même forme, mais 4. litt. F. 8 List. tab. plus effilée & à neuf orbes 8; une d'autres encore plus petites, lisses, fauves, à six orbes. 20. fig. 16. 9 Arg. pl. 28. nommées Grain d'orge 9; une d'autres à cinq f. 15. list. tab. orbes, nommées le Grain d'avoine 10; une de très-petits Enfans au maillot; & cinq d'autres 22.f. 19. variétés, dont deuxinfiniment petites, trouvées dans les environs de Geneve. Plus, quatorze Rubans de couleurs très-variées, & une Gueule de loup. / 6 10





TROISIEME PARTIE.

ZOOPHITES.

ne connoissions point de véritables Zoophites, c'est-à-dire, d'Animaux plantes,
nous nous servirons du premier de ces
noms, consacré déja par l'usage, pour
désigner une certaine classe d'animaux
marins, qu'on ne peut regarder ni comme des Insectes, ni comme des Coquillages, ni comme des Poissons proprement dits, mais qui tiennent une espèce
de milieu, & dont plusieurs n'ont qu'un
sentiment de vie sort obscur.

Nous les rapporterons tous à deux familles, dont la premiere contiendra les Etoiles de mer, & la seconde les autres animaux mous, auxquels M. Linnæus a donné le nom de Mollusques.

Ffij

PREMIERE FAMILLE.

ETOILES DE MER.

Chent à plusieurs égards de celles des Oursins; elles sont composées extérieurement d'un cuir calleux souvent hérissé de petites éminences offeuses qui le traversent, & en dedans d'un nombre prodigieux de vertébres & autres ossellets articulés uniformément, soit ensemble, soit avec les éminences offeuses de la peau.

Leur forme, presque toujours radieuse, leur a fait donner le nom d'Etoiles de mer. Elles sont à plus ou moins de rayons, chacun desquels est formé ou de deux suites de vertebres laissant entr'elles un canal plus ou moins large, ou d'une suite de vertebres presque rondes & percées toutes dans le milieu d'un petit trou qui communique des unes aux

autres.

C'est d'après ces caracteres généraux que nous en ferons avec M. Lincke * *v.fon oudeux Sections que nous nommerons lis marinis, Genres:

Lipf. 1733. in-

1°. Les Etoiles de mer à rayons ou lobes fendus en dessous suivant leur longueur, & dont les unes ont moins de cinq rayons, les autres cinq, & les autres plus de cinq.

20. Les Etoiles de mer à rayons ou lobes entiers, qui comprennent les Etoiles vermiformes, les Chevelues & les Meduses, que l'on nomme aussi Etoiles arborescentes ou Astrophytes.



GENRE PREMIER.

ETOILES A RAYONS FENDUS.

1. DEPT variétés d'Etoiles à quatre rayons, peu communes, & nommées Cruciformes: sçavoir, une des côtes de Barbarie, à rayons de sept pouces de long chacun, à surface supérieure couverte de grains, qui vus à la loupe, font autant de petites houpes cylindriques ferrées les unes contre les autres, & bordées de quarrés-longs en relief aussi granuleux : le milieu de chaque rayon s'éleve en forme de côte, & présente ainsi une seconde étoile; ce qui fait donner à cette espèce le nom d'Etoile étoilée : sa surface inférieure est recouverte d'un amas trèsnombreux de petites pointes; une d'Amérique, de moyenne grandeur, à rayons larges dans l'origine, & s'étrécissant vers le bout, à surfaces supérieure & inférieure chargées de tubercules ou mammelons garnis de piquans coniques plus ou moins gros, & à bords des rayons formés de mammelons granuleux, plus gros que les *Linck.tab. autres, espéce nommée Falciforme *; une des

l'ont fait nommer Etoile à grains de petite vé-

Rumph. rab. Indes, de moyenne grandeur, couverte en 15. litt. D. dessus d'espéces de pustules granuleuses, qui Séba, pl. 5.

role *; une d'Amérique, à rayons étroits ar- * Linck. tab. rondis, plus longs & plus effilés que dans la 1. nº. 1. précédente, contournés, & où l'on remarque à peine la fente longitudinale, qui est bordée de petits grains ovoïdes très-nombreux: les tubercules granuleux de sa surface lui ont fait donner le nom d'Etoile à grains de millet; une petite de nos mers, à surface supérieure réticulée & de l'espéce des Coriacées *; & deux * Ibid. tab; autres variétés de Coriacée, dont une des Indes, 34. nº .55. à rayons en forme de pétales, recourbés à l'extrémité, nommée de-là Pétaloïde *; & une de * Ibid. tab. nos mers, hérissée de petites pointes coniques, & ayant un de ses rayons plus court que les autres. 7.1.

2. Une Etoile étoilée à cinq rayons de sept pouces & demi de long chacun, parfaitement conservée, & des mêmes parages que la premiere de l'article précédent : son organisation est à-peu-près la même, mais elle en différe en ce que les bords du dessus y sont armés de piquans courts qui s'élevent de chaque quarré-long: ces piquans sont un peu courbés vers la pointe du rayon auquel ils appartiennent; le tranchant du pourtour de toute l'Etoile est aussi hérissé de pointes longues couchées dans son plan, & à 4 Ibid. tab. distances égales les unes des autres, ce qui l'a s & 6. n°. 6. fait nommer Pectinée * . 5.

3. Deux grandes Etoiles étoilées à cinq feet. 1. 7. p. 748. Ffiw

Séba, pl. 7.

456

Linck. tab. l'autre; espèce nommée Soleil à treillis épi-38 & 39. no. neux; deux digitées d'Amérique, qui ne différent de l'Étoile à grains de millet de l'article premier,

28. n°. 47. Rumph. tab. 15. litt. E.

* Ibid tab. que par le nombre de leurs rayons *, qui d'ailleurs sont inégaux ; cette derniere circonstance les fait nommer Cometes digitées miliaires; une petite de nos mers, à rayons inégaux trèshérissés d'épines, nommée Comete épineuse; deux des mêmes parages, à rayons en forme de pétales, aigus à l'extrémité, hérissés en dessus de petites pointes cylindriques, & qu'on peut *Lines, tab, nommer Pétaloide veluë *; une de l'espèce de 9 & 10. n°. 19. celles-ci, mais dont les rayons retroussés en

faisceau & en forme de tulipe, laissent mieux voir la structure de la face inférieure; & un sque-

5.12°. 3.

lette d'une semblable, montrant en dessus une 4 séba, pl. espèce d'ouvrage en filigrane très - curieux *, que des fourmis auxquelles on a laissé manger le cuir & le dedans, n'ont point attaqué. 6.10.

5. Une grande Etoile des Indes, à cinq rayons pyramidaux, de forme renssée & trèsélevée en dessus, un peu concave en dessous, ornée d'un rézeau, à mailles triangulaires, sur chaque jointure desquelles s'éleve un denticule conique, & bordée dans son contour de gros mammelons armés chacun d'un denticule semblable: on nomme cette espèce gros Pâté réticulé *. 5.*

6. Un gros Pâté réticulé d'Amérique, diffé-41 & 42. 18 rent de l'espéce précédente en ce qu'il est moins no. 1. Séba, pl. 7 convexe en dessus, plat en dessous, & que les denticules du rézeau y sont plus nombreux, & disposés d'une maniere moins réguliere *. 7.12 * Tbid. pl 3.

7. Quatre Etoiles à cinq rayons; sçavoir, nº. 1. deux Pâtés réticulés des Indes, peu communs, mais un peu dégradés; un à sommet pentagone dont chaque angle est terminé par un gros tubercule; ce qui a fait donner à cette espéce le nom de Fort pentagone *; & un bordé dans son *Linck.tabæ contour & sur le milieu de chaque rayon, de 26. nº. 41. gros tubercules lenticulaires, à robe semée de tubercules semblables, mais moins grands & très-serrés dans la partie insérieure *; les rayons * Séba, pl. de ces deux espéces d'Etoiles se terminent en 6. nº. 1. pointes émoussées; un Pâté réticulé d'Amérique, de l'espéce de celui de l'article cinquieme, mais moins grand, & à sommet plus ensoncé; & une Etoile des Indes, à rayons pyramidaux trian-

gulaires, bordés tant dans leur milieu que dans leur contour, de piquans affez longs, qui peuvent faire nommer cette espéce Pyramidale pectinée. 6.

8. Seize Etoiles à cinq rayons : sçavoir, une

pentagone peu commune, bordée en dessus & en dessous de gros tubercules, & ornée en dessus seulement de cinq compartimens de petits tua bercules cylindriques, espéce nommée petit *Linck. pl. Pâté *; un Pâté réticulé de moyenne grandeur, 23, n° 37.
Séba, pl. 6. à fommet circulaire enfoncé, & à denticules très-nombreux; trois petites réticulées lentigineuses, de forme un peu applatie, à sommet * Ibid. pl. 5. aussi enfoncé *; deux Digitées à grains de petite vérole, qui ne différent de celles de même nom de l'article premier, que par le rayon qu'elles *Linck.tab. ont de plus *; une Comete digitée miliaire des Indes; cinq Etoiles coriacées de nos mers, dont * Ibid. tab. trois réticulées *; une hérissée de petites pointes * Ibid. tab. coniques *, ayant un de ses rayons plus court que les autres; & une platte à rayons émoussés, & à cavité dans le milieu de sa partie su-* Ibid. tab. périeure *; une petite peu commune, convexe en dessus, concave en dessous, & dont la surface paroît comme chagrinée : elle est ornée à

dont les angles faillans répondent aux angles

nº. 5 & 6.

8. m°. 10.

4. n°. 5. 35.nº.59.

34. n°. 57. son sommet d'une petite Etoile à cinq rayons,

* Ibid. tab. rentrans de la grande *; une à-peu-près sem-* Séba, pl. blable de l'Isse de Sainte-Helene *; & une

S. n°. 3.

qui n'en différe que par sa forme applatie. 8"

9. Treize autres : sçavoir , une Etoilée rare , aussi mince que le carton le plus fin, dont les rayons grêles font comme engagés dans une membrane granuleuse, qui lui a fait donner le nom d'Etoile en patte d'oye *; deux petites à * Linck tale. grains de petite vérole, dont une digitée ou à Aldrov. 1.7. rayons arrondis, & l'autre à rayons applatis & deinf. cap. 134. triangulaires; une peu commune, à corps plus petit & plus élevé, à rayons plus étroits & moins plats que la précédente, & à robe semée de tubercules à-peu-près sphériques; trois de moyenne grandeur de la Méditerranée, étoi= lées & pectinées*, dont une à sommet élevé en *Linck.tab. demi-sphere, & à verrue élevée *; une à cinq *Lochner rabosses aux origines des arrêtes longitudinales lerian. p. 76. formant la feconde étoile, & à dents de peigne tab. 22. relevées toutes en en-haut, & la troisieme à sommet & verrue groupés ensemble en bosse irréguliere; une petite de Curação, à dessus plat & granuleux, dans le milieu duquel on observe une petite cavité forée au centre, & à bords canelés transversalement *; deux Digitées réticu- * Linck, tab. lées de la Méditerranée, à rayons longs, partant 4.10.14. d'un tronc affez petit *; deux Pâtes révicules , * Ibid. tab. comme le second de l'article précédent, & un 9 & 10, nº, 16, squelette d'Etoile de l'espéce de celui par où finit l'article quatre. 7" 15? 10. Huit Etoiles à cinq rayons : sçavoir, une

36. nº. 61.

Digitée miliaire de l'Isle de France; deux Coriacées affez grandes, dont une réticulée des mers de Hollande, & l'autre des mers d'Irlande, à rayons plats & rabotteux, chargés en dessus d'une côte longitudinale bien prononcée, & *Linck. tab. nommée la Jaune vulgaire de Luid *; deux Patés réticulés de moyenne grandeur, dont un à fommet enfoncé, & l'autre à tronc & lobes applatis; deux Soleils, dont un à pointes & treillis de moyenne grandeur, à disque du mil'eu un peu enfoncé, & lobes plus larges à proportion que dans celui de l'article quatre; un à * Ibid. tab. rayons applatis, nommé le Soleil plat coriacé * * Ibid. tab. & une pectinée de moyenne grandeur *. 6.1.

6. nº. 13.

11. Une grande Etoile pentagone de l'Isle de France, qui est une variété rare de l'espéce des Pâtés, que nous n'avons trouvé dessinée dans aucun Auteur : elle forme un pentagone régulier de sept pouces de longueur sur un pouce d'épaisseur, chargé en dessus de petits denticules coniques clair semés sur une espéce de rézeau, & en dessous d'un compartiment régulier de petits tubercules oblongs, disposés par groupes de cinq à six ensemble, & parallelement aux deux rainures entre lesquelles ils se trouvent, imitant par-là un ouvrage en mosaïque des plus élégans : les bords en sont très - finement granulés, & coupés dans toute leur largeur par les cinq rainures. Plus, un Carton contenant dixhuit petites boëtes d'osselets, vertebres, denticules, &c. provenant d'une Etoile de cette

espèce. 7.1.

d'un pied de long, à quatre grands rayons triangulaires simples, & un cinquieme formant vers son milieu une fourche, & se divisant ainsi en deux plus petits, à la maniere d'un des rayons du Soleil représenté dans la pl. 40, n°. 70 de Lincke: cette espèce peu commune est du genre des Pedinées, & ne dissére de celle de l'article second de notre Catalogue, que par la bisurcation d'un de ses rayons: elle peut se rapporter à celle dont parle Séba*. 12.

13. Une autre de même espéce, un peu moins grande, & semblable, à cela près que la sourche du rayon double, ne commence qu'à une plus grande distance du centre, que l'angle de cette sourche est plus aigu, & les bran-

ches qu'elle forme, plus petites. 10".

14. Deux Etoiles peu communes : sçavoir, un gros Pâté réticulé à six rayons, dont un plus petit, & moins écarté de ses voisins que les autres, & paroissant naître du dessous en forme de petite queue : il est néanmoins garni de sa rainure longitudinale, partant du centre comme celle des autres; & une Etoile en patte d'oye, qui ne dissére de celle de l'article 9, qu'en ce qu'elle est à six rayons, engagés dans

* Séba, Pla

462

une membrane encore plus mince, formant un hexagone sinueux. 12"1.

15. Une Etoile rare de l'Isle de France, de forme hexagone réguliere, & qui ne différe de celle de l'article 11, que par le lobe qu'elle a

de plus. 37.1.

16. Trois Étoiles: sçavoir, une Digitée miliaire à six rayons d'inégale grandeur, dont un très-court; une grande Coriacée à sept rayons triangulaires applatis & épineux: c'est le Soleil

* Aldrov. de digité d'Aldrovande *; & une Coriacée à large infect. I. 7. p. corps circulaire réticulé & hérissé de piquans Linek. tab. 34. mousses, d'où partent douze rayons semblables & courts en dessus, mais plus longs, & nais-

sans d'un cercle plus étroit en dessous, espéce nommée Tournesol à douze rayons * 15.15

* Ibid. tab. nommée Tournefol à douze rayons *. 15. 15. 15. 15. 15. 17. 16em, à cette différence près que l'Etoile n°. 5. Aldrov. ibid. à sept rayons est encore plus grande, & à bords pectinés. 24. 2.

18. Un rare & beau Tournesol de sept pouces de diametre, à trente-sept rayons en forme de doigts serrés les uns contre les autres jusqu'à quinze lignes ou environ de distance de la circonférence, à corps rond & élevé, hérissé de petites houpes cylindriques blanchâtres, qui se partagent en trois rangs longitudinaux sur chacun des rayons: cette Etoile qui est de la plus parsaite conservation, vient du beau Cabinet de seue Madame de Boisjourdain, qui l'a fait mon-

rer sous une cloche de crystal, dont le pied est en cuivre, & le sond garni d'une glace, au moyen de laquelle on voit très - distinctement la surface insérieure de ce curieux morceau. 100.

19. Deux autres Tournesols, dont un à treize rayons en forme de doigts velus & assezlongs*, *Linck. tab. & un qui ne différe du précédent, qu'en ce qu'il est à trente-huit rayons, & un peu dégradé. 4".3'



GENRE SECOND.

ETOILES A RAYONS ENTIERS.

20. UINZE Etoiles vermiformes à cinq rayons: sçavoir, quatre à queue de lezard, ainsi nommées de la ressemblance de leurs rayons à la queue de cet animal : ces rayons arrondis en desfus, plats en dessous, sont composés de vertebres articulées ensemble comme par nœuds, & fortent d'un corps lenticulaire applati, trèsremarquable en ce qu'il est chargé d'espéces de petites écailles, dont celles qui se trouvent placées deux à deux à la naissance de chaque rayon, imitent parfaitement les aîles d'une mouche qui * Linck, tab. auroit la tête tournée vers le centre de l'étoile *: 2. n°. 4. Mém. des l'Ac. une qui différe des précédentes en ce que le n-12. p. 132. corps en est pentagone, que les rayons en sont ronds, & que les cinq fentes de la bouche pa-*Linck. tab. roissent à peine *; une de même espéce, bariolée par zônes, mais mutilée d'un de ses rayons; quatre de l'Isle de France, noirâtres, à corps rond granuleux, d'où partent des rayons écailleux comme ceux des précédentes. mais différens en ce qu'ils sont chargés de quatre rangées longitudinales de pointes longues plus

22. nº. 35.

ou

ou moins fines: espéce nommée Scolopendroïde granuleuse * ; quatre de l'Amérique, qui ne dif- *Linck. tab. férent des précédentes qu'en ce que le tronc en est pentagone, & plus petit à proportion *; & * Ibid. tab. une autre Scolopendroide rare, à rayons chargés de piquans blancs, fins, transparens & granuleux, forés dans toute leur longueur *. 12 * 1bid. tab.

21. Trois Etoiles chevelues: scavoir, deux 34. nº. 56. petites à dix rayons, naissans deux à deux de cinq tiges courtes, composés en dessus de piéces en forme d'anneaux, articulées ensemble, alternativement larges d'un côté, & étroites de l'autre, creusés en dessous en forme de gouttiere, & bordés de chaque côté de filets ou petites pattes alternes aussi articulées : les cinq tiges principales fortent d'un petit tronc pointillé, arrondi en dessus en forme de demi-sphere, plat en dessous, & ne montrant aucun vestige de bouche : espéce nommée par Luid Décempede de Cornouaille, & par Linck Rosacée *; & une grande de dix-sept rayons organisés comme 37. nº. 66. ceux des précédentes, l'un desquels manque: les seize restans naissent de cinq tiges fort courtes, qui sortent elles - mêmes d'un petit tronc cylindrique, foré dans son milieu, du haut duquel partent en forme de verticille, d'autres rayons courts & déliés, posés dans un plan parallele aux grands: chacune des cinq tiges principales se divise d'abord en deux : de celles-

Gg Tome I.

ci, sept se subdivisent en autant de rayons, & trois restent simples, ce qui donne le nombre des dix-sept rayons que nous avons dit devoir se trouver dans cette Étoile : cette espéce, qui a beaucoup de ressemblance avec celle que *Linck. tab. Lincke nomme Tête de Méduse brune *, & la * Séba, pl. Lune-marine de Séba *, pourroit bien n'être,

ainsi que la premiere de cet article, vu le défaut de bouche qu'on y remarque, que l'extrémité d'une tige d'Etoile arborescente, différente cependant de celles qui sont connues sous le nom de Méduses, ainsi que l'a conjecturé M. Guettard, en parlant du Palmier marin. 18.

22. Un rayon d'Etoile arborescente connu fous le nom de Palmier marin, portant environ dix-sept pouces de haut, & renfermé dans une case de verre. Ce morceau unique dans son espéce, est extrêmement précieux par le jour qu'il a répandu sur l'origine des Astéries, des Encrinites & des Entroques : il nous vient aussi du Cabinet de feue Madame de Boisjourdain, qui l'avoit reçu de la Martinique où il avoit été porté par un Officier qui venoit des Indes, & qui ignoroit dans quelles mers cet animal avoit été pêché : quoi qu'il en soit, on peut dire qu'il fait époque dans l'Histoire Naturelle, depuis le sçavant & curieux Mémoire que M. Guettard a donné à son sujet. Nous sentant incapables de rien ajouter à l'exacte description qu'en a donnée


cet habile Naturaliste, nous y renvoyons nos lecteurs *. 900".

23. Une très-belle Tête de Méduse de la Nou-l'Ac.R. des Sc. velle-Espagne, & parfaitement conservée, dont 224. & suiv. le corps a près de deux pouces de diametre : pl. 8: 9, & 19 l'origine de chacun des cinq gros rayons est chargée en dessus de cinq grosses côtes longitudinales épineuses, & marquée en dessous de trois rangées de points : l'extrémité de ces cinq rayons ou troncs est percée latéralement de deux trous, à l'endroit où se fait la premiere division en deux groffes branches, qui se subdivisent bientôt après elles-mêmes en deux autres, & ainsi de suite, jusqu'à un nombre prodigieux de ramifications toutes semblables, dont les dernieres font recourbées en forme de cheveux frisés, & donneroient à l'Etoile entiere, si elles étoient développées, une extension de près d'un pied & demi : on nomme cette espéce Astrophite ou Méduse à côtes *. 46.

24. Une autre Méduse portée sur un pied de 29 30.31. bois des Indes, & renfermée sous une cloche 16. litt. A. B. de verre: elle différe de la précédente en ce no, 1. que son corps a près de trois pouces de diametre, & se termine en une espéce d'écusson d'un pourtour très-gracieux, qui a fait donner à cette espèce le nom de Méduse à écusson *: *Linck. tab. les branches & les ramifications de celles-ci se 48 & 49. recourbent en dessous, imitant une rose de Jé-no. 1.

* Linck, tab? 18 & 19. nº.

Gg ij



richo, ou un sphéroïde applati de près de huit pouces de diametre sur quatre pouces & demi de haut: ces branches sont armées en dessous de deux rangées longitudinales de petites stries transversales, formées chacune de quatre petits tubercules aigus, & assez ressemblantes à des pattes de chenille. 28



SECONDE FAMILLE.

MOLLUSQUES.

25. VINGT-UN Mollusques desséchés : sçavoir, deux Polypes de la mer des Indes, l'un mâle, l'autre fémelle, une Séche, un Calemar de la grande espèce, une Holoturie ou Verge marine, deux Concombres marins, cinq Orties de mer, fix Plumes marines ou Verges ailées, dont trois variétés; une quatrieme variété de Plume - marine semblable à une large feuille de roseau, espéce que Séba dit être fort rare*, & *Séba, tom. deux Mains de mer. 7.12!

26. Vingt-cinq autres Mollusques dans l'esprit-de-vin: sçavoir, dix Calemars de la petite espéce, une Velette de la Méditerranée, deux Anemones de mer, quatre Chenilles ou Taupes marines, dont une des parages de Hollande, remarquable par ses poils en forme de pinceaux jouant l'opale *, & trois de la Méditerranée, * tbid.pl. 40 l'une desquelles adhére à une Scolopendre ou Pinceau de mer, & à des Corallines; une Pomme-folle de mer ; une Ortie de mer , des Concombres & des Raisins de mer ; une Holoturie, deux Seches, & trois Poumons marins. 47.1.

Gg iij



QUATRIEME PARTIE.

CRUSTACÉES.

CE font des animaux couverts d'une croûte assez dure, mais molle en comparaison des coquilles ou écailles pierreuses des Testacées. On les divise ordinairement en trois genres, dont le premier comprend ceux qui ont le corps allongé, tels que les Ecrevisses, les Langoustes, & c. Le second renferme ceux dont le corps est large & évasé, tels que les Crabes; & le troisieme les Crustacées à corps arrondi, ou les Cancres.



GENRE PREMIER.

CRUSTACÉES A CORPS ALLONGÉ.

I. NE Langouste de la mer des Indes I, IRumphi. desséchée & parfaitement conservée. 16". 19.

2. Une grande Squille des Indes, nommée par Rumphius Squille large ou Cancre - ours 2, 2 Ibid. tab; & une très-groffe Langouste de nos mers.

3. Huit Crustacées : sçavoir, une Ecrévisse de mer d'Amérique 3, une de Norwege 4, une 3 séba, toma Squille sabloneuse de nos mers, de l'espèce ap- 4 Ibid. pl. pellée Mante 5; l'Ecrevisse nommée Lion de 21. n°. 3. pls. mer par Rondelet 6; un petit Cancre-ours, & 20. no. 2. une Chevrette de nos mers 7; une Chevrette du 19. no. 19 & détroit de Davis 8, & une Langouste des Indes, 7 1bid. pl. moins grande, mais du reste semblable à celle 21. n°. 8. 1bid, n°. de l'article premier. 7."

4. Les mêmes Crustacées de l'article précédent, à l'exception du second & du dernier. qui sont remplacés par une petite Ecrevisse de mer d'Amérique; & une grosse Ecrevisse d'eau douce. (8.



GENRE SECOND.

CRUSTACÉES A CORPS LARGE ET ÉVASÉ.

5. N rare & beau Crabe d'Amérique, verdâtre: ses pieds, ses deux longs bras, & le contour de sa coque sont hérissés de pointes, mais ses pinces sont lisses, & au lieu de se terminer en pointe comme dans les autres espèces, leur extrémité est arrondie, un peu concave & dentelée: la partie supérieure de sa coque est couverte de petits mammelons fort serrés, la plûpart peu élevés. 19.1.

6. Deux Crabes rares, l'un de la côte Coromandel, ayant sur le dos une croix très-bien faite, avec deux personnages de chaque côté. Ces Crabes font rares même dans le pays : on

* China il- peut voir dans le Pere Kirker *, l'origine merlustrata. p 35 veilleuse qu'il attribue à la croix dont ils sont décorés: l'autre est d'Amérique, à larges taches rouges, & de l'espéce de celui qui est repré-

* séba, tom. senté dans Séba *. 27.

3. pl. 19. 11º. 7. Quatre aurres Crabes: sçavoir, deux Saxatiles d'Amérique, dont un rouge tacheté de * Ibid. pr. jaune pâle, à bras gros & courts *; l'autre à 22. nº. 4. coque bordée vers la tête de piquans applatis en

CRUSTACEES

forme de petites feuilles dentelées, à jambes velues, & à bras épineux; & deux de nos mers, dont un à pinces en crête de coq, nommé delà Coq de mer 1; & un Poupart, dont le dos est 1866a, tom. chargé d'une touffe de Coralline, de l'espéce 3. pl. 20. n°. nommée Queue d'écureuil, & de quelques Rumph. tab. Glands de mer. 5.1.

8. Sept Crabes: sçavoir, un des Indes, peu commun, hérissé d'épines & de tubercules qui le rendent fort hideux 2; le Sillonné de Rum- 2 Ibid. 1ab. 9. phius 3; deux Crabes velus 4; l'un mâle, l'autre 3 Ibid. tab. 6. femelle; le premier est presque totalement re- litt. O. couvert par un alcyon de substance songueuse 11. ng. 1.

& coriacée; deux Coqs de mer, l'un mâle, l'autre femelle; & un d'Amérique, de l'espéce du second de l'article précédent, remarquable par une cicatrice qu'il a sur le dos, & par une pince naissante qui remplace celle qui lui a été enlevée par quelque accident. 6:3.

9. Vingt-deux petits Crabes, formant quatorze variétés, entr'autres un Crabe de la Chine, à rides granuleuses, très-rare. Plus, la derniere articulation d'une des jambes postérieures d'un Crabe de Sicile, garnie de son ongle, & re couverte de longs poils soyeux couleur d'or 5. 3. pl. 18. nº. 16.1.

5 Séba, tom.



GENRE TROISIEME.

CRUSTACÉES A CORPS ARRONDI

*Rumph. 10. Nancre des Moluques * parfaitement.
A. B. conservé dans une boëte vitrée. 24".

* Séba, pl. de la Méditerranée *, couronné d'un groupe confidérable de Glands de mer. 12.1.

deur & petits: sçavoir, quatre variétés de Cancres squinades, dont un à longs bras; une Araicres squinades, dont un à longs bras; une Araicres squinades, dont un à longs bras; une Araicres squinades, à touche pointue *;

* Ibid. pl. une à coque triangulaire *, & trois à coque gra* Ibid. pl. nuleuse *; deux variétés de Cancres velus; sept

19. n°. 10 & autres petits Cancres, un pou de mer, & un

Bernard l'hermite dans un burgau. 20.10.





CINQUIEME PARTIE.

POISSONS.

I. On Chien de mer de cinq pieds de longueur, & un gros Poisson armé ou Porc-épic de mer desséchés & bourrés. 14.1.

I & 20

2. Deux Porc-épics de mer : le corps de l'un est rond comme un ballon, celui de l'autre est de forme ovoide. ".3.

3. Trois gros Poissons desséchés : sçavoir, un Diable de mer *; l'Orbis à tête de liévre de * Jonst. tab: Grew *, & un Porc-épic de mer. 12.

4. Trois Poissons desséchés, l'un peu commun, est la petite Licorne de mer du Bréfil *; les deux * Ibid. p. 104 autres sont deux variétés de Porc-marin, dont tab. 73 une de la Méditerranée *, & l'autre des Antilles, à grandes taches blanches fous le ventre. Hist. aquatil.

5. Vingt-deux autres Poissons desséchés: sça-Grew. Mus. 7. voir, cinq variétés de Poissons-coffre, dont trois triangulaires & deux quadrangulaires; deux petits Poissons - armés, l'un quadrangulaire, l'autre sphérique; la Pastenaque nom-

*Grew. Mus. p. 108. tab. 7.

mée l'Aigle; deux Rémores ou Sucets; une Hirondelle de mer; deux variétés de Trompette; un Hippocampe ou petit Cheval marin; un Serpent marin, un Humantin, un Rouget, un Malarmat, un Baliste Scolopax, un Rana Piscatrix. Plus, une petite Raye, ajustée en forme de Basilic. 4* 8'

6. Quarante - quatre petits Poissons, les uns desséchés, les autres dans l'esprit-de-vin, tels que Poissons dorés de la Chine, Rémores, Scorpions-marins, Poissons-volans, plusieurs variétés de Balistes, &c. Plus, un Basilic factice.

7. Une Défense de Narwal, de près de sept pieds de longueur. 54".

8. Un Membre de Baleine, de fix pieds de longueur. 14.5.

9 Une très-belle Défense de Poisson-scie, de quatre pieds quatre pouces de longueur, & une Vertébre de Baleine. 3". 6.

10. Une Gueule de Lamie ou grand Chien de mer; une Tête de Dauphin, & deux Défenses, l'une de Scie, l'autre d'Espadon.

celles de la Zygéne ou Marteau, celles du Requin, du Loup - marin, du Dauphin, de la Bécune, de l'Espadon avec sa Désense, & une Désense du Poisson Scie. 6."."

12. Sept parties ofseuses de différens Poissons: sçavoir, une prétendue Main de Syrene, jui n'est autre chose qu'une nageoire de Baleine; un os de la tête de la Baleine, nommé l'Os de l'ouie; le Membre d'une Vache-marine: il est de nature osseuse, & long de dix-neus pouces. Bartholin en fait grand cas pour certaines maladies, étant pris en poudre*; la Queue de * Barthol. Hist. ana. Cenquelque long Poisson plat, qui paroit être du tur. II. genre des Murênes, ayant trois pieds & demi de longueur; une Vertébre de Baleine, une Tête de Dauphin, & une Machoire de Requin. 8.

13. Trente autres parties détachées de différens poissons: sçavoir, des Machoires de Raye, de jeunes Requins, de Dauphins, &c. des Dents de Cachalot, les Vertébres d'un autre poisson, des Ovaires de Rayes, des Fanons de Baleine, un lambeau de la peau de la grande Aiguille de mer, & divers Os de poissons, entr'autres un peu commun, que l'on croyoit autrefois provenir de la Rémore*. 5.19

*Muf.Worm.

14. Le Palais d'une espèce de Raye de la p. 270. Chine, composé d'osselets de diverses formes, les uns épineux, les autres granuleux, & contourné de maniere à représenter deux espèces de Buccins: ce morceau est rare & curieux. 19.





SIXIEME PARTIE.

AMPHIBIES.

1. Un grand Serpent d'Amérique, à écailles larges, variées de blanc, de brun, & de noir il est, ainsi que tous les suivans, dans l'esprit-

* Séba, tom. de-vin *. 12" 2. pl. 75. n°.

2. Deux Serpents-javelots des Indes, à corps grêle d'environ trois pieds de longueur: on les nomme dans le pays Cobra verde, à cause de leur belle couleur verte plus soncée sur le dos que sous le ventre: ces deux nuances sont séparées dans l'un par deux raies longitudinales blanches qui régnent depuis la tête jusqu'à environ six pouces de l'extrémité de la queue: l'autre à quelques raies semblables sous le ventre. 4

3. Deux Serpens, dont un des Indes, verd taché de noir, à deux raies blanches sous le ventre, & un de Surinam, cerclé de bandes noires & grises d'inégale grandeur. 3.17.

4. Deux autres Serpens, dont un cerclé de

AMPHIBIES!

larges bandes noires & blanches, nommé Serpent d'Esculape *; & un de l'espèce du premier * Séba, tom; 2. pl. 18. D2. 44 de l'article précédent. 3. 18!

5. Cinq Serpens, dont un femelle du Cap-Verd, un d'Amérique, un de Madagascar, un du Japon, & un du pays. vender aveclat. fuiv!

6. Six autres: sçavoir, deux des Indes, deux d'Amérique, dont un bleuâtre, orné sur le dos d'une suite de taches noires disposées par ondes ; & de deux suites latérales de taches plus petites, l'autre est cerclé de bandes noires & grises; un orné de bandes longitudinales de diverses couleurs, & un Serpent aveugle de notre pays. 6.

7. Deux Amphisbenes ou Doubles-Marcheurs; dont un de Ceylan, couvert de petites écailles rousses, & à queue presque d'égale grosseur avec la tête, & l'autre d'Amérique, orné sur le dos d'une large bande onduleuse noire, marbré sur les côtés de noir & de bleuâtre. Son corps est presque d'une égale grosseur jusqu'à un pouce de distance de la queue qui finit en pointe obtule. vendu avec l'article fuivant.

8. Quatre Serpens d'Amérique, dont un Caz cilia dépourvu d'écailles, & à petits anneaux marquetés de brun & de blanc *; un ceint de bandes alternatives, dont les unes sont entiére-12. no. 3. rement noires, tandis que les autres sont bleuâtres sur le dos, jaunâtres sous le ventre: il est

tare & remarquable en ce que sa queue est applatie; & deux à queue pointue, ceints d'anneaux blancs & rougeâtres. Plus, une queue de Serpent-sonnette, & deux petits Orverts de notre pays. 5.19.

9. Deux Viperes en pendant, l'une mâle,

Aldrov. de l'autre femelle 1, 3, 9, ferp. lib. 1. p.

10. Un Serpent à deux têtes, très-rare. Ce 115 80 116. monstre dissére de ceux qui sont représentés

2 lbid. p. 60. dans Aldrovande 2, Jonston 3 & Valentin 4. De serpen-ib. tab. 1. en ce que les deux têtes en sont contigues à tib. tab. 1. 4 Mus. mu-leur origine, & naissent ensemble du même fæor. tab. 33. trone, fans former une bifurcation, comme celles dont parlent ces Auteurs. Il peut être comparé à celui dont on trouve la figure dans l'Histoire Naturelle des Oiseaux de Georges

5 4c. Partie, Edwards 5. 4", 4.

pl. 207.

11. Un Lézard volant d'Afrique, parfaite ment conservé dans l'esprit-de-vin : ses aîles couvertes ainsi que le corps, de petites écailles marbrées de taches brunes, noires & blanches, font dans la position où il les met pour voler: il a sous le cou une poche cartilagineuse de médiocre grandeur. On le nomme aussi Dragon 6 Séba, tom. ailé 6. 15.41.

2. pl. 86. inº. 12. Un Lézard volant d'une autre espèce, Valent. Hist. desséché. Celui-ci est d'Amérique, & ales aîles lib. 3. cap. 38. moins grandes que le précédent, mais sa poche est plus longue : ses aîles sont de couleur grise,

dépourvues

² Mém. de

dépourvues d'écailles, & membraneuses comme les nageoires des poissons . Plus, deux séba, tom. Scincs d'Afrique, aussi desséchés. 7.1.

13. Un Crocodile de Siam, d'environ cinq Planches en luminées de M. pieds de longueur, bourré: il est de l'espèce de d'Aubenton, pl. 46.

14. Un autre de même espéce, un peu moins l'Acad. des Sc. tom. 3. part. 2. pl. 64.

un Caméléon de la côte Coromandel: tous 1. pl. 104, nº deux dans l'esprit-de-vin, ainsi que les suivans.

16. Un jeune Crocodile d'Amérique, & un Lézard des Indes, à dos épineux, nommé dans Séba Galéotes 4. Plus, un œuf de Crocodile, 4 Ibid. pl. & un Scinc desséché. 6."

23. n°.

17. Une Salamandre aquatique, différente de celle de Séba 5, en ce que sa queue est moins longue, & que les espéces d'aîlerons qu'on y 2. pl. 103. n° ventre & des cuisses; un jeune Crocodile, de l'espéce de celui de l'article quinzieme, & deux Scincs. 6.5.

18. Deux Lézards d'une grande beauté, l'un de S. Domingue 6, & l'autre d'Amboine 7, pa- 6 Ibid, toms reils à ceux que nous citons.

Reptiles suivans: sçavoir, une Salamandre terrestre; une Salamandre à queue courte; une dépouille de Salamandre, un Lézard Galéotes,

Tome I.

Hh

I. pl. 97. f. 3.

nº. 1.

n°. 9.

lb. tom. 2.

*séba, tom. 1. deux petits Caméléons *; un Lézard à queue rl.82.n°.4.5: écailleuse hérissée de pointes *: deux à queue platte; deux à queue semblable, avec une crête dentelée le long du dos; & dix petits Lézards d'Amérique & de notre pays, de couleurs & marbrures fort variées. Plus, une Grenouille

*Ibid. tom.2. de buisson, d'Afrique *. 9. pl. 37. nº. 3.

Trois grands Lézards bourrés: sçavoir, un Iguana d'Amérique, de l'espéce nommée Sé-* Ibid. tom. nembi *; le Lézard Téjuguacu, dont le corps est parsemé de taches en forme d'yeux *; & une pl. 105. nº. 1. autre variété de Tejuguacu, nommée Tecui-

* 1b. tom. 1. xim *. Plus, une belle & très-groffe Grenouille pl. 96. nº. 3. de Virginie, remarquable par une large bande *Ibid.pl.75. longitudinale für le milieu du dos *. 6. ...

21. Une Tortue de mer, connue en Amérique sous le nom de Carret, ouverte & desséchée, adhérente à son écaille, dont les piéces *Ibid.pl.80. font en recouvrement les unes sur les autres *:

elle a vingt-deux pouces de long de l'extrémité de la tête à celle de la queue. Plus, une Carapace de Tortue de terre d'un brun obscur, &

* Mém. de de feize pouces de longueur *. 4." 1'Ac. tom. 3.

22. Deux Tortues de mer complettes, l'une part. 2. pl.58. de l'espéce du Carret, l'autre nommée Caouanne: elles ont environ un pied de longueur. Plus, le squelette de la tête d'une grosse Tortue; & un bocal contenant quatre petites Tortues de mer, des Indes, dans l'esprit-de-vin : celles-ci font en dessus d'un brun très - obscur, à l'exception du cou & des bords qui sont ceints d'une petite bande jaune *. 8"1.

23. Cinq Carapaces de Tortue: sçavoir, une r.pl.79. n°.5. de Tortue de terre du Brésil, formée de larges écailles rhomboidales dont le centre est pointillé*; une de même espèce, mais moins gran- *1bid.pl.80. de; une autre variété, dont le contour est orné n°. 2. de triangles alternatifs noirs & blancs *; & deux * Grew. mus. de Tortue de mer, l'une de Carret, l'autre de reg. soc. tab.3. Caouanne. 6. 10.

24. Six autres Carapaces de Tortue de terre; sçavoir, une à écailles héxagones brunes relevées en bosse, du centre de chacune desquelles partent neuf à dix bandes jaunes en forme de rayons *; une à-peu-près semblable, mais à *séba, tom. écailles moins convexes; une à écailles brunes pointillées de traits jaunes; & trois de l'espèce des premieres de l'article précédent, dont une avec une Tortue artificielle. 3.

25. Quatre petites Tortues, dont trois des Indes, de l'espèce des dernieres de l'article vingt-deux; une Tortue de terre de nos climats, à écailles brunes pointillées de jaune. Plus, quatre petites Carapaces de desseins variés & fort jolis *. 4.16.

*Ibid.nº.4,





SEPTIEME PARTIE.

INSECTES.

* séba, tom.

1. N grand Scorpion des Indes *; & un

1. pl. 70. n°. 4.

* Ib. tom. 2.

Pl. 25. n°. 3.

2. Quatre variétés de Millepieds dans l'esprit
de-vin, & un Scorpion desséché, moins grand

que le précédent. Plus, une Scolopendre de

* Ib. tom. 1. mer sur une branche de Sargazzo *. 7. 12.

pl. 81. 11°. 7.

Deux très-grosses Araignées dans l'esprit-

de-vin, dont une de Ceylan, ayant sur le dos
*Ib.pl. 69. comme un bouclier *: l'autre est une Tarentule
d'Italie. Plus, six petites boëtes vitrées, contenant autant de variétés d'Araignées, dont une

* 16. tom. 2. très-groffe d'Amérique *; & un nid d'Araignée pl. 41. lett. C. très-fingulier en ce qu'il est pratiqué dans un morceau de terre, & que son couvercle asserépais, ferme par une espéce de ressort: il a été trouvé dans les avenues d'Aranjuez. 15.*

4. Dix petits Bocaux contenant divers insectes dans l'esprit-de-vin: sçavoir, deux de Vers palmistes, cinq de Chenilles, un de Cloportes, un de Chenilles à tiges, un de Chrysalides, & une Courtilliere ou Taupe-grillon. 3.13

5. Dix-huit petites Boëtes vitrées: sçavoir, trois de Millepieds, une de Cloportes, trois de Punaises terrestres & aquatiques, cinq de Teignes aquatiques, avec leurs étuis formés, les uns de grains de sable, les autres de petits brins de bois, de fragmens de Coquilles, de planorbes, &c. deux de Fourmis, les unes aîlees de Cayenne, les autres sans aîles; une de rouleaux de seuilles de Rosier, formés en terre par une Mouche à scie; une de petites coques faites par des Vers mangeurs de Chenille; une Blatte, un Kakerlac, & une Chrysalide. Plus, deux Cocons de Chenilles des Indes, dont un tissu de fils couleur d'or, & l'autre composé d'un grand nombre de cellules. 10.3.

6. Vingt autres Boëtes semblables, contenant autant de variétés de Mouches, les unes à deux aîles, les autres à quatre aîles, telles qu'Abeilles, Guêpes, Frêlons, Ichneumons, Cousins, Ephémeres, &c. Plus, un Guêpier de Cayenne, &

deux Gâteaux de Frêlons. 12.

7. Quinze autres Boëtes: sçavoir, douze de Demoiselles, très-variées, dont trois d'Espagne & les autres de France; & trois de Cigales de dissérentes grosseurs. 19"."

8. Deux Mantes peu communes, l'une est la M. d'Auben-Fraize de S. Domingue 2: l'autre est nommée f. 2. Roefel. Locust. tab. 7.

9. Deux autres Mantes des Indes, dont une 19. f. 3. Ibid. tab.

Hh iij

enluminées de

486

très-singuliere, en ce qu'elle a six aîles, dont les extérieures sont de même nature que les interieures, & ne peuvent servir de sourreaux à celles-ci, comme dans les autres Sauterelles

* Séba, tom. aîlées *. 6.1.

*Roesel Lo-rare *, & trois Sauterelles aîlées des Indes, cust. tab. 17. dont deux variétés. 17.

voir, neuf de Sauterelles, formant autant de variétés, deux de Courtillieres, une de Tipules, une de Scorpions aquatiques; une de Punaises aîlées, & huit de Galles de chêne, d'orme, de hêtre, de genêt, d'églantier, &c., g

12. Trois beaux Scarabées: sçavoir, le Taureau volant, le Rhinoceros de Cayenne, & un Cerf-volant. 25.1!

13. Huit Scarabées étrangers, peu communs:

* Pl. enlum. sçavoir, un grand Arlequin de Cayenne *, un de M. d'Au-benton, pl.64. Bupreste doré, deux autres Buprestes en pendant, deux variétés de Capricornes, un Rhinoceros, & un Cerf-volant femelle. 47. "C"

14. Huit autres Scarabées: sçavoir, un Arlequin de Cayenne, de moyenne grandeur; quatre Buprestes des Indes, dont un entiérement doré, un qui est, de plus, remarquable par deux taches couleur de paille, presque rondes sur le milieu de chaque élitre; & deux à élitres

rouges & corselet doré; deux variétés de Capricornes, & deux de Rhinoceros. 36.10/

15. Quatorze petites Boëtes vitrées, contenant quatre variétés de Scarabées porcs ou à trompe, entr'autres le Scarabée palmiste de Mademoiselle Mérian *; trois variétés de Capricor- * Insect. de furinam. pl. nes; deux variétés de Buprestes, des Hanne-48. tons, des Ditiques, & autres Scarabées de displ. 95. n°. 3. férentes espéces. 12.2!

16. Dix-huit autres Boëtes contenant autant de variétés de Scarabées, tels que Buprestes, Scarabées pillulaires ou Escarbots, Chrysomeles, Staphilins, Grillons, Proscarabées, Taupins,

Dermestes, &c. 12.1.

17. Dix-huit autres Boëtes de Scarabées, dont une de Scarabées voraces des Isles, une de petits Scarabées gris à trompe ; plusieurs variétés de Cantharides, des Escarbots, des Hannetons, des Staphilins, &c. 9.

18. Vingt-autres Boëtes, dont une de Pucerons, & les autres de petits Scarabées, entr'autres quatre variétés de Coccinelles, des Charensons du bled, de petits Scarabées du seigle sauvage, des Cantharides, &c. II.

19. Une belle Phalene de la Chine, dont les aîles ont huit pouces d'envergure : sur le milieu de chacune est une espéce de vitrage triangulaire, bordé de noir sur un fond

Hh iv

rouge, qui la peut saire nommer la Vitrée de la Chine. 9". 1.

20. Le beau Papillon de la riviere des Amazones: ses aîles sont d'un bleu lustré des plus viss. 18."

21. Deux grands Papillons d'Amérique: les aîles de l'un font bleu d'azur, avec une large bordure brune, & deux rangs de taches blanches: celles de l'autre n'ont qu'une simple jécharpe bleue sur un fond rembruni: les aîles de ces deux Papillons sont oculées en dessous.

22. Six Boëres vitrées contenant autant de variétés de Papillons: sçavoir, le grand Paon de nuit, le Sphinx du Troesne, le Tabac d'Espagne, la Belle-dame, la grande Tortue & le Vulcain. 7. 5.

23. Douze Boëtes de Papillons: sçavoir, cinq variétés tant des Indes que d'Amérique, & se sept de France, dont le Papillon à queue du 15.10 fenouil, le petit Paon du jour, le Morio, &c.

24. Quinze autres Boëtes: sçavoir, trois de Papillons étrangers, dont une Phalêne couleur de rose, à bandes blanches pointillées de noir, de S. Domingue; sept de Papillons diurnes, & cinq de Phalênes de France. Les noms des Papillons sont sur chaque boëte. 16.

25. Dix-huit Boëtes de Papillons: sçavoir, six de Papillons étrangers, dont le Verd doré,

le Nacré, le Paon du jour de la Martinique, & deux Papillons porte-queue des Indes, & douze de Papillons & Phalênes de France, dont le Souci, le Silene, la petite Tortue, l'Ecaille martre, le Ptérophore, &c. 13.8.

26. Seize Boëtes de Papillons diurnes de France & d'Espagne, formant autant de variétés, dont le Porte-queue à deux bandes blanches, le petit Nacré, le Gamma ou Robert le Diable, le Deuil, le Demi-deuil, le Gazé, l'Aurore mâle, &c. 1541.

27. Seize autres Boëtes de Papillons diurnes de France, dont l'Aurore femelle, le Satire, le Bronzé, l'Argus bleu, l'Argus brun, l'Argus vert ou l'Argus aveugle, le demi - Argus, &c. 7.5.

28. Dix-huit Boëtes de Phalenes de France: sçavoir, la Minime à bandes, la Likenée rouge, la Phalene-chouette, la Feuille morte, le Volant doré, le Lamda, le Zig-zag, &c. 15.

29. Vingt autres de Phalênes plus petites, telles que la Phalêne-Carmin du Seneçon, la Chappe verte, &c. tous ces Insectes sont bien conservés. 11.1.





HUITIEME PARTIE.

OISEAUX.

* Edwards, I. Un Lorri perruche des Indes orientales *, ois. pl 174.

Mist nat. des très-bien conservé, & monté sur un petit pied de bois. 72".!

* 1b. pl. 173. 2. Un Lorri écarlatte à longue queue *, monté pareillement. 14"?

3. Une rare & belle Grive des Indes, à tête noire ornée de deux bandes jaunes, à gorge jaune & collier bleu-turquin: fes aîles font maurdoré, bordées de noir & de blanc; le ventre & la poitrine rayés de jaune & de bleu obscur, & la queue de même couleur que le collier. 40.

* 1b. pl. 149. 4. Un Paille-en-cul* de l'Isle de France, & un Damier ou Pierrot tacheté du Cap de Bonne* 1b. pl. 90. Espérance *. 24"?

5. Un Fou de l'Ascension, & un Damier.
6. Un Moineau de Bengale, & un Martin-pécheur du Pérou. es ? articles manqueixant.
7. Un Tangora du Pérou, à tête & ventre aune, & la petite Perruche du Pérou, à tête pleue & gorge rouge. non venous.

8. Deux Colibris & deux Cardinaux, l'un

mâle, l'autre femelle. 8.12!

9. Neuf Becs d'oiseaux étrangers : sçavoir, deux peu communs du Colao, espéce de Corbeau cornu d'Amérique, nommé aussi Rhinoceros, ou Oiseau trompette, & des deux variétés gravées dans Willugbi *; un de Casouar; * Ornithol. un d'une espéce de Grue du Brésil, nommée tab. 17. Jabiru*; un de Toucan, un de Pelican, un de * Ibid. tabi Phanicoptere ou Becharu, un d'Espatule, & un 47. de Lancette; un squelette de Canard, trois variétés de Nids d'oiseaux, dont un Nid pensile des Indes, fait en forme de chauffe d'Hypocrate, & ayant près de trois pieds de longueur; un de Colibri, deux d'Alcyons, l'un dans son état naturel, l'autre nettoyé de ses plumes, & tel que les Chinois l'emploient dans leurs ragouts les plus exquis. Plus quatre Œufs, dont deux verds & un bleu. 9."

10. La peau & le bec d'un Toucan, & plufieurs gorges de petits Oiseaux d'un joli plumage. Ces dernieres sont encadrées, & sous

verre. 24".

11. Deux Dufs d'Autruche en pendant. 17.1

12. Idem. 8"





NEUVIEME PARTIE

QUADRUPEDES.

1. DEUX premières dents molaires d'Elèphant, l'une de treize pouces de longueur sur
six de hauteur, & trois & demi de largeur;
l'autre un peu moins grande, 15"5'

dont une premiere à peu près de la grandeur des précédentes, tenant encore à une portion de la machoire, & usée dans sa partie supérieure par le frottement de la massication; & une seconde de sept pouces de longueur sur autant de hauteur, & près de trois pouces de largeur, sciée en deux, & polie pour montrer l'organifation des plaques verticales & transversales. Plus un tronçon de désense de cinq pouces & demi de longueur sur trois de diametre.

3. Une Corne de Rhinoceros, de deux pieds trois pouces de hauteur sur sept de largeur à sa base: elle est un peu comprimée, fort recour-

QUADRUPEDES. 49

ée en arriere, & de couleur brune obscure

lans toute sa longueur. 25.1!

4. Une autre de deux pieds huit pouces & lemi de hauteur sur près de huit pouces de largeur à sa base, de forme à peu près semblable à a précédente, mais différente en ce qu'elle a un sillon longitudinal sur sa partie possérieure, assez prosond vers le bas, diminuant insensiblement & disparoissant tout-à-sait vers la moitié de sa hauteur : elle est couverte vers le bas de sibres saillantes, courtes & très-dures, semblables aux soies d'une brosse. 25.

5. Une Corne de Rhinoceros de deux pieds cinq pouces de haut sur quatre pouces & demi de diametre à sa base qui est presque ronde. Cette Corne différe des précédentes, en ce qu'elle est plus essiée, presque droite dans les deux tiers de sa hauteur, & se recourbant ensuite en arrière. Elle est aussi couverte de sibres & un peu gercée vers le bas, mais-lisse dans le

reste. 12"

6. Une autre rare, en ce qu'elle est double. L'antérieure est haute de deux pieds deux pouces, & latéralement comprimée à mesure qu'elle s'éleve. La seconde n'a que dix pouces de hauteur: sa forme est conique, aussi comprimée par les côtés, ce qui lui donne la figure d'un coin. Ces deux Cornes, presque contiguës par la base, adhérent ensemble à une portion

494 QUADRUPEDES.

de la peau. La grande Corne a fix pouces de diametre à sa base qui est presque ronde. La base ovale de la petite a six pouces dans son plus grand diametre, sur quatre dans son petit; & la base commune, formée par le contour de la peau, est de treize pouces & demi de long sur sept de large. Toutes deux sont de couleur transact. brune 1. 131.

Transact. phil. n°. 470. pl. 111. f. 6 & 8.

7. Quatre Cornes de Rhinoceros: sçavoir, une de près de deux pieds de longueur, quoique la base en ait été coupée; une Corne naissante de six pouces & demi de haut, à base sort concave & polie; & deux autres petites Cornes naissantes que nous avons reçues adhérentes à la même peau, mais qu'un accident a détachées. L'une porte cinq pouces de haut, & l'autre deux seulement. Plus un tronçon de queue de Rhinoceros.

8. Une tête d'Hippopotame, garnie de ses Grew. mus. dents; elle porte deux pieds de longueur 2.20.

9. Une autre un peu moins grande. 13.10.

10. Une grande tête de Vache-marine, avec ses défenses.

14. Une autre moins grande. 3."

Flist. de l'A. 12. Une tête de Lion 3, & une d'une espèce cad. tom. 3 de Sanglier des Moluques, nommé Baby-lett. A-F. Roësa 4 ou Baby-Rousse 5. 6"5".

1. pl. 50. f. 3. Grew. muf. reg. foc. tab.1. 14. Une tête de

14. Une tête de Tigre; deux de Renard du

OUADRUPEDES.

Sénégal, & douze Défenses par pendans, dont deux de la Vache-marine de dix-huit pouces de long, fix d'Hippopotame de différentes groffeur & longueur, deux de Phocas ou Loup-marin, & deux de Sanglier. Plus un morceau de peau de Sanglier avec son poil. 8."

15. Un bois de Cerf à seize andouillers sur chaque perche, dont une à deux pieds neuf pouces de longueur, & l'autre un peu plus. 12".

16. Un Refait de Cerf à huit andouillers, quatre sur chaque perche, revêtu de son écorce tuberculeuse, crevassée, & de la dureté du cuir. Il a dix-neuf pouces de hauteur, & près de dix pouces de circonférence au-dessus des meules *; * Buffon. Hist. & la moitié d'un bois de cerf monstrueux, pré-gén. & part. du Roi. cisément semblable, tant pour la forme que pour tom. 6. pl. 14. les dimensions, à celui dont il est parlé dans la Description du Cabinet du Roi, sous le No. 588 *. 6.4. * Ibid. pla

17. Un très-beau bois d'Elan à dix-sept an-21, f. 2. douillers, huit d'un côté, & neuf de l'autre, portant plus de deux pieds de hauteur, sur deux

pieds dix pouces d'ouverture. 12".

18. Un autre à peu près de même grandeur, mais à vingt andouillers, dix de chaque côté. 6.1.

19. Un bois de Rhenne à vingt-huit andouillers, quatorze de chaque côté; sa hauteur passe trois pieds, & chaque perche se divise en trois branches palmées, d'où naissent plus ou moins

496 QUADRUPEDES.

d'andouillers; & un bois de Daim de vingt-

deux pouces de longueur. 5."

20. Cinq bois de jeunes Cerfs, dont un tenant à la tête, & les autres à des portions de l'os du front: l'un de ceux-ci n'a point encore d'andouillers. Plus la moitié d'un petit bois de Cerf, bizarre en ce qu'il fort trois andouillers presque immédiatement au-dessus de la meule, & que la perche fait un coude en cet endroit; la partie palmée d'un Bois d'Elan, taillée en cœur, un pied d'Elan avec son ongle; & une moitié de bois d'Elan, sur les deux côtés de la quelle on a gravé une chasse. 3.

21. Trois paires de Cornes: sçavoir celles d'un Buffle du Cap de Bonne-Espérance, te-

* Buff. Hift. nant à l'os frontal *; celles d'un Bouc, & celles gén. & part. d'un Bouquetin, adhérentes à la tête de ces Roi, tom. 11. animaux. 6.1.

22. Trois autres paires de Cornes: sçavoir, celles d'une espéce de Bœuf sauvage, nommé Bison: les autres sont de Chamois. Elles sont toutes montées sur des têtes possiches, sculptées en bois. 14"

23. Deux Cornes rares, l'une d'un Bœuf sauvage de Buenos-Ayres: cette Corne, qui est d'une grosseur remarquable, a deux pieds neuf pouces de longueur sur six pouces de diametre à sa base. Celles de cette espéce sont sort recherchées au Pérou, où l'on s'en ser en forme

QUADRUPEDES.

497

forme d'outres pour porter le vin dans les voyages. L'autre d'un animal des Indes qui nous est inconnu, a deux pieds dix pouces de longueur sur quatre pouces de diametre à sa base. Elle est noire, presque droite & relevée jusqu'aux deux tiers de sa hauteur de deux plis en spirale, dont un très-saillant. Le reste, jusqu'à sa pointe, est lisse & un peu recourbé.

24. Deux paires de Cornes: sçavoir, une paire de l'espéce de la derniere de l'article précédent, & une qui en différe en ce que les Cornes en sont moins grandes, plus droites, & leur spirale du bas moins saillante. Plus une Corne de Bouquetin, & une de trois pieds quatre pouces de long, courbée en arriere, & comprimée latéralement comme celles du Bouquetin, mais différente en ce qu'elle est comme garnie d'anneaux un peu onduleux jusqu'à huit pouces de distance de sa pointe.

dont deux un peu courbes de deux pieds dix pouces de longueur, & deux droites un peu moins grandes: les unes & les autres font garnies d'anneaux depuis la base jusqu'à la moitié de leur longueur, ou environ. 1.5.

26. Seize autres Cornes: sçavoir, deux de la Gazelle des Indes, l'une courbe, l'autre droite; deux de la Gazelle d'Afrique, annuleuses presque jusqu'au sommet, & courbées en arc vers le

Tome I.

haut; quatre de la Gazelle du Bézoard, dont une paire adhére à une portion de l'os frontal; deux d'une Gazelle d'Arabie, adhérentes à la tête entiere de l'animal; deux petites de Chamois; deux de Bizon, & deux d'un animal des Indes: ces dernieres font contournées en spirale, & adhérent, ainsi que les quatre précédentes, à des portions de l'os frontal. 5."

27. Un Pangolin ou Diable de Java, detrois

* Buff. tom. pieds de longueur *. 53",5"

10. pl. 34. Siba, tom. 1. 28. Un Tatou ou Armadille de Cayenne, de p. 54. fr. deux pieds trois pouces de long, & de l'espéce

*Buff. tom. nommée Cachicame ou Tatou à neuf bandes *; 560a, tom. 1. & deux peaux, l'une d'Hermine, l'autre d'Ecu-pl. 29. f. 1. reuil des Indes. 10".

29. Un Cachicame femelle, moins grand que le précédent, & parfaitement conservé dans l'esprit-de-vin. Plus, un Fœtus de Cachicame dans la même liqueur. 12".

30. Un Philandre d'Amérique, ou Marmose femelle, avec douze de ses petits, adhérens à * Buff. tom. ses mammelles * : tous sont très-bien conservés

10. pl. 53. Séba, tom. 1. dans l'esprit-de-vin. 25.7.

Merian infec.

Merian infec.

furin. pl. 66. rouge de l'Isle de Sainte-Hélene, dans l'esprit-

* Buff. tom. de-vin *. 7. 9!

32. Le Squelette & la peau séparée d'un Hérisson, garnie de ses piquans; une jambe du Chevrotain des Indes: elle est de la grosseur QUADRUPEDES.

sternum. 3.10.

d'une plume à écrire. Plus, quatre Squelettes. dont un de Taupe, un de Rat, un de Souris, & un de Chat monstrueux nouveau né. Ce dernier, outre les quatre pattes qui y font dans leur position naturelle, en offre encore quatre autres, deux desquelles sont placées au dessous de la premiere vertebre du cou, & deux sous le

33. Un Chat monstrueux nouveau né, dans l'esprit-de-vin : il est composé de deux corps joints par la poitrine, de maniere que chacun a quatre jambes & une queue, quoiqu'il n'y ait qu'un cou & qu'une tête pour les deux. Cette tête n'a rien de monstrueux que sa position par rapport aux deux corps, le museau se trouvant placé entre l'épaule droite de l'un & l'épaule gauche de l'autre. 5.3.

34. Un Cochon monstrueux nouveau né aussi dans l'esprit-de-vin: il n'a qu'un œil au milieu du front, trois dents incisives à la mâchoire supérieure, & il est privé de mâchoire inferieure. 3".





DIXIEME PARTIE.

L'HOMME.

PIÉCES D'ANATOMIE.

boëte vitrée: cette tête est parsaitement conservée, & a toutes ses dents: elle a été coupée en dissérens sens, & montée avec des vis & charnieres d'argent, pour en faire la démonstration. On trouve dans la même boëte l'explication détaillée de ce qu'on doit observer dans l'intérieur de la tête par les diverses coupes qu'on y a pratiquées. 40.

2. Les Tégumens d'une tête humaine injectés & féchés: il est aisé de remarquer les plus petites ramifications artérielles, & on y a conservé les parties externes des oreilles, les cils & les sourcils. 3."

3. Un Cœur humain injecté, & une Ratte préparée. 4."


4. Un Fœtus mâle, d'environ dix pouces de hauteur, dans l'esprit-de-vin, 3".....

y. Un Fœtus mâle de Négresse un peu moins grand. 3". 16'

6. Deux Fœtus, l'un mâle de quatre pouces de hauteur, l'autre femelle à-peu-près de même grandeur, tous deux dans l'esprit-de-vin; le premier est de trois mois. 4"10!

7. Deux Squelettes de fœtus de près de trois pouces de hauteur. Plus, deux Fœtus, l'un d'un pouce & demi, l'autre un peu moins grand; & un Embrion de six lignes, n'ayant encore aucune de ses parties bien distinctes. Ces trois derniers sont dans l'esprit-de-vin. 5.2.

8. Une tête & un pied gauche de Momie d'Egypte. 3#1/



BÉZOARDS, CALCULS, &c.

N Bézoard de Rhinoceros, de forme ovoide un peu applatie, ayant près de deux pouces & demi dans son plus grand diametre, sur environ deux pouces dans le petit. Sa surface est presque entiérement recouverte de protubérances tortueuses comme les replis du cerveau humain. Personne n'ignore la rareté de ce Bézoard. Yoyez à la page 508.

2. Un Bézord de Porc ou Piedra del Porco;

502 CALCULS ET BEZOARDS. de près de deux pouces de diametre, monté en vermeil.

- 3. Un Bézoard oriental monté en or.
- 4. Un Bézoard de Cerf du Pérou, de deux pouces de diametre, monté en or dans le pays: cette monture est enrichie de quatre grosses perles & de neuf éméraudes.
- 5. Un Bézoard d'Eléphant, de forme sphéroidale un peu comprimée, pesant près de deux livres & demie.
- 6. Un Bézoard de Porc-épic sauvage, & un Bézoard oriental de Bornéo.
- 7. Quatre Bézoards orientaux, dont deux de Singe.
- 8. Trois Bézoards, dont un de Singe, un Bézoard verd de la côte Coromandel, & un blanc de Guinée, coupé en deux, pour en faire voir les couches & le noyau intérieur.
- 9. Quatre Bézoards, dont un de Porc-épic, un de la Vigogne du Pérou, & deux orientaux.
- 10. Deux gros Bézoards, l'un de Cayman des Indes, l'autre d'un animal du Paraguai, nommé Anta.
- del ; & deux Pierres rares : l'une est de la vessicule du siel de la plus grande espèce de Tortue de terre de l'Isle de Bourbon : elle est de

forme sphéroïdale irréguliere, épaisse de trois pouces dans son plus grand diametre, & fort légere rélativement à sa grosseur: l'autre Pierre, qui est d'un blanc-jaunâtre, & fort pesante, se trouve dans le poisson Belluga, espèce d'Esturgeon du sleuve Wolga, dont on fait la colle de poisson. M. Collinson a donné, dans les Transactions philosophiques *, un Mémoire sur cette sorte de Bézoard-

* Phil. tranfact Angi.vol. 44. n°. 483.

- ovoïde un peu comprimée, pesant onze onces; l'autre aussi de forme ovoïde, mais dont l'applatissement se trouve en trois endroits également éloignés les uns des autres, de maniere que l'ovoïde a trois faces dont les plans sont paralleles à son grand diametre, & trois côtes arrondies.
- 13. Quatre Bézoards de moyenne grosseur : sçavoir, un de l'Abyssinie, coupé en deux, & dont le centre est occupé par une petite pelotte silamenteuse; un de la côte Coromandel; & deux orientaux, l'un desquels a la forme d'une amande, & en contient essectivement une, dont l'enveloppe desséchée est un peu entr'ouverte.
- 14. Trois Bézoards, dont un de Tenasserim, un de Cayman du Pérou, & un Bézoard blanc de Guinée, coupé en deux pour montrer ses

Ii iv

504 CALCULS ET BEZOARDS.*
couches concentriques, & le noyau qui lui sert de base.

- dont un de Sanglier, & un cassé en deux parties, duquel le noyau paroît être un fruit; un Bézoard de Cochon, & un Bézoard artissiel doré, ou Pierre de Goa.
 - 16. Un Bézoard oriental, & trois du Pérou.
- 17. Quatre autres Bézoards, dont un oriental, un de la côte Coromandel, un du Pérou, & un artificiel.
- 18. Huit Bézoards tant orientaux qu'occidentaux, dont un de Sanglier des Indes, &c. Plus trois prétendues Pierres de Serpents, dont une très-grosse: on croyoit autresois que ces pierres se trouvoient dans la tête d'une espéce de Serpent à lunettes des Indes orientales, nommé par les Portugais Cobra de Capelo; mais on est revenu de cette erreur. Un Brame nous a assurés dans le pays que cette pierre n'étoit autre chose qu'un morceau de corne de Cerf, taillé & calciné ensuite comme nous le voyons: il s'en fait un grand débit à la côte Coromandel, où l'on croit cette pierre un reméde souverain contre la morsure des Couleuvres Capeles, & la piqûre des Scorpions.
- les autres des Indes ou de l'Amérique; plusieurs

CALCULS ET BEZOARDS:

desquels ont été usés ou cassés pour en voir l'intérieur. Plus, dix Noyaux de Bézoards orientaux, & les fragmens d'un Bézoard occidental.

20. Sept autres Bézoards, dont trois Hippolithes, ou Bézoards de Chevaux.

21. Sept Egagropiles ou Bézoards de Poils, dont deux de forme sphéroidale, un de forme ovoïde, & un cylindrique, revêtus d'une croûte mince & luisante; deux de Mouton, revêtus d'une croûte noire, & un formé de Poils roux assez longs & sans croûte. Plus, cinq Pierres du fiel des bœuss de Coromandel, & des Pierres du Castoreum. Ces Pierres sont celles que M. Geoffroy trouva dans les poches d'un Castor, & dont il donna la description à l'Académie des Sciences, dans la seconde partie de son Mémoire sur les Bézoards *. Elles ont * Mém. de passé dans notre Cabinet avec la suite entiere l'Acad. des Sc. des autres Bézoards que M.M. Geoffroy pere 206 & 207. & fils avoient rassemblés : c'est cette même suite qui étoit sans contredit une des plus complettes que l'on pût voir en ce genre, que nous présentons aujourd'hui, augmentée de plusieurs autres Bézoards, particuliérement de ceux d'Amérique qui nous ont été envoyés du Pérou.

22. Deux Pierres humaines d'une grosseur extraordinaire: elles sont du genre de celles que l'on nomme Murales, de forme ovoïde appla-

506 CALCULS ET BEZOARDS.

tie, & pesent l'une dix onces & demie, l'autre fix onces & cinq gros.

23. Huit Pierres humaines, la plûpart de la vessie, & très - grosses, les unes de substance plâtreuse & friable, les autres compactes, dures & fort rabotteuses. Plus, une noirâtre dont le noyau joue en dedans, comme aux Pierres d'aigle, lorsqu'on la secoue.

24. Douze autres Pierres de vessies humaines, remarquables les unes par leur grosseur, les autres par leur forme & la substance qui les compose: il y en a entr'autres trois assez grosses qui furent tirées du Pere Ange de Tréport après sa mort.

25. Douze Boëtes contenant plusieurs Calculs & Pierres humaines tant de la vessie que de la vessicule du siel, avec une vésicule séchée, remplie de ces Pierres; un Spongia Veneris, & une suite de Graviers rendus par plusieurs personnes, à la suite de l'usage des pillules Angloises.

26. Vingt & une petites Boëtes qui contiennent une suite de Perles très-intéressante: sçavoir, deux Perles orientales rondes de la plus belle eau; une Boëte de Semences de Perles orientales; une de Perles occidentales du Pérou, aussi d'une belle eau; une de Perles d'Afrique plombées; trois de Perles d'Ecosse, les unes

blanc-mat, les autres grises, & les autres onices ; une de Perles gris de lin , une de Perles en poire blanc de lait, une de Perles hémisphériques, deux de Perles baroques, cinq de Perles de la Pinne-marine, dont une de rondes, rouge de Corail; une de Perles en poire de même couleur, une de grises, une de grises-verdâtres, & une grosse en poire, noire à zônes verdâtres; deux dont on a enlevé une partie de la couche extérieure, pour voir les intérieures; deux Loupes de Perles, dont une très-singuliere en ce qu'elle est semblable au gros mordant d'un Crabe: peut-être même en est-ce un, qui ayant été renfermé dans l'Huitre par quelque accident, aura été entiérement recouvert tant en dedans qu'en dehors, de la liqueur nacrée qui transsudoit du corps de l'animal; & une Coque de Perles.

27. Vingt & une boëtes de Perles de toutes

les variétés de l'article précédent.

28. Un morceau d'Ambre-gris du poids de fix onces (*).

^{[*)} Nous rangeons ici l'Ambre-gris, non comme un Bézoard, mais à cause de son origine qui est probablement dûe au regne animal. Il est constant, par le rapport de plusieurs Voyageurs instruits & bons Naturalistes tels que Kempfer 1, Anderson 2, &c. que l'Am- 1Amon. exobre-gris se trouve tout sormé dans les intestins de quel- ticæ. sasc. de la Hist. de ques Cétacées. Nous avons eu plus d'une fois occasion de l'Hlande & du nous assurer nous-mêmes que les prétendus becs d'oiseaux Groenland,

CALCULS ET BEZOARDS: 508 29. Deux autres qui pesent ensemble environ

trois onces.

30. Trois Vessies de Musc du Tonquin dans une boête de plomb.

que l'on y trouve presque toujours, & souvent même en grande quantité, ne sont que des Becs de Seche ou du Polype, animaux qui servent souvent de proie à ceux qui produisent l'Ambre-gris. Si cette substance a donc été mise pat la plûpart des Naturalistes & des Chymistes au nombre des Bitumes, c'est, comme le remarque très bien M. Macquer *, » plutôt d'après ses propriétés * Diction, de 33 & à cause des principes qu'elle fournit lorsqu'on la

Chym. au mot 30 distille, que, par une connoissance certaine de son so origine; car on ne connoît point d'Ambre-gris vério tablement fossile.

Conte la fuite se Beroard och againgten " juguepet Compris le nº 30. a cliepposée ilasente en un feul artide et retirée





ONZIEME PARTIE.

VÊGETAUX.

rope & des deux Indes, dont quarante-quatre échantillons en petites tablettes polies & étiquettées. Plus un morceau de Bois rouge du Japon, & deux Bâtons des Indes, curieux par les nodofités & tubercules dont ils font revêtus dans toute leur longueur. 26.3

2. Deux morceaux de Bois, curieux: dans l'un, qui se sépare en deux, se trouve une espéce de Croix de Malte qui y a été comme imprimée par la nature; l'autre est une loupe d'arbre, creuse & mammelonée en dedans, mais dont l'extérieur est comme ciselé, à cause des sibres sans nombre qui y serpentent par ondes ou en forme de tourbillons. 24.1.

3. Cinq morceaux; sçavoir, un très-beau Bâton noueux des Indes, de cinq pieds de hauteur, & quatre variétés de cannes, dont une à sucre, une de Bambou, &c. 15.1.

4. Deux morceaux curieux : l'un est le fameux Borametz ou Agneau de Scythie, que l'on a cru long-temps être un animal-plante, mais qui n'est dans le vrai que le collet d'une racine de fougere revêtu d'un duvet jaune rougeâtre, & dont on a eu soin de retrancher les petites racines, tandis qu'avec les bouts des tiges, on a formé les prétendues pattes de cet Agneau. Cette espéce de fougere croît proche de Samara fur le Wolga : l'autre est un morceau de Bois rongé par les fourmis blanches connues aux Indes orientales fous le nom de Carias, & au Pérou fous celui de Comegen. On voit à la base de ce morceau, les trous par où se font introduits ces insectes destructeurs: L'intérieur est évuidé presque en entier, & ne montre plus que des cloisons délicates paralleles les unes aux autres, striées suivant leur longueur, & qui ne tiennent ensemble que par des jambages latéraux & paralleles à la base, que ces insectes y ont laissés de distance en distance. 14#

5. Différentes parties de végétaux; telles que racines, écorces, &c. entr'autres, une racine de la Chine qui imite un quadrupede; une qui représente la têre d'un oiseau à long bec; une racine de Manglier sur un granite; un agaric à longue tige; canelle blanche, canelle de la Province de Quito, avec la fleur

de l'arbre qui la produit; écorce de l'arbre du girofle de Maragnon; autre d'un arbre des Isles Malouines, laquelle réunit le goût de toutes les épices; écorce du Simarouba; écorce de l'arbre Aquila de la Havanne, dont on fait de la dentelle; avec un morceau de cette dentelle; deux bougies, l'une jaune, l'autre verte, faites de la cire de l'arbre de cire de la Louisiane, cire végétale de la Chine, &c. en tout vingt-six morceaux. 15.

6. Deux Cocos remplis: l'un de Baume de Tolu, l'autre de Baume du Pérou; plus une phiole de véritable Baume de la Meque. 18.1.

7. Une suite de Baumes, gommes, résines, &c. tels que Baume de Sainte-Marie, Baume de Tolu, Gomme Copal, Laque en bâtons, Sang-dragon, Gomme Elemi, Oliban, Benjoin, Résine du pin, un morceau du bois qui donne la gomme Caragne, dans lequel on voit beaucoup de cette résine, &c. en tout trente morceaux, dont quelques-uns renserment des insectes. 16.4.1.

8. Un Herbier contenant deux cent soixantedix plantes tant terrestres que marines. La collection des algues, fucus, mousses marines, est sur-tout intéressante par le nombre & la variété des espéces qu'elle réunit. Plus cinq Egagropiles de mer, composées de sibres végétales, entrelacées ensemble à peu près comme dans les

Bézoards de poils. Deux font ovoïdes, une sphérique, & deux très-grandes, caverneuses semblables pour la forme à certains Aleyons. 81.

9. Un très-grand Coco de mer des Maldives, il est formé comme de deux lobes ovoïdes qui se réunissent par le milieu, de maniere à représenter une paire de sesses les parties naturelles de la semme. Ces Cocos se trouvent sur le rivage des Isles Maldives, où ils sont jettés par les slots, sans que l'on sçache quelle est leur origine. Ils sont très-recherchés des Indiens, qui les regardent comme un reméde universel, & qui les payent au poids de l'or. 100. 2.

10. Six fruits des Indes & de l'Amérique; fçavoir, deux grandes Calebasses, un Pain de singe, fruit du Baobab, arbre du Sénégal; trois grands Cocos revêtus de leur écorce, dont un entier, un coupé suivant sa longueur, & un coupé transversalement pour faire voir l'épaisseur & la nature de l'enveloppe extérieure. Plus un Coco des montagnes d'Andos au Pérou, avec son couvercle, & un faisceau de branches à fruit du Palmisse.

moyenne grandeur, & petits, tant de terre que de mer: il y en a des Indes orientales, du Brésil, du Chili, du Mexique, du Choco au Pérou, &c. & plusieurs noix d'Areque, dont une avec son enveloppe.

12. Un tiroir contenant divers fruits d'Europe & des deux Indes, tels que Cocos, Pommes de Pin, de Cedre, de Cyprès, Coloquintes, Calebasses, Courbaris, Huras, Pain de singe, Figue banane, Coton du fromager avec son enveloppe, seuilles de Coca, que les Amériquains mangent, comme les Indiens le Bétel, &c. en tout soixante morceaux.

13. Trois cent variétés de graines, siliques, amandes, noyaux, &c. d'Europe & des Indes. Plus vingt - quatre échantillons de Thé, avec les différentes préparations de cette seuille; ce qui forme une suite complette de tous les états par où elle passe avant de nous être apportée. 36.1.


14. Un bocal & un flacon qui contiennent, l'un deux fruits de Muscade entiers, l'autre une Ate ou Pomme de Canelle d'Amérique; cette derniere, qui avoit été mise petite dans la liqueur, y a pris tout son accroissement, comme il est aisé d'en juger par son diamètre, qui est du double plus grand que le goulot du flacon qui la renserme. 6."

15. Deux bocaux contenant, l'un des Citrons de la Chine, de l'espèce nommée vulgairement, le Monstre, l'autre trois racines en forme de mains.

Fin du premier volume.

Tome I.

Kk



TABLE

ALPHABÉTIQUE

DES CURIOSITÉS NATURELLES

Contenues dans le premier Volume.

Α.

and with the	
A Comment of the Comm	1
A BEILLES,	Page 485
l'Abricot,	336
Acétabule,	58
Agaric. Voy. Alcyons, Astroites,	Epon-
ges, Madrépores & Rétépores.	
l'Agate,	269
l'Agatine,	150
Agneau de Scythie,	510
l'Aigle (Poisson),	476
l'Aigrette,	163
l'Aiguille,	223
à coudre,	220
en vis de tambour,	223
de mer (Poisson)	477
l'Aile d'Ange,	188
de Chauvesouris femelle	
de Chauvesouris mâle,	ibid.
de Papillon (cornet)	234
1	~> t

the second secon	
TABLE ALPHABÉTIQUE	515
l'Aîle de Papillon (telline),	370
les Aîlées,	179
l'Aîle large,	ibid.
Alcyons,	66
en agaric,	68
en cornes de daim,	67
en figue,	ibid.
en poire,	ibid.
en vesse de loup,	89
l'Aléne,	220
Algues,	511
l'Amadis,	234
l'Amande,	340
à cils,	345
rôtie,	357
Ambre gris,	507
l'Amiral,	233
à deux bandes,	ibid.
d'Angleterre,	234
d'Orange,	232
masqué,	233
Ammonies,	101
Amphibies,	478
Amphisbene. Voyez Double March	
l'Anémone de mer,	469
l'Ane rayé,	134
Anomies, 9,10,1	
Antales,	98
l'Antenne d'écrevisse,	11.57
l'Apan,	390
Araignée (infecte),	484
l'Araignée. Voyez Bécasse épineuse.	189
femelle (murex)	183
mate Kk ij	100
17 12 17	

516 IABLE	
l'Arche de Noé,	359
les Arches,	357
l'Argus (porcelaine),	270
l'Argus fascié (Buccin),	143
l'Argus aveugle (Papillon)	489
bleu (idem),	ibid.
brun (idem),	ibid.
verd (idem),	ibid
l'Arlequin de Cayenne,	486
l'Arlequine,	270
Armadille. Voyez Tatou.	
l'Arrofoir,	97
l'Artichaut,	414
l'Artimon entortillé,	183
Astroites,	2 I
Astroïte à étoiles anguleuses,	22, 23
à étoiles rondes,	ibid.
agaric,	2.2
globuleux,	2,2 , 23
tête de more,	2.2
l'Astrolépas,	. 86
Astrophite. Voyez Tête de Méduse.	
Ate ou Pomme de Canelle,	5 1 3
l'Aumusse,	244
l'Aurore femelle,	489
mâle,	ibid
B.	
BABY-ROESA	
ou (tête de),	594
Baby-Rousse	,)74
Baleine (fanons de),	477
(membre),	476
(nageoire),	477
(mgoone),	7//

	ALPHABÉTIQUE	5.17
	Baleine (os de l'ouie),	ibid.
	(vertebre)	476
	Baliste scolopax,	ibid.
la		57
	Barillets. Voyez Cœurs marins.	
	Barnacle. Voyez Conque anatifere.	
	Basilic factice,	476
	Bateau (cœur en)	349
	Bateau (lépas en)	82
	Baume de la Méque,	511
	de Sainte-Marie,	ibid.
	de Tolu,	ibid.
	du Pérou,	ibid,
la	Bécasse. Voyez Tête de Bécasse.	
	épineuse,	203
	Bec de Becharu,	(49 I
	de Canard (coquille),	377
	de Casouar,	ibid.
	de Colao,	
	d'Espatule,	49 I ibid.
	de Jabiru,	ibid.
	de Lancette,	ibid.
	de Pélican, de Perroquet (coquille),	311
	de Toucan,	491
	Bécharu. Voyez Phænicoptere.	Tグ~
	Becune (machoire de),	476
10		23, 424
	Belle-Dame,	4.88
	Benitier (cœur),	368
	Benitier (peigne),	317
16	Bézoard, Voyez casques.	
	D/ 1 1 1 1 1 1 1 1 1	502
	Bézoard d'Anta,	302

	Dezoatu de Dœur,	305
	de Cayman,	502
	de Cerf du Pérou,	ibid.
	de Cheval,	505
	de Chien,	504
	d'Eléphant,	502
	de Mouton,	505
	de Poil, Voyez Egagropiles.	
	de Porc,	501
	de Porcépic,	502
	de Rhinocéros,	501
	de Sanglier,	504
	de Singe,	502
	de Tortue de terre,	ibid.
	de Vigogne,	ibid.
	du poisson Belluga, *	503
	factice. Voyez Pierre de Goa.	
la	Bille d'ivoire;	. 336
	Bison (cornes de),	496
la	Bistournée,	285
	Bivalves. Voyez Coquilles.	-
	Blatta bisantia. Voyez Ongle odorant	
	Blatte,	485
	Bouf de Buenos-Ayres (cornes de)	496
	Bois de Cerf,	495
le.	Bois de Cerf. V. Madrépores & Mille	pores.
le	Bois de Cerf. Voyez Patte de Crapau	d.
	Bots de Daim,	4.96
	d'Elan',	495
	de Rhenne,	ibid.
	Bois (échantillons de)	509
	figuré,	ibid.
	rongé par le Carias,	-510

ALPHABÉTIQUE. 319
Bois rouge du Japon, 509
le Bois veiné,
le Bonnet Chinois,
de Dragon, 86,87
de Fou. Voyez Caur de bauf.
de Matelot, 92
de Neptune (éponge), 62
de Neptune (fongipore), 38
de Pologne, 174
Borametz. Voyez Agneau de Scythie.
la Bossue, 265
fans dents, ibid.
Bouc (tête de) 496
Boucarde. Voyez Cœur de bœuf.
la Bouche à droite. Voyez Contre-unique.
à gauche. Voyez Unique.
d'argent,
de lait, 145
d'or,
double, 120, 128
les Boucliers (Lépas), 78,86
les Boucliers (Ourfins) 421
la Bouée,
Bouquetin (tête de), 496
la Bourse,
le Bout de Chandelle, 234
le Bouton de Camisole,
de la Chine,
le Brocard de foie, 256
la Bronzé. 323
10 3.0020
la Brulée,
la Brunette
K k iv

le Caffé au lair, Calcul humain, Calemar,	131 133 136 155 143 436 445 147 181 144 496 57 206 486 ibid. 111 389 390 144 477 498 ibid. 123
à bouche entière, à bouche échancrée, à longue queue, à perite queue, fluviatiles, terrestres, le Buccin crenelé, de la Mer Rouge, feuilleté, Buffle (cornes de) la Bugle Coralline, la Bulle d'Eau, Buprestes, dorés, les Burgaux, le Burgau perlé, Byssus de la Pinne-marine, Byssus (bas & gands faits de) C. le Cabestan, Cabochon. Voyez Lépas. Cachalot (dentde) Cachicame femelle, mâle, le Cadran, Cæcilia. Voyez Serpent aveugle. le Caffé au lait, Calcul humain, Calemar,	133 136 155 143 445 147 181 144 496 486 ibid. 110 111 389 390
à bouche échancrée, à longue queue, à petite queue, fluviatiles, terrestres, le Buccin crenelé, de la Mer Rouge, feuilleté, Buffle (cornes de) la Bugle Coralline, la Bulle d'Eau, Buprestes, dorés, les Burgaux, le Burgau perlé, Byssus de la Pinne-marine, Byssus (bas & gands faits de) C. le Cabestan, Cabochon. Voyez Lépas. Cachalot (dentde) Cachicame femelle, mâle, le Cadran, Cacilia. Voyez Serpent aveugle. le Caffé au lait, Calcul humain, Calemar,	136 155 143 445 147 181 144 496 486 ibid. 111 389 390 144 477 498 ibid. 123
à longue queue, à petite queue, fluviatiles, terrestres, le Buccin crenelé, de la Mer Rouge, feuilleté, Buffle (cornes de) la Bugle Coralline, la Bulle d'Eau, Buprestes, dorés, les Burgaux, le Burgau perlé, Bysfus de la Pinne-marine, Bysfus (bas & gands faits de) C. le Cabestan, Cabochon. Voyez Lépas. Cachalot (dentde) Cachicame femelle, mâle, le Cadran, Cacilia. Voyez Serpent aveugle. le Caffé au lait, Calcul humain, Calemar,	155 143 438 445 147 181 144 496 37 206 486 ibid. 111 389 390 144 477 498 ibid. 123
à petite queue, fluviatiles, terrestres, le Buccin crenelé, de la Mer Rouge, feuilleté, Buffle (cornes de) la Bugle Coralline, la Bulle d'Eau, Buprestes, dorés, les Burgaux, le Burgau perlé, Byssus de la Pinne-marine, Byssus (bas & gands faits de) C. le Cabestan, Cabochon. Voyez Lépas. Cachalot (dentde) Cachicame femelle, mâle, le Cadran, Cacilia. Voyez Serpent aveugle. le Caffé au lait, Calcul humain, Calemar,	143 445 147 181 144 496 57 206 486 ibid. 110 389 390 144 477 498 ibid. 123
fluviatiles, terrestres, le Buccin crenelé, de la Mer Rouge, feuilleté, Buffle (cornes de) la Bugle Coralline, la Bulle d'Eau, Buprestes, dorés, les Burgaux, le Burgau perlé, Byssus de la Pinne-marine, Byssus (bas & gands faits de) C. le Cabestan, Cabochon. Voyez Lépas. Cachalot (dentde) Cachicame femelle, mâle, le Cadran, Cacilia. Voyez Serpent aveugle. le Caffé au lait, Calcul humain, Calemar,	439 445 147 181 144 496 57 206 486 ibid. 110 389 390 144 477 498 ibid. 123
terrestres, le Buccin crenelé, de la Mer Rouge, feuilleté, Buffle (cornes de) la Bugle Coralline, la Bulle d'Eau, Buprestes, dorés, les Burgaux, le Burgau perlé, Byssus de la Pinne-marine, Byssus (bas & gands faits de) C. le Cabestan, Cabochon. Voyez Lépas. Cachalot (dentde) Cachicame femelle, mâle, le Cadran, Cacilia. Voyez Serpent aveugle. le Caffé au lait, Calcul humain, Calemar,	445 147 181 144 496 57 206 486 ibid. 110 111 389 390 144 477 498 ibid. 123
le Buccin crenelé, de la Mer Rouge, feuilleté, Buffle (cornes de) la Bugle Coralline, la Bulle d'Eau, Buprestes, dorés, les Burgaux, le Burgau perlé, Byssus de la Pinne-marine, Byssus (bas & gands faits de) C. le Cabestan, Cabochon. Voyez Lépas. Cachalot (dentde) Cachicame femelle, mâle, le Cadran, Cacilia. Voyez Serpent aveugle. le Caffé au lait, Calcul humain, Calemar,	147 181 144 496 57 206 486 ibid. 110 111 389 390 144 477 498 ibid. 123
de la Mer Rouge, feuilleté, Buffle (cornes de) la Bugle Coralline, la Bulle d'Eau, Buprestes, dorés, les Burgaux, le Burgau perlé, Byssus de la Pinne-marine, Byssus (bas & gands faits de) C. le Cabestan, Cabochon. Voyez Lépas. Cachalot (dentde) Cachicame femelle, mâle, le Cadran, Cacilia. Voyez Serpent aveugle. le Caffé au lait, Calcul humain, Calemar,	181 144 496 57 206 486 ibid. 110 111 389 390 144 477 498 ibid. 123
feuilleté, Buffle (cornes de) la Bugle Coralline, la Bulle d'Eau, Buprestes, dorés, les Burgaux, le Burgau perlé, Byssus de la Pinne-marine, Byssus (bas & gands faits de) C. le Cabestan, Cabochon. Voyez Lépas. Cachalot (dentde) Cachicame femelle, mâle, le Cadran, Cacilia. Voyez Serpent aveugle. le Caffé au lait, Calcul humain, Calemar,	144 496 57 206 486 ibid. 110 111 389 390 144 477 498 ibid. 123
Buffle (cornes de) la Bugle Coralline, la Bulle d'Eau, Buprestes, dorés, les Burgaux, le Burgau perlé, Byssus de la Pinne-marine, Byssus (bas & gands faits de) C. le Cabestan, Cabochon. Voyez Lépas. Cachalot (dentde) Cachicame femelle, mâle, le Cadran, Cacilia. Voyez Serpent aveugle. le Caffé au lait, Calcul humain, Calemar,	496 57 206 486 ibid. 110 111 389 390 144 477 498 ibid. 123
la Bugle Coralline, la Bulle d'Eau, Buprestes, dorés, les Burgaux, le Burgau perlé, Byssus de la Pinne-marine, Byssus (bas & gands faits de) C. le Cabestan, Cabochon. Voyez Lépas. Cachalot (dentde) Cachicame femelle, mâle, le Cadran, Cacilia. Voyez Serpent aveugle. le Caffé au lait, Calcul humain, Calemar,	57 206 486 ibid. 110 389 390 144 477 498 ibid. 123
la Bulle d'Eau, Buprestes, dorés, les Burgaux, le Burgau perlé, Byssus de la Pinne-marine, Byssus (bas & gands faits de) C. le Cabestan, Cabochon. Voyez Lépas. Cachalot (dentde) Cachicame femelle, mâle, le Cadran, Cacilia. Voyez Serpent aveugle. le Caffé au lait, Calcul humain, Calemar,	206 486 ibid. 111 389 390 144 477 498 ibid. 123
Buprestes, dorés, les Burgaux, le Burgau perlé, Byssus de la Pinne-marine, Byssus (bas & gands faits de) C. le Cabestan, Cabochon. Voyez Lépas. Cachalot (dentde) Cachicame femelle, mâle, le Cadran, Cacilia. Voyez Serpent aveugle. le Caffé au lait, Calcul humain, Calemar,	206 486 ibid. 111 389 390 144 477 498 ibid. 123
dorés, les Burgaux, le Burgau perlé, Bysfus de la Pinne-marine, Bysfus (bas & gands faits de) C. le Cabestan, Cabochon. Voyez Lépas. Cachalot (dentde) Cachicame femelle, mâle, le Cadran, Cacilia. Voyez Serpent aveugle. le Caffé au lait, Calcul humain, Calemar,	1111 389 390 144 477 498 ibid. 123
les Burgaux, le Burgau perlé, Byssus de la Pinne-marine, Byssus (bas & gands faits de) C. le Cabestan, Cabochon. Voyez Lépas. Cachalot (dentde) Cachicame femelle, mâle, le Cadran, Cacilia. Voyez Serpent aveugle. le Caffé au lait, Calcul humain, Calemar,	1111 389 390 144 477 498 ibid. 123
le Burgau perlé, Byssus de la Pinne-marine, Byssus (bas & gands faits de) C. le Cabestan, Cabochon. Voyez Lépas. Cachalot (dentde) Cachicame femelle, mâle, le Cadran, Cæcilia. Voyez Serpent aveugle. le Caffé au lait, Calcul humain, Calemar,	111 389 390 144 477 498 ibid. 123
Bysfus de la Pinne-marine, Bysfus (bas & gands faits de) C. le Cabestan, Cabochon. Voyez Lépas. Cachalot (dentde) Cachicame femelle, mâle, le Cadran, Cacilia. Voyez Serpent aveugle. le Caffé au lait, Calcul humain, Calemar,	389 390 144 477 498 ibid. 123
Byssus (bas & gands fairs de) C. le Cabestan, Cabochon. Voyez Lépas. Cachalot (dentde) Cachicame femelle, mâle, le Cadran, Cæcilia. Voyez Serpent aveugle. le Caffé au lait, Calcul humain, Calemar,	389 390 144 477 498 ibid. 123
Byssus (bas & gands fairs de) C. le Cabestan, Cabochon. Voyez Lépas. Cachalot (dentde) Cachicame femelle, mâle, le Cadran, Cæcilia. Voyez Serpent aveugle. le Caffé au lait, Calcul humain, Calemar,	390 144 477 498 <i>ibid</i> . 123
C. le CABESTAN, Cabochon. Voyez Lépas. Cachalot (dentde) Cachicame femelle, mâle, le Cadran, Cacilia. Voyez Serpent aveugle. le Caffé au lait, Calcul humain, Calemar,	144 477 498 ibid. 123
le Cabestan, Cabochon. Voyez Lépas. Cachalot (dentde) Cachicame femelle, mâle, le Cadran, Cacilia. Voyez Serpent aveugle. le Caffé au lait, Calcul humain, Calemar,	477 498 ibid.
Cabochon. Voyez Lepas. Cachalot (dentde) Cachicame femelle, mâle, le Cadran, Cacilia. Voyez Serpent aveugle. le Caffé au lait, Calcul humain, Calemar,	477 498 ibid.
Cabochon. Voyez Lepas. Cachalot (dentde) Cachicame femelle, mâle, le Cadran, Cacilia. Voyez Serpent aveugle. le Caffé au lait, Calcul humain, Calemar,	477 498 ibid.
Cachalot (dentde) Cachicame femelle, mâle, le Cadran, Cæcilia. Voyez Serpent aveugle. le Caffé au lait, Calcul humain, Calemar,	498 ibid. 123
Cachicame femelle, mâle, le Cadran, Cæcilia. Voyez Serpent aveugle. le Caffé au lait, Calcul humain, Calemar,	498 ibid. 123
mâle, le Cadran, Cacilia. Voyez Serpent aveugle. le Caffé au lair, Calcul humain, Calemar,	<i>ibid</i> . 123
le Cadran, Cacilia. Voyez Serpent aveugle. le Caffé au lair, Calcul humain, Calemar,	123
Cacilia. Voyez Serpent aveugle. le Cassé au lair, Calcul humain, Calemar,	
le Caffé au lair, Calcul humain, Calemar,	
Calcul humain, Calemar,	
Calcul humain, 505,	271
Calemar,	
	469
le Calice. Voyez Madrepores.	,
A	

ALPHABÉTIQUE.	521
la Calotte,	60
les Cames,	328
à bases ovales irrégulieres,	344
à bases ovales régulieres,	339
à bases rondes irrégulieres,	335
à bases rondes régulieres,	329
d'Eau douce,	433
la Came coupée,	360
coupée en bec de flute,	361
feuille,	340
luifante,	34I
Pholade,	375
radiée,	362
truitée,	340
tronquée,	360
violette,	343
Caméléon,	481
Canard (squelette de)	49 I
Cancres,	474
le Cancre des moluques,	ibid.
ours,	47 E
fquinade,	474
velu,	ibid.
Canelle blanche,	. 510
du Pérou,	ibid.
Cantharides,	487
Caouanne,	482
Carapaces de Tortue,	ibid.
le Cardinal (oiseau)	491
la Cardinale (coquille)	141
Carret,	482
la Carte géographique,	267
Caryophilloides,	37.

TABLE

Casouar (bec de)	14 - 4
le Casque Bézoard,	491
en baudrier,	173
pavé ou truité,	174
plume,	172
rayé,	171
triangulaire,	174
tricotté,	177
la Castagnette,	178
Caurie Voyer K	299
Cauris. Voyez Kauris. le Cedo Nulli,	
Cérébrites,	339
Cerf (bois de)	27
Cerf-volant,	495
la Chagrin 4 2	486
la Chagrinée	
ou }	346
le Chagrin,	
la Chaloupe. Voyez Oscabrion,	
Chamois (cornes de),	496
le Chapeau de Neptune,	59
la Chappe verte,	40_
le Char de Neptune. Voyez Madrép	ores.
se Chardon,	414
de mer,	68
Charensons,	487
Char monstrueux,	499
la Chaussetrape,	164
de M. Dargenville	194
La Chauvelouris. Voyez Foudre.	727
Chenille (insecte),	. 484
à tiges,	* 484 ibid.
la Chenille bariolée,	
blanche,	226
,	229

ALPHABÉTIQUE.	.523
la Chenille blanche rériculée,	227
de mer. Voyez Ojcabrion.	
de mer. Voyez Taupe marine.	
granuleuse,	227
noire,	226
le Cheval de frise,	194
marin (petit),	476
le Cheveu de mer,	56
Chevrette,	471
Chevrotain des Indes (jambe du),	498 199
la Chicorée,	475
Chien de mer,	476
(fa gueule),	498
Chien volant,	366
le Chou,	38
de mer, Chou-fleur. Voyez Madrépores.	
Chrysalides,	484
Chrysomeles,	487
le Cierge (Cornet),	247
Blanc,	ibid.
Jaune,	ibid.
le Cierge (éponge),	61
le Cierge (tuyau de mer),	. 98
Cignle	485
le Cigne, Voyez Cierge blanc.	226
le Clocher Chinois,	228
Gorbigue.	220
la Clochette, Voyez Glands de mer.	333
la Clonisse,	484
Cloporte (infecte),	ਜੂ-ਜ
le Cloporte, Voyez Ofcabrion.	276
le Cloporte (porcelaine),	

J-7 2 22 D L E	
le Cloud,	219
Coccinelle,	487
Cochon monstrueux,	499
Coco des Maldives,	512
des montagnes d'Andos,	ibid.
Cocons de Chenille,	485
les Cœurs,	348
marins,	418
nommés Arches,	357
ou Conques de Venus,	360
proprement dits.	349
le Cœur allongé,	354
de Bœuf,	355
de l'Homme,	353
de Pigeon,	ibid.
de Venus,	349
en bateau,	349
en soufflet,	353
épineux,	355
triangulaire,	353
tuilé,	ibid.
Colao, ou oiseau trompette,	491
Colibri,	ibid.
la Colique,	273
la Comete digitée miliaire, 456	, 458
épineuse,	456
Concha exotica,	351
Concha veneris à pointes,	363
Concha veneris à rézeau,	ibid.
Concha veneris sans pointes, V. la Créo	le.
la Conchiliologie, Voyez La Fripiere. le Concho-Lepas.	
	87
Concombre marin,	469

ALPHABÉTIQUE.	525
la Conque de Triton,	149
éxotique,	351
persique,	214
Conques Anatiferes,	405
de Venus	360.
sphériques, Voyez Tonnes.	
la Contre-unique (limaçon),	443
la Contre-unique (porcelaine),	266
la Contre-unique (vis-buccin),	448
le Coq de mer,	473
le Coq & la Poule,	312
Coque de perles,	507
le Coqueluchon de Moine,	358
Coquilles,	71
Bivalves d'eau douce,	433
Bivalves de mer,	277
fluviatiles,	427
Multivalves de mer,	39 I
terrestres,	436
Univalves d'eau douce,	428
Univalves de mer,	75
Carail	5
articulé, Voyez faux Cotail.	_
Llana	8,9
blanc oculé. Voyez Madrepore	25.
noir. Vovez keratophites.	
rouge,	5, 10
rouge & blanc.	8,9
violet, Voyez Madrépores.	
1. Caralline	319
Corallines, 9, 14, 5	6,58
à cils,	. 57
à cosses,	ibid.

TABLE

Corallines à lentes,	ibid.
à touffe couleur d'ivoire,	ibid.
Coralline bugle,	57
commune,	ibid.
rampante,	ibid.
tubuleuse de Malte,	104
la Corbeille (came),	339
la Corbeille (cœur),	358
la Corbeille (huitre),	289
la Cordeliere,	TOI
le Cordon bleu,	117
la Corne d'abondance,	289
Corne de Rhinocéros double,	493
Corne de Rhinocéros simple,	492
Cornes de Bœuf de Buenos-Ayres,	496
de Bison,	496
de Bouc,	ibid.
de Bouquetin,	ibid.
de Chamois,	ibid.
de Daim,	ibid.
de Daim. Voyez Frondipore	5 ,
Alcyons, Eponges, Madrépores.	
de Gazelle,	497
d'Elan,	495
de Rhenne,	ibid.
le Cornet de chasseur,	44 I
de postillon,	101
de S. Hubert,	439
ponctué,	241
les Cornets,	232
la Cornue,	399
le Courlis, Voyez tête de Becasse.	
Couronne de serpens,	406
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	

ALPHABÉTIQUE.	527
la Couronne d'Ethiopie,	210
Impériale,	247
Papale, Voyez Thiare.	.,
Courtilliere,	484
Coufins,	485
le Coutelier, Voyez manches de coutes	au.
le Coutil, Voyez toile à matelas.	
le Crabe à nœuds ou gouteux,	191
commun,	189
porte-croix,	472
faxatile,	472
fillonné,	473
velu,	ibid.
le Crapaud (porcelaine),	273
le Crapaud (rocher),	170
la Créole,	363
la Crête de Coq,	287
Crocodile,	481
Croix naturellement empreinte dans	un
morceau de bois,	509
Crustacées,	470
à corps allongé,	471
à corps arrondi,	474
à corps large,	472
la Cuiller de Neptune,	212
à pot,	223
la Cuisse,	286
la Culotte de Suisse	169
les Culs de lampe,	125
le Cyprès de mer,	57
marin,	49

TABLE D.

D	
DAIM (bois de),	496
Damier (oiseau),	490
le Damier (coquille),	245
à bandes jaunes,	ibid.
Dattes (coquilles),	386
Dauphin (tête de)	476
le Dauphin (coquille)	110
Décempede de Cornouaille	465
Défense d'Elephant,	492
d'Espadon,	476
d'Hippopotame,	495
de Narwal,	476
de Phocas,	495
du poisson scie;	476
de Sanglier,	495
de Vache marine	ibid.
le Demi-argus,	489
le Demi-deuil (coquille).	112
le Demi-deuil (papillon),	489
Demoiselles,	485
Dentales,	98
Dentelle de l'arbre Aquila,	511
Dents de Cachalot,	
d'Élephant,	477
d'Hippopotame,	492
de Sanglier, V. De	fenfes.
de Vache marine,	
Dermestes,	. 0
le Devidoir. Voyez la Bistournée.	387
le Deuil,	
	489
	Diable

ALPHABÉTIQUE.	529
Diable de Java,	498
de mer,	475
Ditiques,	487
le Dofan,	103
Dorade de la Chine,	476
le Dotel. Voyez Gueule de Souris.	
Double marcheur,	479
Dragon aîlé. Vozez Lézard volant.	
le Dragon, (coquille),	168
le Drap d'argent,	254
d'or,	25 E
d'or à fond bleu,	252
d'or fascié,	251
d'or piqueté,	253
d'or de la Chine,	252
mortuaire,	258
orangé,	252
Drap-marin, 151, 333,	359
E.	
l'Ecattle martre,	489
l'Écorchée,	255
Ecrevisse d'eau douces	47 I
de mer,	ibid.
l'Écriture Arabique,	
ou }	344
l'Écriture Chinoise,	2 11
Ecureuil des Indes (peau d')	498
Egagropiles,	505
Egagropiles de mer,	SII
Elan (bois d'),	495
Élan (pied d'),	496
Éléphant (dent d'),	492
Tome I.	

l'Enclume, Voyez la cuisse.	
l'Enfant au maillot, de mer.	222
terrestre,	448
l'Enfumée,	195
l'Entonnoir,	80,86
l'Éperon,	123
Ephémeres,	485
l'Epi de bled,	15
l'Episcopale,	186
Eponges,	59
Eponge agaric,	63,64
commune,	59
des Frotteurs,	60.
en colomne,	60,6I
en cornes de Daim,	64.
en mie de pain,	ibid.
en morille,	63,64
Oursin,	63
l'Equerre,	286
l'Escalier. Voyez Scalata & Cadran.	
Escarbots,	487
Escares molles,	56, 57
	30, 31
Espatule (bec d'),	491
l'Esplandian,	248
l'Ethiopienne, Etoiles de mer,	150
à cinq rayons,	452
à dix rayons,	465
à dix-fept rayons,	ibid.
à douze rayons,	462
The state of the s	55,456
à grains de petite vérole, 4	
	, ,

ALPHABÉTIQU	E. 531
Étoiles à quatre rayons,	454
à queue de Lézard,	464
à rayons entiers,	ibid.
à rayons fendus,	454
arborescentes,	466
à sept rayons,	462
à fix rayons,	461
à treize rayons;	463
à trente-huit rayons,	ibid.
à trente-sept rayons;	462
chevelues,	464
coriacées,	455,458
cruciformes,	454
digitées digitées	458,462
en patte d'oye,	459,461
étoilées,	454, 455
falciformes,	454
jaune vulgaire de Luid,	460
pectinées,	455
réticulées lentigineuses,	458
rofacées,	465
vermiformes,	464
l'Éventail (éponge),	60
l'Éventail, Voyez la Sole.	
des Mennonites,	331,
de Thétis, Voy. panache	e de mer.
F	
T	
la Faitiere, Voyez la Tuilée.	
ie Falier,	266
la Fausse aîle de Papillon,	244
Arlequine,	271
Gourgandine,	364
I	l ij

1.0

53	TABLE	
la	Fausse oreille de Midas,	134
	Scalata,	221
le	Faux Amiral, Voyez le Navet.	
	Faux Amiral de Guinée,	235
	Argus,	270
	Faux Corail,	43
	Blanc articulé,	45,46
	géniculé ou	46
	noueux,	ibid
	rouge articulé,	ibid
	Féverolle,	346
	Feuille (came),	340
	Feuille (huître),	287
la	Feuille ambulante,	486
	de chou,	366
	de chou. Voyez Millepor	e.
	morte (phalene),	489
la	Figue blanche,	216
	violette,	217
	Fileuse,	249
	Flamboyante,	236
la	Flute de Pan,	60
	Fœtus humain,	500,501
	Fongipores,	36
	en bouquet,	36,37
	Foret,	225
le	Fort Pentagone,	457
	Fou (oiseau),	490
le	Foudre,	160
le	Four ardent. Voyez Bouche d'or.	
	Fourmis aîlées,	485 ibid.
	fans aîles,	
La	Fraise (coquille),	353

ALPHABÉTIQUE	533
a Fraise de Saint-Domingue (insecte de Veau, Voyez Millepore	e), 485 es.
Frêlons,	485
a Fripiere,	124
e Fromage verd,	239
Frondipores,	30, 31
en cornes de Daim,	3 I
Fucus,	511
la Furie,	331
le Fuseau,	155
à dents,	ibid.
G.	
GALÉOTES (Lézard),	481
Galles de chêne,	•
d'églantier,	
de genêt,	486
de hêtre,	4
d'orme,	
le Gamma,	489
le Gâtean feuilleté,	293
Gâteaux de Frêlons,	485
les Gâteaux (oursins),	423
la Gaufre,	145
le Gazé,	489
Gazelle d'Afrique (cornes de)	497
d'Arabie (cornes de)	498
des Indes (cornes de),	497
du Bézoard (cornes de)	49S
la Géographique. Voy. Carte géogra	aphique.
la Gibeciere. Voyez la Bourse.	
Glands de mer,	401
à côte de melon,	404
L	. 1 iij

TABLE	
Glands de mer clochette,	46.4
couleur de rose,	404
épineux	ibid.
rayés,	402
tulipe,	ibid.
turban,	ibid.
le Gochet,	ibid.
Gomme caragne,	I 20
copal,	
élemi,	SII
laque	9
la Gondole,	
mammillaire;	212
la Gourgandine	210
(faulle)	353
la Gousse de féves,	3.64
le Grain d'avoine,	378
le Grain d'orge,	ibid.
Grappe marine. Voy. Raisin de mer.	epiu.
Grenouille d'Afrique,	482
de Virginie	ibid.
la Griblette,	
la Griffe du Diable,	373 188
Grillons,	487
la Grimace,	17.1
Grive des Indes (oifeau)	490
la Grive (cognille).	117
Guêpes,	485
Guêpier de Cayenne,	ibid.
de mer,	66
Gueule de Lamie.	47.6
la Gueule de Loup,	447
de Souris	384
A COUNTY OF THE PROPERTY OF TH	3

ALPHABÉTIQU	E. 5	35
la Gueule noire,	1	8.2
la Guillochée,	3	37.
Н.		
. TT		77
la ALLEBARDE,		9 I
Hannetons,		187
la Harpe,		bid.
		240
l'Hébraïque, Voy. Bois-veiné.		
Hérisson (squelette de),		498
le Hérisson (coquille),		165
Hermine (peau d'),		498
l'Hermine (coquille),		249
Hippocampe,		476
Hippolites,		505
Hippoporame (tête d');		494
l'Hirondelle,		283
de mer		476
Holothuries,		469
Huîtres,		278
à feuilles de perfil,		304
à talon,		298
de la mer rouge ;		297
épineuses,		298
feuille, Voyez feuille.		
feuilletées,		293
proprement dites		280
Humantin,		47.5
J		
JABIRU (bec de)		491
ta Jamaique		336
A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O	Lliv	
	,	. 1

136 TABLE	
le Jambon,	
le Jambonneau, Voyez Pini	ne marine.
le Jatou,	198
le Jaune d'œuf,	117
applati,	ibid.
Ichneumons	
l'Idole,	485
l'If,	430
Iguana,	227 482
Infectes,	484
l'Isabelle,	
l'Ivoire. Voyez Mitre jaune.	272
K·	
and the second s	
K AKERLAC,	485
le Kaman. Voyez Conque exocique	e.
Kauris,	273
Kératophites,	9, 13, 47
plume de mer,	49
romarin,	50
L,	
le LAMBDA,	. 0 .
Lambis,	489
Lamie (gueule de),	185
la Lampe antique,	476
Lancette, (bec de)	442
Langouste,	491
la Langue,	47.1
de Chat, Voyez chagrin	346
d'or,	
la Lanterne,	372
d'Aristote,	377
	416,426

	ALPHABÉTIQUE.	£ 4 mp
	ALPHABETIQUE.	537
le	Lapin,	268
	Lard,	162
	Léopard,	269
•	Lépas ou Patelles,	77
	à appendice en demi cornet,	91
	cabochons, 87	
	chambrés,	89
	de Magellan, 79	0
	en bateau,	82
	en gondole,	86
	entiers,	78
	fluviatiles,	428
	percés au fommet,	88
1.	Levantine (grande),	365
la	Levantine (petite),	ibid.
13	Lézard,	481
	Galeotes,	ibid.
	Téjuguacu,	482
	volant,	480
1.	Licorne (coquille),	137
12	de mer (grande), V. Narwa	
	de mer (petite),	475
v		270
10	e Lievre, à gouttes de fuif,	ibid.
,		489
	a Likénée rouge,	49
£	a Limace, Limaçons à bouche demi-ronde, Vo	
		-) - '
	Nérites.	ς.
	à bouche ovale, Voyez Sabot à bouche ronde,	110
		109
	de mer,	429
	fluviatiles,	436
	terrestres,	45

	538 TABLE	
	Limas, Voyez Limagons	
	la Lime,	326
	douce,	ibid,
NAME OF TAXABLE	Lion (tête de),	494
	Le Lion de mer,	471
	Lithophites, Voyez Kératophites.	
	Lorri écarlate,	445
	Perruche,	490 ibid.
	Loupe de perles,	507
	Loup marin (défenses de),	495
	(machoire de),	476
	la Luifante,	445
	la Lune marine,	466
	M.	
	MACHOIRES de Bécune	476
7	de Dauphin,	ibid.
	de Loup marin,	ibid.
	de Raye,	477
	de Requin,	476
	d'Espadon, de Zygêne,	ibid.
	Madrépore abrotanoïde,	ibid.
	agaric, 17, 20, 2	14
	blanc étoilé, 12	, 15
	blanc oculé, 11	, I2
		, 17
	branchu, 11	- 18
× (1)	calice ou tasse, char de Neptune,	19
	en buisson, 15, 17	18
1000	en choux fleurs,	16
	- e	and white
. 1,		

ALPHABETIQUE.	539
Madrépore en cornes de Daim,	:18
épi de bled,	15
grifâtre, 13, 15,	17
jaunâtre, 14, 16,	17
rougeâtre.	16
	12
Magna Vetula,	365
	469
de Sirene,	476
	ibid.
le Mammelon blanc;	117
jaune,	118
Manches de couteau,	378
les Manchettes de Neptune, 30	, 3 I
le Manchon de Neptune,	59
Mante (fquille),	47 I
Mante (infecte),	485.
le Manteau blanc, Voyez bourfe.	
ducal ou royal,	320
le Mantelet,	266
la Mappemonde, V. Carte géographique	
le Marbre,	153
Marmose & ses petits,	498
le Maron épineux,	356
roti,	113
le Marteau (coquille);	286
le Marteau (poisson), Voyez Zigene.	
la Martelée. Voyez Vis.	
Martin-pêcheur,	490
la Massue d'Hercule,	204
Matrices de coquillages;	69
Méandrites,	32
en priapolite	33

ALPHABÉTIQ	U E. 341
Moules,	379
cylindriques. Voyez	Dattes.
Auviatiles. Voyez Ter	ulles.
proprement dites,	380
triangulaires. V. Pinn	ies-marines.
la Moule arborisée,	386
d'Alger,	384
de la Plata,	383
des Papous,	381
double,	38 E
magellanique,	380
Monfles marines	511
Multivalves. Voyez Coquille	s.
la Mure,	105
de Dargenville,	214
de hayes,	136
Murex. Voyez Rochers.	
à dents de chien,	164
Musc,	508
la Muscade,	206
la Mufique	160
bâtarde. Voyez Bois	-veine.
couleur de rose,	ibid.
verte,	ioia.
N.	
NACELLE (la) (Lépas)	, 90
la Nacelle. Voyez Oscabrion.	
le Nacré.	489
Nageoires de Baleine,	477
NT and (fa detente)	476
la Natte de jonc. Voy. Ecritur	e aravique.
d'Italie,	-,,
le Navet,	243

ALPHABÉTIQUE.	543
l'Olearia,	110
l'Olive de Panama,	258
les Olives,	257
l'Omelette	254
Ongle du pied d'Élan,	496
l'Ongle odorant,	153
l'Onix. Voyez Cierge blanc.	
Opercules de Bouche d'or,	115
de Buccins,	153
d'Olearia,	115
l'Orbis à têre de lievre,	475
Oreilles de mer,	92
à trous,	93
fans trous,	. 95
l'Oreille d'Ane,	187
de Cochon	0
ou }	184
déchirée,	
de Cochon. Voy. Crête de Co	19.
de Midas,	132
de Vénus,	95
l'Orpheline,	331
Ortie de mer,	469
Orvert,	480
Oscabrion,	392
Ostreum tortuosum,	285
Ovaires de coquillages,	69
de Raie,	477
l'Oublie,	
Ovoïdes (Ourfins). V. Eufs marin	408
Ourfins,	400
l'Ourfin à scyes,	412
digité,	414
folaire,	425

P.

D	
la PAGODE,	125
Paille-en-cul,	490
le Pain de bougie,	101
d'épice,	423
le Palmier marin,	466
Pangolin. Voyez Diable de Java.	400
le Pannache de mer,	() () () () () () () ()
Paon de nuit, (le grand),	54, 55
Paon de jour (le petit),	488
de la Martinique,	ibid.
le Papier de la Chine,	489
marbré,	254
roulé,	250
	206
Papillon à queue du fenouil,	438
de la riviere des Amazones,	
porte-queue,	489
la Papyracée, Voyez la lanterne.	
le Parasol Chinois,	78
le Pas de Poulain,	418
Pastenaque,	475
le Pâté réticulé (gros),	7,461
(petit),	458
Patelles, Voyez Lépas.	1)
la Patte de Crapaud,	200
d'oye,	191
le Pavillon d'Hollande,	448
d'orange,	136
du prince.	446
Pavois angulaire,	
applati,	42 I
la Peau d'Ane,	422
de chagrin,	275
- County State &	236
	de

ALPHABETIQUE.	545
la Peau de serpent,	113
de Tigre,	267
les Peignes	314
à oreilles égales,	316
à oreilles inégalés;	319
fans oreilles,	327
la Pélerine,	316
tuilée,	320
Pélican (bec de),	491
la Pelotte de beurre, V. Tine de beurre.	-17 **
Pelottes marines, Voy. Egagropiles	de
mer.	
la Pelure d'oignon;	28 t
le Perçoir,	225
la Perdrix,	- 209
rouge,	134
Perles d'Afrique,	506
d'Écosse;	ibid.
de la Pinne marine,	507
du Pérou,	506
Occidentales,	ibid.
Orientales,	ibid.
le Perron,	144
	, 113
Perruche,	491
la Perruque à l'Angloise,	3.2
la Perspective, Voyez l'Escalier.	
la Petaloïde,	455
velue;	456
le Petit Ane,	273
Argus,	272
Cheval marin;	476
deuil,	112
Tome I. Mm	
1	

TABLE	- •
le Petit Paon,	488
la Petite Tortue,	489
vérole,	276
Pétoncles, V. Peignes à oreilles	inégales.
fans oreilles,	3 2 7
Phalenes,	487
la Phalene carmin	489
chouette,	ibid.
couleur de rose,	488
vitrée de la Chine,	ibid
Philandre,	498
Phocas, Voyez Loup marin.	495
Phænicoptere (bec de),	491
Pholades bivalves, Voyez Da	attes.
multivalves,	395
quintivalves,	397
fextivalves,	396
la Pie,	112
Pieces d'Anatomie;	500
Voyez squélettes.	
le Pied d'Ane,	302
Pied d'Élan,	496
Piedra del Porco,	5 ⊗ 2
Pierre de Goa,	504
de Serpent,	ibid.
de Tortue,	503
du Castoreum,	505
du poisson Belluga,	503
humaines,	505, 506
murales,	505
Pierrot tacheté,	490
le Pigeonneau, Voyez la Tours	terelle.
la Pince de Chirurgien,	3.73
A. ex	

	ALPHABÉTIQUE.	547
le	Pinceau de mer, Voyez arrofoir.	58
le	Pinceau de mer, Voyez scolopendre. Pinnes marines,	388
la	Pintade,	282
	Piqure de Mouches, V. Drap d'argent.	202
la	Pirogue,	291
la	Pistache,	207
le	Pitar,	333
	Plan-orbes,	429
	Plein-chant,	161
	Plomb,	152
la	Plume de mer, Voyez Keratophites.	
	marine,	469
	Poinçon,	220
	Point d'Hongrie,	332
le	Pois de mer,	I 2 2
	Poissons,	475
	armés,	ibid.
	coffre,	ibid.
	dorés de la Chine,	476
	trompette,	ibid.
	volans,	
	Polypes de mer, du corail,	469 10
	Polypiers,	10
	moux ou flexibles,	
	folides ou pierreux,	4.3
1.	a Pomme d'Acajou,	186
	folle de mer,	469
	Porcelaines,	263
	à bouche moins étroite,	264
	à bouche plus étroite,	267
4	M m ij	4.

TABLE	
la Porcelaine à tête de Serpent	268
de M. Adanson,	. 135
tigrée, Voyez peau de Tigi	re.
le Porc-épic de mer,	475
le Porc marin,	ibid.
le Porphyre,	258
le Potan,	266
le Pot verd,	110
Poucepieds,	405
le Pou de Baleine,	404
de mer,	275
Poulette,	312
le Poumon marin,	469
Poupart,	473
Pourpres,	192
à longue queue;	202
à petite queue,	194
la Pourpre de Panama. V. Conque persiq	ue.
Pourpres épineuses,	199
rameuses triangulaires,	194
triangulaires,	197
triangulaires aîlées,	198
le Prépuce,	211
Priapolite. Voyez Méandrites.	
la Princelle,	110
Profeatabées,	487
le Prérophore,	489
Pucelages,	273
Pucerons, Punaise aîlée,	487
	486
aquarique,	485
de mer. Voyez Oscabrion.	.0.
equipme 3	485

ALPHABÉTIQUE	949
la Pyramide,	159
la Pyramidale pectinée,	458
	• /
. Q.	
OUADRUPEDES 2	492
la Quenouille,	155
la Quenotte saignante,	117
la Queue d'Ecureuil,	5.6
d'Hermine,	248
Queue de Rhinoceros	494
_	*/ *
R_{*}	
la RACINE de Brione	190
la Raccrocheuse,	170
la Radiée (cœur),	3.62
la Radiće (telline),	371
le Radix,	216
à pointes noires,	20 I
le Raisin de mer,	469
Ranapiscatrix,	476
	3.26
la Rape,	3.20.
le Rastellum	288
ou .	400
le Rateau,	100
Rat (squélette de)	498
la Ratissoire. Voyez la Rape.	* 4 4
la Rave,	153
Raye en forme de Basilie	476
(machoire de)	477
(ovaires de),	ibid.
le Rayon de miel	3.35
la Rayonnée	344
Mmij	
,	

R	émore,	
-	(fon os prétendu)	476
p	enard (tête de),	477
D D	oquin (manhain, 1)	494
D	equin (mâchoire de),	476
1/	étépore agaric,	31
1 D	dentelle,	30,31
la K	etorte. Voyez la Cornue.	
le K	ezeau blanc,	3.29
K	henne (bois de)	495
le R	hinoceros (coquille),	168
	(infecte),	486
	(oifeau),	491
	(quadrupede.) Voyez Corne	
la R	obe Persienne. Voy. Tapis de Pers	Ce.
R	obert le diable,	489
R	ochers,	158
	aîlés à pattes,	188
1.	aîlés sans pattes,	
	à petite queue,	179
	fans queue,	168
	triangulaires,	159
le R	odolphe. Voyez Conque Persique.	168
le R	omarin. Voyez Keratophites.	
la R	osette d'Eninerra Vanar Cal	
les R	osette d'Epinette. Voyez Cadran.	
		425
	ouger,	476
los D	ougette,	498
les K	ouleaux,	251
le Ki	uban (limaçon),	112
ie R	uban (vis-buccin)	448

ALPHABÉTIQUE. 351 S. les SABOTS, 123 Salamandre aquatique, 48 I ibid. terrestre, la Sandale, 90 Sanglier (défenses de), 495 des Moluques. V. Baby roësa. le Sapin de mer, 57 la Sapotille, 297 le Satyre, Satyre, Sauterelles, 489 486 la Scalata, 99 le Scarabée (coquille), 313 487 palmiste, ibid. pillulaire, ibid. porc, la Scie, 36 E 48 I Scinc, Scolopendre de mer, 104, 469, 484 Scolopendroïdes, le Scorpion aquatique, 50, 465 486 femelle, } (coquilles), 191 ibid. 484le Scorpion (insecte), 476 marin, orangé (coquille), 191 469 Seche, 280 la Selle Polonoise, 506 Semence de perles, 482 Sénembi, 478 Serpents, Mm iv

TABLE

Serpent à deux têtes,		480
aveugle,		472
d'Esculape,		ibid.
javelot,		478
marin,		476
fonnette (sa queue),		480
re onene		489
la Sole,		317
de la rare espece,		318
marquetée.		ibid.
le Soleil. Voyez l'Eperon.		even.
à treillis épineux,		100
digité d'Aldroyande		456
levant,		462
plat coriacé,		376
le Solen du sable,		460
Serpent,		97
la Sorciere,		100
le Souci,		123
Souris (squélette de)	6	489
la Souris (coquille),		499
le Spectre (coquille),		271
le Spectre (insecte),		242
la Spéculation,		485
le Sphinx du Troesne,		244
Spondiles,		488
Spongia Veneris,		298
Squelette de Consti		506
Squelette de Canard.		49 [
de Chat monstrueux		499
de fœtus humain,		105
de Hérisson,		498
de la tête d'une Tortue		482
de Souris		492
		23.34

ALPHABETIQUE	\$53
Squélette de Rat,	499
de tête humaine,	500
de Taupe,	499
Squille large,	471
fabloneuse,	ibid.
Staphilins,	487
Sucet. Voyez Rémore.	
T.	
le TABAC d'Espagne,	488
le Taffetas,	256
le Tamaris de mer,	57
Tangara du Pérou,	490
le Tapis de Perse,	154
Tarentule,	484
le Taret,	400
la Tarriere,	220
la Tasse. Voyez Calice.	
de Neptune,	2, 1 2
Tatou ou Armadille,	498
à neuf bandes,	ibid.
Taupe (squélette de)	ibid.
Taupe-grillon,	484
la Taupe (coquille),	271
marine (fongipore),	41
marine (mollusque),	469
Taupins,	487
le Taureau volant,	486
Tecuixim (Lézard),	482
Teigne aquatique,	429,485
Tejuguacu (Lézard)	482
le Télescope	222
1	

TABLE	- 1
Tellines,	369
béantes à une extrê	mité, 370
béantes aux deux b	outs, 375
fluviatiles,	434
improprement dites	. Vov. Man-
ches de couteau.	
radiées,	371
la Telline de la Chine,	374
feuille. Voyez Lan	gue d'or.
Tenilles. Voyez Tellines.	
fluviatiles,	434
Térébratules. Voyez Anon	ries.
les Testicules,	117
Tête de Baby-rousse,	494
de Bouc,	496
de Bouquerin,	ibid.
d'Hippopotame,	494
de Lion,	ibid.
de Renard,	ibid.
de Tigre,	494

de Vache marine,

de Méduse à côtes,

de Méduse brune,

de Méduse à écusson,

de Méduse,

de More,

de Mort,

Thé (échantillons de),

bâtarde,

de Serpent,

la Tête de Becasse,

la Thiate,

ibid.

202

467

ibid.

ibid.

466

23

419

184

513 140 14F

140

ALPHABÉTIQUE.	555
la Thiare fluviatile,	432
le Thorax,	273
Tigre (tête de),	494
le Tigre jaune,	246
noir,	245
rouge,	246
la Tine de beurre,	241
Tipules,	486
le Tire-bourre,	99
la Toile à matelas. Voyez Lard. d'araignée. V. l'Esplandian.	
le Toit Chinois,	, 92
le Toit Chinois. Voyez la Pagode.	•
Tonnes,	205
à bouche échancrée,	208
à bouche entiere,	206
à queue,	216
fluviatiles,	431
Tortue de mer,	482
de terre,	ibid.
la Tortue (coquille),	276
la Tortue (Papillon), 488	, 489
Toucan, (bec de),	491
Toupies, Voyez culs de lampe.	
la Tour de Babel,	156
le Tournesol à douze rayons,	462
à treize rayons,	463
à trente-sept rayons,	462
à trente-huit rayons,	463
la Tourterelle,	179
la Transparente,	280
la Tricottée,	. 339
la Trompe marine,	148

	556 TABLE	
	la Trompette de mer,	
8011	la Trompette (poisson),	63
	la Truitée,	476
WY TO	Tubes vermiculaires. Voyez Tuyaux	269
	de mer.	
	Tubipores,	, 25
	la Tuilée,	366
	la Tulipe (Buccin),	150
	la Tulipe (gland de mer),	402
	la Tulipe (moule),	384
	la Tulipe (rouleau).	253
	le Turban (éponge),	60
	le Turban (casque),	177
	le Turban (gland de mer),	402
	le Turban Maure,	416
	Turc (Oursin),	413
	Turc (Limaçon),	115
	Turbans à grains de petite vérole,	413
	à mammelons,	414
	à panneaux,	411
	miliaires,	410
	miliaires anguleux,	412
	Tuyaux chambrés,	101
	cloifonnés,	399
	de mer multivalves,	398
	de mer univalves, d'orgue,	95
	fluviatiles,	103
	groupés. Voyez Vermiculaires.	428
	non testacés,	****
	fimples ou isolés,	104
	trompette	9.7
	e e e e e e e e e e e e e e e e e e e	103
	,	
J 1		

ALPHABETIQUE VACHE marine (membre de), 477 (tête de), 494 Végétaux, 509 Velette, 469 488 le Verd doré, Verge ailée. Voyez plume marine. 469 marine, 102, 103 Vermets, Vermiculaires, 102 Vers mangeurs de Chenille; 485 palmistes, 484 Vertebres de Baleine, 477 la Veuve, 112, 115 perlée, III le Vice Amiral, 233 de Rumphius; 234 la Vieille ridée, 364 100 le Villebrequin, 480 Vipere, 218 Vis. 222 à tête tronquée ; 447 Buccins, fluviatiles, 432 219 lilles, 224 striées, 447, 450 terrestres, 226 tuberculeuses; 219 la Visà caracteres, de pressoir, 223 228 feuilletée, 229 martelée;

658 TABLE ALPHABÉTIQUI	Ē.
la Vis tigrée,	219
la Vitre Chinoise (coquille),	280
la Vitrée de la Chine (phalene),	488
DET ' / TO ' \	1,466
l'Unique (Limaçon),	443
l'Unique (porcelaine),	266
l'Unique (Vis Buccin),	447
Univalves. Voyez coquilles.	77/
la Voile roulée. V. l'artimon entortil	lė.
le Volant doré,	489
Volutes,	231
coniques. Voyez cornets.	
cylindriques. Voyez rouleau	.x.
échancrées Voyez olives.	
la Volute de Guinée. Voyes aîle de P	a.
pillon.	
le Vulcain,	488
Z.	4.00
L.	
le ZEBRE. Voyez l'Ane rayé.	
le Zig-zag (coquille),	
le Zig-zag (phalene),	340
Zoophites,	489
Zygene, (machoire de),	45 I
=/8000, (machone de),	476
Fin de la Table du premier Volum	ie.

FAUTES

A corriger dans ce Volume.

PAG. 11, lig. 18, lissés, lis. lisses.

20, 1, prolongent, list. se prolongent.

48, 28, Rétépores dentellés, lis. Rétépores-dentelle.

69, 23, de, effacez ce mot.

146, 20, premieres, lif. premiers.

172, 27, 184, lif. 284.

ibid. , 27, 185, lif. 285.

292, 9, de lis. des.

349, 14, fommet, lif. fommets

512, 3, Aleyons, lif. Alcyons.

Fautes à corriger dans les Citations.

Pag. 16, Gualt. ind. test. no. 27, lis. no. 122.

48, Seba, pl. 114, n°. 3, lif. Rumph. herb. Amb. tom. 6, tab. 78, litt. a, b, c.

56, Voyez l'essai de, lis. l'essai sur.

104, Ellis, pl. 34, mar. tab. 1, f. 4, efface? mar. tab. 1, f. 4.

125, Rumph. tab. 21, litt. A, lif. litt. D.

136, List. tab. 56, list. List. tab. 656.

137, Seba, pl. 37, lif. Seba, pl. 39.

idem. ibid. tab. 830, f. ajoutez 52.

152, List. tab. 47, lif. List. tab. 892.

' 166, Arg. pl. 10, lif. Arg. pl. 14.

171, Rumph. tab. 22, lit. B, lif. Rumph. tab.

Seha nl. 81. list Seba. pl.

188, Seba, pl. 81, lis. Seba, pl. 82


Page 111, Seba, pl. 66, nº. 13 &, ajoutel 14. 222, Seba, pl. 59, lif. Seba, pl. 55. 233, Arg. pl. 11, lif. Arg. pl. 12. 240, ibid. f. 26, lif. ibid. tab 779, f. 26. 245, Seba, pl. 46, no. 3 & 4, lif. no. 1 & 22 275, 1 litt. A bid. lif. ibid. litt. A A. 285, Rumph. tab. 47, litt. R, lif. litt. K. 288, Gualt. tab. 103, ajoutez litt. C. 293, Rumph. tab. 43, lif. Rumph. tab. 48. 331, Bonan. Cl. 2, nº. 60 & 62, lif. 60 & 61. 333, Gualt. tab. 38; lif. Gualt. tab. 83. 376, Lift. tab. 422, f. 226, lif. f. 266. 416, Seba, pl. 87, no. 11, lis. pl. 13. 433, List. tab. 150, ajoutez fig. 5. 445, Arg. pl. 24. 28, fig. 4 & 8, effacez 24. 481, ibid. pl. 93, no. ajoutez 1.

Fin de l'Errats.




Point et Grave par Marie Therese Reboul









C.Brese del et scul 1766.







C. Bresse del. et Sail. 1786










C. Bresedel et Sail 1766.






C. Bresse bel. et Seul: 1766.





C. Bresse bel. et Sevi. 1766.






C.Bresse Del. et Sevl. 1766.





C: Bresio del et Soul 17.66






C. Brese del. et Seul. 1766






C.Bresse Del. et Sevl. 1766.






C.BreSse Del et Sevl 1766.






C.Bresse Del. et Sevl. 1766.






CBresse bel , et Sevl. 1766.






















CBresse Bel et Sevl 1766





C. Prosse, Delet Savl. 1766.





Bresse det. et Seul 1766.



Pl.xxII. Nouche dans la classe des Rayes Dessinée des deux côtés grand comme le nature Tirée du Cabinet de M'Davila





EXPLICATION DES FIGURES

DU TOME PREMIER.

PLANCHE I.

MILLEPORE à branches feuillues, formé sur une Bouteille pêchée à la Barbade. Il en est parlé à l'art. 73 des Polypiers, page 28.

PLANCHE II.

La lettre A représente un Lépas du premier genre, auquel nous avons donné le nom de Parasol Chinois: il en est parlé aux articles 1 & 2 des Coquilles, page 78.

Sous la lettre B est le Lépas Cabochon blanc de Saint-Domingue, du quatrieme genre de cette famille, vû par dehors. Il en est parlé à l'art. 42 des Coquilles, page 91. On voit, en b, la même Coquille renversée, avec son appendice intérieur en demi-cornet.

PLANCHE III.

La lettre C offre un Lépas de Magellan, à Tome I. Nn 562

coquille percée en-dessus, (ce qui caractérise le second genre de cette samille:) c'est celui de l'art. 37 des Coquilles, page 88. Il ne dissére que par de légers accidens de celui qui est décrit à l'art. 36.

Le Lépas de la lettre D est aussi de Magellan: c'est un Lépas papyracé du premier genre, qui se trouve décrit à l'art. 8 des Coquilles, page 79.

PLANCHE IV.

On voit, à la lettre E, un groupe très-gracieux de Tuyaux de mer de l'espéce des Tire-bourres, dont il est parlé à l'art. 37 des Coquilles, page 99.

Le Tuyau de mer, représenté à la lettre F, est un de ceux auxquels nous avons donné le nom de *Pains de bougie*: il en est parlé à l'art. 61 des Coquilles, pag. 100.

La lettre G montre un autre Tuyau de mer, nommé Vilebrequin: il en est parlé à l'are. 39 des Coquilles, page 100.

On voit, en H, trois Tuyaux de mer accolés ensemble & formant divers plis semblables à ceux des intessins. Ils sont compris dans l'article 60 des Coquilles, page 100.

PLANCHE V.

On a représenté, à la lettre I, le premier des deux Burgaux de la Chine, décrits à l'art. 98 des Coquilles, page 111.

On voit, en K, l'un des deux Sabots de l'art. 148 des Coquilles, page 125.

Le petit Buccin qui se voit en L, est un des deux décrits sous le nom de Perrons à l'art. 193 des Coquilles, pag. 144.

PLANCHE VI.

On voit, en M, un Sabot d'Amérique, chargé d'autres coquillages; ce qui lui a fait donner le nom de *Fripiere*: c'est la premiere des trois dont il est parlé à l'article 147 des Coquilles, page 125. La même Coquille est vue en m du côté de la bouche.

La lettre N offre le Gland de mer épineux, adhérant à une valve de Conque anatifere, dont il est parlé à l'article 919 des Coquilles, page 402.

On a représenté, en O, un Piquant d'Ourfin, extrêmement rare & singulier, décrit vers la fin de l'art. 961 des Coquilles, page 426.

Nn ij

PLANCHE VII.

Le Limaçon qui se voit en P, est une des deux Bouches d'argent d'espèce rare, décrites à l'article 106 des Coquilles, page 112.

On voit, en Q, le Buccin nommé Gaufre, dont il est parlé à l'article 197 des Coquilles, page 144.

La lettre R offre la Coquille nommée Amande rôtie, décrite à l'article 823 des Coquilles, page 357.

PLANCHE VIII.

Le Buccin de Magellan, représenté en S, se trouve décrit à l'article 181 des Coquilles, page 140.

Autre Buccin Magellanique, représenté à la lettre T: c'est l'un des deux décrits à l'article 198 des Coquilles, page 145.

On voit, à la lettre V, le Buccin nommé Cabestan, décrit à l'article 192 des Coquilles, page 143.

La lettre X fait voir un petit Buccin singulier, nommé Mûre de haie. Le même est vu en x du côté de la bouche. Il en est parlé à l'article 172 des Coquilles, page 136.

PLANCHE IX.

La lettre A offre un Buccin très-rare, nommé le Buccin crénelé: il est décrit à l'art. 202 des Coquilles, page 146.

On voit, en B, un Buccin de Magellan, nommé la Licorne. Le même se voit en b du côté de la bouche, pour en saire voir la dent saillante. Il en est parlé à l'article 174 des Coquilles, page 136.

On a représenté, en C, une Coralline rare, à longue tige, nommée le Pinceau de mer. Le restant de sa tige se voit à la lettre e. Ce morceau est décrit à l'article 149 des Polypiers, page 38.

PLANCHE X.

La lettre B offre un beau Buccin Magellanique, nommé le Buccin feuilleté. Le même est vu en d du côté de la bouche. Il est décrit à l'article 194 des Coquilles, page 144.

PLANCHE XI.

On voit, en E, le Rocher de la Chine, dont Nn iij il est parlé à l'article 251 des Coquilles, page 161. Le même est représenté en e du côté de la bouche.

PLANCHE XII.

La Coquille qu'offre cette planche est nommée par Klein Racine de Brione, & se trouve gravée dans Lister. Nous ne l'avons sait représenter que pour faire voir les divers changemens d'état de cette Coquille, qui est ici dépourvue d'aîle. Il en est parlé à l'article 341 des Coquilles, page 190.

PLANCHE XIII.

La même Coquille de la planche précédente, mais plus avancée en âge, & garnie de son aîle. Elle est aussi décrite à l'art. 341 des Coquilles, page 190.

PLANCHE XIV.

La même Coquille représentée dans son dernier âge, avec ses pattes. C'est l'une des deux de même espéce dont il est parlé à l'art. 340 des Coquilles, page 190.

PLANCHE XV.

On voit, en F, une rare & belle Olive dont il est parlé à l'article 342 des Coquilles, page 237.

La lettre G représente un Rocher blanc de lait : c'est le premier des trois qui sont décrits à

l'article 253 des Coquilles, page 162.

La lettre H offre une Pourpre épineuse trèsrare, nommée le Radix à pointes noires. Elle se trouve décrite à l'article 374 des Coquilles, page 201.

La Porcelaine de la lettre I se nomme la Tortue, & est décrite dans l'article 581 des Co-

quilles, pages 275 & 276.

PLANCHE XVI.

On a représenté, en K, une très-belle Pourpre triangulaire aîlée, décrite à l'article 366 des Coquilles, page 198.

Autre Pourpre ailée représentée en L, & décrite à l'article 367 des Coquilles, page 198.

Troisieme Pourpre aîlée, représentée en M: elle est décrite à l'article 368 des Coquilles, page 199.

On voit, en N, une Pourpre triangulaire

568

des Indes, blanche, à taches peu nombreuses : une autre de même espéce, entiérement blanche, à la lettre O; & une petite blanche du Sénégal, à queue sermée comme un tuyau, à lettre P. Ces trois Pourpres, qui toutes ont un commencement d'aîle, sont partie de l'article 363 des Coquilles, page 198.

La Vis qui se voit à la lettre Q, est une des Vis seuilletées blanches qui sont partie de l'arti-

cle 442 des Coquilles, page 229.

PLANCHE XVII.

La lettre R offre un Casque des Indes, décrit à l'article 283 des Coquilles, page 172.

Le Casque qui est en S, est le dernier de ceux qui sont décrits à l'article 289 des Co-

quilles, page 173.

On voit, en T, une Coquille du genre des Cœurs, nommée Marron épineux, & décrite à l'article 281 des Coquilles, page 356. La lettre t fait voir la même Coquille dans une autre position.

PLANCHE XVIII.

La lettre V représente un grand Cœur trèsrare, nommé le Coqueluchon de Moine: il se trouve décrit à l'article 824 des Coquilles, page 357. L'intérieur de l'une des valves de cette Coquille est représenté en ν , pour en faire voir le large appendice en forme d'oreille.

PLANCHE XIX.

Le groupe de deux Huitres, qui est repréfenté à la lettre X, est une espéce de Crête de coq d'une variété rare. Voyez ce qui en est dit à l'art. 606 des Coquilles, page 288.

On voit, en Y, une autre Huitre nommée Corne d'abondance; elle appartient à l'article 610 des Coquilles, & est de l'espèce décrite dans l'article 608, pages 288 & 289.

La lettre Z représente une des deux Moules arborisées, décrites à l'article 898 des Coquilles, page 386.

PLANCHE XX.

Cette planche réunit toutes les variétés d'Anomies que nous possédons, décrites aux pages 311, 312 & 313.

La lettre A représente la grande Anomie Magellanique striée de l'article 696. On a mis, en a, la valve supérieure d'une Coquille de 570

cette espéce, renversée, pour faire voir la forme singuliere de ses appendices.

B est l'Anomie verd - noirâtre des Indes, connue sous le nom de Bec de Perroquet, & décrite à l'article 692. La même représentée de profil en b, pour saire voir l'avance de son bec.

C est l'Anomie lisse de Mahon, décrite à

l'article 694.

D. Petite Anomie jaune-blond & transparente de Mahon; c'est une des deux premieres qui se trouvent décrites à l'article 699: elle est représentée un peu plus grande qu'elle ne l'est en esset.

E. Autre petite Anomie à tuyaux latéraux, du même article, représentée de grandeur naturelle.

e. La même grossie de plus de moirié.

F. Anomie striée, de forme ovale, décrite dans le même article.

G. Autre Anomie différente, du même article.

g. La même, vûe par dessous.

PLANCHE XXI.

Le Tuyau de mer, représenté à la lettre H, est le Taret rongeur de bois de M. Adanson, fermé, par le bout le plus large, d'une espéce

d'opercule hémisphérique : il est décrit à l'article 916 des Coquilles, page 399.

On voit, en I, une autre variété de Taret coupé depuis a jusqu'en b, pour en faire voir la construction intérieure. La piéce qui en a été enlevée se voit en i. Il est parlé de ce Tuyau multivalve vers la fin de l'article 916 ci-dessus.


Autre Tuyau de mer, représenté en K, dont l'extrémité c est sermée par une demifphère lisse & luisante. Il est décrit à l'article 31 des Coquilles, page 97.

La lettre L offre un Tuyau de mer chambré, dont on a mis les cloisons à découvert depuis d jusques en e. Il est parlé de ce Tuyau à l'article 62 des Coquilles, page 101.

PLANCHE XXII.

Palais d'une espéce de Raie de la Chine, contourné de maniere à imiter deux Buccins. Il en est parlé à l'art. 14 des Poissons, page 477.

DE l'Imprimerie de MICHEL LAMBERT, rue des Cordeliers, au Collége de Bourgogne, 1767.







B767 D259c V.1





